

5492/c

Bibliothèque
du Bouvier ? .f.

Dessiné & Gravé par F. N. Martinet, Dessinateur de Mgr. les Duc & la Rochefoucauld Pair d'Espagne.

ORNITHOLOGIA

SIVE

SYNOPSIS METHODICA

SISTENS AVIUM DIVISIONEM IN ORDINES, Sectiones, Genera, Species, ipsarumque Varietates.

CUM ACCURATA CUJUSQUE SPECIEI descriptione, Citationibus Auctorum de iis tractantium, Nominibus eis ab ipsis & Nationibus impositis, Nominibusque vulgaribus.

A D. BRISSON, Regiæ Scientiarum Academiæ Socio.

Opus Figuris æneis adornatum.

VOLUMEN V.

PARISIIS,

AD RIPAM AUGUSTINORUM,

Apud CL. JOANNEM-BAPTISTAM BAUCHE, Bibliopolam, ad Insigne Stæ. Genovefæ, & Sti. Joannis in Deserto.

M. DCC. LX.

CUM APPROBATIONE, ET PRIVILEGIO REGIS.

ORNITHOLOGIE

OU

MÉTHODE

CONTENANT LA DIVISION DES OISEAUX
en Ordres, Sections, Genres, Especes & leurs Variétés.

A LAQUELLE ON A JOINT UNE DESCRIPTION exacte de chaque Espece, avec les Citations des Auteurs qui en ont traité, les Noms qu'ils leur ont donnés, ceux que leur ont donnés les différentes Nations, & les Noms vulgaires.

Par M. BRISSON, de l'Académie Royale des Sciences.

Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce.

TOME V.

A PARIS,

QUAY DES AUGUSTINS,

Chez CL. JEAN-BAPTISTE BAUCHE, Libraire, à l'Image Sainte Geneviéve & S. Jean dans le Désert.

M. DCC. LX.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

REGNUM ANIMALE.

CLASSIS III.

ORDO XV.

AVES

Digitis membranis destitutis: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: alisque, pro mole corporis, exiguis & volatui inutilibus donatæ.

HUJUS Ordinis Aves nunquam volant, idque ob alarum brevitatem corporis moli comparatam.

Aliæ duobus tantùm donantur digitis anticè positis, postico nullo: aliæ tres ha-

LE REGNE ANIMAL.

CLASSE III.

ORDRE XV.

LES OISEAUX

Qui ont les doigts dénués de membranes: la partie inférieure des jambes dénuée de plumes: & les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

LES Oiseaux de cet Ordre ne volent jamais, vu la brieveté de leurs aîles, eu égard à la grosseur de leur corps.

Les uns n'ont que deux doigts placés en-devant, & n'en ont point derriere: d'au-

tres ont trois doigts auſſi placés en-devant, ſans en avoir derriere : d'autres enfin ont quatre doigts, ſçavoir trois placés en-devant, & un en-arriere. Je les diviſe en trois ſections : dans la premiere ſont ceux qui ont deux doigts devant & point derriere (*voyez Tome I. Pl. II. Fig.* 1), comme l'*Autruche* : dans la ſeconde ceux qui ont trois doigts devant, & point derriere, comme le *Thouyou*, le *Caſoar* : & dans la troiſiéme ceux qui ont quatre doigts, ſçavoir trois devant & un derriere, comme le *Dronte*.

bent digitos, anticè ſimiliter poſitos, poſtico quoque nullo : aliæ tandem quatuor digitis prædítæ ſunt, tribus ſcilicet anticis, unico poſtico. In tres ſectiones dividuntur : prima continet eas quæ digitos habent duos anticos, poſticum nullum (*vide Vol. I. Tab. II. Fig.* 1), ut *Struthio* : ſecunda eas quæ digitis donantur tribus anticis, poſtico nullo, ut *Rhea*, *Caſuarius* : tertia verò illas quæ digitos habent quatuor, tres ſcilicet anticos & poſticum unum, ut *Raphus*.

SECTION I.

Ceux qui ont deux doigts devant & point derriere.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de l'*Autruche*.

Cet Oiſeau a le bec droit, applati horizontalement ; & ſon bout eſt onguiculé & arrondi : la partie ſupérieure de ſa tête eſt chauve & calleuſe.

SECTIO I.

Eæ quæ digitos habent duos anticos, poſticum nullum.

IN illa ſectione unicum continetur genus, ſcilicet *Struthionis*.

Avis iſta roſtro donatur recto, horizontaliter ſubplano, cujus apex eſt ſubrotundus, unguiculatus : capitis ipſius ſuperior pars calva eſt & calloſa.

LXII.

Genus Struthionis.

Hujus character est
Digiti duo antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, horizontaliter subplanum; hujus apex subrotundus, unguiculatus:
Superior capitis pars calva & calloſa:
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

LXII.

Le Genre de l'Autruche.

Son caractere est d'avoir
Deux doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, applati horizontalement; son bout onguiculé & arrondi:
La partie supérieure de la tête chauve & calleuse:
Les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

** 1. L'Autruche.

Voyez Pl. I. Fig. 1.

Struthio pennis nigris in toto corpore vestitus, albis & griseis quandoque admixtis; remigibus majoribus rectricibusque candidis . . . . Struthio.

Struthio pedibus didactylis. Camelus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *sp.* 1.
Struthio pennis candidissimis, lanuginosis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XL.*
Struthio. *Klein. Avi. pag.* 16.
Moehr. Avi. Gen. 54.
Struthio; Struthio-Camelus. *Charlet. Exer. pag.* 79. *N°. X.*
Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°. X.*
Struthio; Strutho-Camelus; Struthio Africa; Struthio Libycus; Struthio-Camelus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 69, *in qua hujus icon pessima.*
Struthio-Camelus. *Aldrov. Avi. Tom. I. pag.* 587. *icones non satis accuratæ, maris pag.* 590, *& fœminæ pag.* 591.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 350.
Willugh. Ornith. pag. 104. *hujus icon satis accurata (exceptis pedibus) Tab. XXV.*

Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 200.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 62. *sp.* 1.
Struthio-Camelus, sive Struthio. *Raj. Syn. Avi. pag.* 36. *N°.* 1.
Struthio-Camelus Africanus, pullus. *Seb. Vol. I. pag.* 83. *hujus icon satis accurata Tab. LI. fig.* 6.
Strutho-Camelus. *Gesn. Avi. pag.* 739. *hujus icon pessima pag.* 740.
Jonst. Avi. pag. 35. *hujus duæ icones non satis accuratæ Tab. XXI.*
Autruche. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 231; *avec une très-mauvaise figure pag.* 232.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 55 *a*, *dans laquelle est la même figure.*
Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag. 113; *avec une figure assez exacte Pl.* 53.
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 147; *avec une mauvaise figure pag.* 164. *N°.* 3.
Alb. Tom. III. pag. 13; *avec une figure mal coloriée Pl.* 31.
Les Hébreux l'appellent JACUAH. *Gesn. Aldrov.*
Les Chaldéens, NAAMITHA. *Gesn. Aldrov.*
Les Arabes, NEAMAH. *Gesn. Aldrov.*
Les Grecs, Στρυθος. *Bel. Gesn.* Στρυθος; Στρυθοκάμηλος; Στρυθοΐτεκάμηλος. *Aldrov. Jonst.* Στρουθιοκάμηλος; Στρουθος; μηγάλη; Στρουθος λιβυικος. *Schwenck.* Στρυθος. *Bel.*
Les Grecs modernes, Στριφοκάμιλος. *Gesn. Aldrov.* Στρειτοκαμηλος. *Jonst.*
Les Portugais, EMA. *Klein.* EMA DI GEI. *Gesn. Aldrov.*
Les Espagnols, AVESTRUZ. *Gesn. Aldrov.*
Les Catalans, ABASTRUS. *Barr.*
Les Italiens, STRUTZA. *Bel. Gesn.* STRUZZO; STURZO. *Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, STRUSS; STRAUSS. *Gesn. Aldrov.* STRAUS; STRAUS-VOGEL. *Schwenck.*
Les Flamands, VOGEL STRUIJS. *Aldrov.*
Les Illyriens, PSTROS. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, STRUS. *Gesn. Aldrov.*
Les Suédois, STRUTZ. *Linn.*
Les Anglois, OSTRICH. *Willugh. Raj. Klein. Alb.* OSTRIDGE. *Charlet.*

L'*Autruche* est le plus grand & le plus gros de tous les Oiseaux. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pieds six pouces, & jusqu'à celui de l'ongle de huit pieds quatre pouces. Son bec, qui a à son origine deux pouces six lignes de

Alitum omnium maximus & crassissimus est *Struthio*. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pedes & sex pollices æquat, & ad extremos ungues octo pedes & quatuor pollices. Rostrum, quod in exortu

duorum pollicum & sex linearum latitudinem obtinet, ab ipsius extremitate ad oris angulos, ultra oculos quidem protensos, quatuor pollices & sex lineas longum est ; cauda tredecim pollices ; pes quindecim pollices & tres lineas; major digitus, scilicet interior, cum ungue septem pollices & novem lineas; exterior, qui quidem ungue caret, quatuor pollices & sex lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum sex pedum & septem pollicum intervallo distant : alæ verò complicatæ mediam circiter caudæ longitudinem pertingere queunt. Capitis superior pars plumis est omnino destituta & penitùs nuda. Reliquum caput, guttur & collum, per mediam ipsius longitudinem capiti finitimam, cute obteguntur carneo colore livido imbutâ, lanugine, rariorum pilorum æmulâ, albâ & splendente obsitâ. Collum per mediam ipsius longitudinem corpori viciniorem, dorsum, uropygium, pectus & ventrem vestiunt pennæ nigræ, quas inter quandoque immiscentur quædam candidæ & quædam grisæ. Pennæ scalargeur, a depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-delà des yeux, quatre pouces six lignes de long; sa queue treize pouces; son pied quinze pouces trois lignes; le plus grand de ses doigts, qui est l'intérieur, joint avec l'ongle, sept pouces neuf lignes; l'extérieur quatre pouces six lignes. Ce dernier n'a point d'ongle. Elle a six pieds sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, peuvent s'étendre jusque vers la moitié de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est tout-à-fait dégarnie de plumes & entiérement nue. Le reste de la tête, la gorge & le col, dans la moitié de sa longueur qui est la plus voisine de la tête, sont couverts d'une peau de couleur de chair livide, garnie d'un duvet, en forme de poils clair-semés, blanc & brillant. La moitié de la longueur du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine & le ventre sont couverts de plumes noires, parmi lesquelles en sont mêlées quelquefois quelques-unes de blanches & quelques-unes de grises. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont pareillement noires, & mêlées de quel-

ques plumes blanches & griſes. (Dans les jeunes tout le corps eſt couvert de plumes d'un gris-brun). Les jambes, les côtés & le deſſous des aîles ſont entiérement dégarnis de plumes ; & la peau eſt dans ces endroits d'un blanc-rougeâtre. La peau qui couvre les jambes, eſt garnie de rides un peu élevées, qui ſe croiſſent les unes & les autres, & laiſſent entr'elles des eſpaces quarrés. Les grandes plumes de l'aîle ſont d'un très-beau blanc : les moyennes ſont noires. La queue eſt compoſée de plumes du même blanc que celui des grandes plumes de l'aîle. Toutes les plumes de cet Oiſeau ſont decompoſées, c'eſt-à-dire, que leurs barbes ſont ſéparées les unes des autres, & n'ont aucune connexion entr'elles. Cet Oiſeau a au bas du ſternon une calloſité ſur laquelle il s'appuye, lorſqu'il ſe couche. A chaque aîle ſont deux ergots, longs d'environ un pouce, ayant à leur bâſe une ligne & demie de diamétre, d'une ſubſtance ſemblable à de la corne, placés, l'un au bout de l'aîle, & l'autre au bout de l'aîle bâtarde. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec eſt de couleur de corne, excepté ſon bout qui eſt noirâtre. Les

pulares & ſuperiores alarum tectrices ſunt ſimiliter nigræ, plumis quibuſdam albis & griſeis interſertis. (Juniores per univerſum corpus pennis veſtiuntur griſeo-fuſcis). Crura, latera & partes ſubalares plumis penitùs deſtituuntur ; cutis autem iis in locis ex albo rubeſcit. Supra cutem crura cooperientem rugæ ſunt ipſius ſuperficiem nonnihil excedentes, aliæ alias decuſſantes, & intervalla inter ſe quadrata efformantes. Remiges alarum majores candore nitent : minores ſunt nigræ. Caudam componunt rectrices eodem imbutæ candido ac remiges majores ipſæ tinguntur. Omnes hujus Avis pennæ ſunt decompoſitæ, ſive, quod idem eſt, ipſarum pinnulæ ſunt à ſe invicem disjunctæ, & nullo modo inter ſe connectuntur. In infima ſterni parte calloſitas eſt quædam, cui, humi procumbens, inſidet hæc Avis. Utraque ala binis donatur calcaribus, unum circiter pollicem longis, quorum in baſi diameter ſeſquilineam æquat, ſubſtantiæ corneæ æmulis, alio ſcilicet in alæ apice, altero in alæ nothæ extremitate poſito. Oculorum irides avellaneæ.

Rostrum corneo colore imbutum, attamen in extremitate nigricans. Pedes grisei sunt; unguis autem nigricat. Bini digiti membranâ validâ, ad primum usque articulum extensâ, inter se connectuntur. *Struthio* in arenam ova ponit, & per noctem tantùm ea incubat; interdiù enim sol ad ipsorum incubationem sufficientem præbet calorem. Habitat in *Africa*. *Ex museo Realmuriano.*

pieds sont gris; & l'ongle est noirâtre. Les deux doigts sont réunis par une forte membrane qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. L'*Autruche* dépose ses œufs dans le sable, & ne les couve que pendant la nuit; parce que pendant le jour le soleil donne une chaleur suffisante pour leur incubation. On la trouve en *Afrique*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO II.

Eæ quæ digitos habent tres anticos, posticum nullum.

DUo in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur recto, horizontaliter subplano; hujus apice subrotundo, ut *Rhea*: aliæ verò rostrum habent rectum, subconicum: istæ autem habent quoque caput galeâ corneâ instructum: & palearia bina in juguli medio posita, ut *Casuarius*.

SECTION II.

Ceux qui ont trois doigts devant & point derriere.

CETTE section contient deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit, applati horizontalement; & son bout est arrondi, comme le *Thouyou*: & les autres ont le bec droit & presque conique; ceux-là ont un casque de corne sur la tête: & deux membranes charnues placées vers le milieu de la gorge, comme le *Casoar*.

LXIII.

Le genre du Thouyou. (1).

Son caractere eſt d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec droit, applati horizontalement; ſon bout arrondi :

Les aîles petites à proportion de la groſſeur du corps, & point propres pour le vol.

(1) *Thouyou*, nom formé de *Thouyouyou*, qui eſt celui que les Indiens de la *Guiane* donnent à l'eſpece de ce genre.

LXIII.

Genus Rheæ. (1).

Hujus character eſt
Digiti tres antici, membranis deſtituti; digitus poſticus nullus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum rectum, horizontaliter ſubplanum; hujus apex ſubrotundus :
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

(1) *Rhea*, nomen à *Moehringio* huic generi inditum.

1. LE THOUYOU.

Rhea pennis griſeis in toto corpore veſtita . . . . RHEA.

Rhea. *Moehr. Avi. Gen.* 55.
Struthio digito poſtico rotundato mutilo. Struthio Americanus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *ſp.* 3.
Struthio. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 557.
Euſ. Nieremb. pag. 217. *hujus icon minùs accurata pag.* 218, *ſub titulo*, Emeu.
Struthio-Camelus. *Jonſt. Avi. pag.* 153.
Struthio-Camelus Americanus. *Raj. Syn. Avi. pag.* 36. *N°.* 2.
Struthio nothus. *Klein. Avi. pag.* 17.
Grus cinerea ferrivora. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 133.
Ardea Americana, cinerea, ferrivora, capite calvo. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 11.
Avis Eme. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 541, *in qua hujus icon à Nierembergio mutuata.*
Emeu nigricans, cervice longiori ac tenuiori. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXVIII. ſp.* 2.
Emeu Nierembergii. *Jonſt. Avi. hujus icon à Nierembergio mutuata Tab.* 56.

Yandou,

Yandou. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 616.
Iandou. *Jonst. Avi. pag.* 125.
Charlet. Exer. pag. 118. *N°. XX.*
Charlet. Onomazt. pag. 115. *N°. XX.*
Nhandu-guacu. *Pison. Hist. Nat. pag.* 84, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Nhandu-guacu Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 190.
Jonst. Avi. pag. 130.
Nhandu-guacu Brasilienſibus, Ema Lusitanis, ſive Struthio-Camelus Americanus Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 105.
Autruche de Guiane. *Des March. Tom. III. pag.* 324.
Les Portugais l'appellent EMA. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Barbares, YANDOU. *De Laët. Jonst.* ANDUGOACU. *De Laët.*
Les Brasiliens, NHANDU-GUACU. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Indiens, SURI : *& d'autres* IARDU. *Nieremb.*
Les Indiens de la Guiane, THOUYOUYOU. *Barr.*

Magnitudine & crassitie paululùm *Struthioni* cedit. Collum ipsius duos circiter pedes longum est; rostrum ab ipsius extremitate ad oris angulos usque duos pollices cum sex lineis; pes octodecim pollices; crus unum pedem. Universum corpus vestiunt pennæ grisæ. Alæ sunt valdè breves. Caudâ caret hæc Avis; sed ipsius loco pennæ uropygium vestientes longæ sunt, deorsum tendunt, & anum obtegunt. Oculos habet aterrimos; digitos unguibus nigris, crassis & obtusis armatos. Digiti postici loco callositas extat crassa & rotundata. Fructibus & carne vescitur. Habitat in *Guiana* & *Brasilia* in *Seregippæ* & *Fluvii magni* præfecturis.

Il n'est pas tout-à-fait si gros, ni si grand que l'*Autruche*. Son col a environ deux pieds de long; son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche deux pouces six lignes; son pied dix-huit pouces; & sa jambe un pied. Tout son corps est couvert de plumes grises. Ses aîles sont extrêmement courtes. Il n'a point de queue; mais à sa place les plumes du croupion sont longues, & retombent en en-bas, pour venir couvrir l'anus. Ses yeux sont d'un très-beau noir. Ses doigts sont armés d'ongles noirs, gros & obtus. A la place du doigt de derriere est une callosité épaisse & arrondie. Il se nourrit de frùits & de viande. On le trouve dans *la Guiane*, & au *Brésil* dans les Gouvernemens de *Seregippe* & de *Rio Grande*.

LXIV.

Le genre du Casoar.

Son caractere est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, presque conique:
Un casque de corne sur la tête:
Deux membranes charnues vers le milieu de la gorge:
Les aîles petites à proportion de la grosseur du corps, & point propres pour le vol.

LXIV.

Genus Casuarii.

Hujus character est
Digiti tres antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, subconicum:
Caput galeâ corneâ instructum:
Palearia bina in juguli medio:
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

** 1. Le Casoar.

Voyez Pl. I. Fig. 2.

Casuarius niger; capite & collo supremo nudis . . . ; Casuarius.

Casuarius. *Frisch. hujus icon non satis accurata Tab.* 105.
Casearius. *Klein. Avi. pag.* 17.
Struthio pedibus tridactylis, vertice palearibusque nudis. Casuarius. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *sp.* 2.
Cela. *Moehr. Avi. Gen.* 56.
Avis Eme. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 541.
Emeu pennis setosis, nigricantibus, crassâ cervice. *Barr. Ornith. Class. III. Gen XXXVIII. sp.* 1.
Emeu Avis. *Clus. exot. Lib. V. Cap. III. pag.* 97. *hujus icon satis accurata pag.* 98.
Emeu. *Charlet. Exer. pag.* 79. *N° XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°. XI.*
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 63. *sp.* 1.

Emeu Clusii. *Eus. Nieremb. pag.* 218, *in qua hujus icon à Clusio mutuata.*
Emeu, seu Eme Clusii. *Jonst. Avi. pag.* 119. *hujus icon à Clusio mutuata Tab.* 56.
Emeu, seu Eme Aldrovandi, Clusii, Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 105. *hujus icon non satis accurata Tab. XXV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 36. *N°.* 3.
Emeu, vulgò Casoaris. *Bont. Ind. Ori. pag.* 71, *in qua hujus icon pessima.*
Emeu à quibusdam dictus Casearius. *Mus. Worm. pag.* 292.
Casoar. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag.* 157; *avec une figure pas assez exacte Pl.* 56.
Cassowary. *Alb. Tom. II. pag.* 39; *avec une figure peu exacte, & mal coloriée Pl.* 60.
Les Allemands l'appellent CASUAR, *ou* EMEU. *Frisch.*
Les Suédois, EME. *Linn.*
Les Anglois, CASSOWARY. *Willugh. Raj.* CASSOWARE. *Charlet.* CASSAWAR. *Alb.*
Les Indiens, EME *Aldrov.*

Crassitie *Struthionem* ferè adæquat; sed non tantam obtinet altitudinem. Ipsius longitudo ab apice rostri ad uropygium extremum quatuor pedes explet, & ad extremos ungues quinque pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos, infra oculos usque protensos, quatuor pollices & sex lineas longum est; pes duodecim pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices cum sex lineis, extimus quatuor pollices, intimus autem quatuor pollices & sex lineas; digiti enim intimi unguis trium pollicum longitudine pollet. In superiore capitis parte incrementum

Il est presqu'aussi gros que l'*Autruche*; mais il n'est pas si élevé. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui du croupion est de quatre pieds, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche, qui s'étendent jusqu'au-dessous des yeux, a quatre pouces six lignes de long; son pied douze pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces six lignes, l'extérieur quatre pouces, & l'intérieur quatre pouces six lignes; car l'ongle de ce dernier a jusqu'à trois pouces de long. Sur la partie supérieure de la tête est une excroissance osseuse, garnie d'une matiere cornée, qui

forme une eſpece de caſque, & qui s'étend depuis l'origine du bec juſque vers le milieu du ſommet de la tête. Ce caſque a trois pouces de hauteur, un pouce de largeur à ſa bâſe, & ſeulement trois lignes dans ſa partie ſupérieure. Sa partie antérieure eſt noirâtre : ſa partie poſtérieure & ſes côtés ſont d'un jaune de cire. Le tout en eſt liſſe & brillant. La tête, la gorge & la partie du col la plus voiſine de la tête ſont couvertes d'une peau nue & garnie ſeulement de quelques petites plumes noires, clair-ſemées. Cette peau eſt bleue ſur les côtés de la tête : ſur la partie poſtérieure de la tête, la gorge & le col elle eſt d'un violet tirant ſur le cendré : il y a ſeulement un peu de rouge ſur le milieu de la partie ſupérieure du col, la peau formant en cet endroit des plis ou eſpeces de rides. Sur la partie inférieure du col, vers le milieu de ſa longueur, ſont ſituées deux membranes charnues, longues d'un pouce ſix lignes, larges de neuf lignes, & arrondies par le bout. Ces membranes ſont en partie rouges & en partie bleues. Sur le ſternon eſt une calloſité, ſur laquelle l'Oiſeau s'appuye, lorſqu'il eſt couché. Tout le reſte de ſon corps, ſçavoir la

extat oſſeum, materiâ corneâ coopertum, quodammodo efficiens galeam ab exortu roſtri medium versùs capitis verticem protenſam. Galea autem trium pollicum altitudinem, unius pollicis in baſi, & trium tantùm linearum in ſuprema parte latitudinem obtinet. In anteriore parte nigricat : in poſteriore verò, ſicut & ad latera, cereo colore imbuitur. In tota ſuperficie lævigata eſt & ſplendens. Caput, guttur & partem colli capiti viciniorem cooperit cutis nuda, quibuſdam tantùm & rarioribus plumulis nigris obſita. Quæ cutis eſt ad latera capitis cœrulea, in parte capitis poſteriore, gutture & collo ex violaceo ad cinereum vergens : in colli ſuperioris medio aliquid tamen rubri admiſcetur ; & eo in loco rugis exaratur cutis. In collo inferiore, versùs mediam ipſius longitudinem, palearia extant bina, unum pollicem & ſex lineas longa, novem lineas lata, & in extremitate rotundata. Palearia autem iſta ſunt partim rubra & partim cœrulea. Super ſternum calloſitas eſt quædam, cui, humi procumbens, inſidet hæc Avis. In

universo reliquo corpore, colli scilicet parte corpori viciniore, dorso, uropygio, pectore, ventre, cruribus, lateribusque, pennis vestitur nigris, omnibus decomposítis, id est, quarum pinnulæ sunt à se invicem disjunctæ, & nullo modo inter se connexæ. Pleræque pennæ sunt in utroque alveolo binæ : ex quibusdam tamen alveolis unica tantùm oritur penna. Omnium autem pennarum scapi sunt plani, splendidè nigri in parte inferiore nodis obsiti, ex quibus oritur pinnula, vulgò maximâ longitudine pollens. In uropygio quædam extant plumæ quatuordecim pollices longæ. Omnes autem hujus Avis pennæ magnoperè ad pilorum formam accedunt; & si à longè conspiciatur hæc Avis, pilis potiùs quam pennis vestita videtur. Ala, quæ quidem plumis denudata trium pollicum longitudinem non attingit, quinque conflatur remigum scapis pinnulis destitutis, splendidè nigris, paululùm arcuatis, & quorum major undecim pollicum longitudine pollet. Caudâ caret hæc Avis. Oculorum irides eleganti imbuuntur Topazii colore. Rostrum nigrum, ad basim

partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les jambes & les côtés sont couverts de plumes noires, toutes décomposées, c'est-à-dire que leurs barbes sont séparées les unes des autres, & n'ont entr'elles aucune connexion. La plupart de ces plumes sont placées deux à deux dans chacun des alveoles; il y en a cependant quelques-uns dont il ne sort qu'une seule plume. Les tiges de toutes ces plumes sont plattes, d'un noir brillant, & garnies en-dessous de nœuds, de chacun desquels part une barbe, qui est ordinairement fort longue. Sur le croupion sont même quelques plumes qui ont jusqu'à quatorze pouces de longueur. Toutes ces plumes ressemblent beaucoup à des poils; & si on le regarde d'un peu loin, cet Oiseau paroît être couvert plutôt de poils que de plumes. L'aîle, qui denuée de plumes n'a pas trois pouces de long, est composée de cinq tiges de plumes dégarnies de barbes, d'un noir-brillant, un peu courbées en arc, & dont la plus grande a onze pouces de longueur. Cet Oiseau n'a point de queue. L'iris de ses yeux est d'une belle couleur de Topaze. L'ouverture des oreilles est grande, & entourée de petites plu-

mes noires. Les narines ſont placées ſur le demi-bec ſupérieur aſſez près de ſon extrémité. Les bords des deux mandibules ſont un peu échancrés de chaque côté vers leur bout. Le bec eſt d'un gris-brun. Les pieds qui ſont fort gros, ſont d'un gris-jaunâtre ; & les ongles noirs. La partie de la jambe qui eſt dégarnie de plumes eſt extrêmement courte. On le trouve aux *Indes Orientales. Du cabinet de M. de Reaumur.*

lore. Aurium foramina ampla, plumulis nigris circumdata. Nares in mandibula ſuperiore prope ipſius extremitatem ſitæ ſunt. Mandibulæ binæ apice utrinque nonnihil emarginatæ. Roſtrum griſeo-fuſcum. Pedes, qui quidem craſſiſſimi, griſeo-flavicantes ; ungues verò nigri. Crurum pars inferior plumis denudata valde brevis eſt. Habitat in *India Orientali. Ex muſeo Realmuriano.*

SECTION III.

Ceux qui ont quatre doigts, ſçavoir trois devant & un derriere.

CETTE ſection eſt compoſée d'un ſeul genre, ſçavoir de celui du *Dronte.*

Cet Oiſeau a le bec long & fort ; le bout de ſes deux mandibules eſt crochu.

LXV.

Le genre du Dronte. (1).

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

(1) *Dronte*, nom que les Habitans de l'*Iſle Maurice* donnent à l'eſpece de ce genre.

SECTIO III.

Eæ quæ digitos habent quatuor, tres ſcilicet anticos, poſticum unum.

UNICO genere, *Raphi* ſcilicet, conſtituitur hæc ſectio.

Avis iſta roſtro donatur longo, valido, cujus utriuſque mandibulæ apex eſt aduncus.

LXV.

Genus Raphi. (1).

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :

(1) *Raphus*, nomen à *Mochringio* huic generi inditum.

Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum longum, validum :
Utriuſque mandibulæ apex aduncus :
Alæ, pro corporis mole, exiguæ, & volatui inutiles.

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec long & fort :
Le bout des deux mandibules crochu :
Les aîles petites à proportion de la groſſeur du corps, & point propres pour le vol.

1. Le Dronte.

Raphus pennis griſeis in toto corpore veſtitus ; remigibus, rectricibuſque flavo-cinereis ; capite cucullato . . . . . Raphus.

Raphus. *Moehr. Avi. Gen.* 57.
Struthio pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis. Struthio cucullatus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 86. *ſp.* 4.
Gallinaceus Gallus peregrinus. *Cluſ. Exot. Lib. V. Cap. IV. pag.* 99. *hujus icon peſſima pag.* 100.
Cignus cucullatus, ſeu Gallus Gallinaceus peregrinus Cluſii. *Euſ. Nieremb. pag.* 232. *hujus icon à Cluſio mutuata pag.* 231.
Jonſt. Avi. pag. 122. *hujus icon à Cluſio mutuata Tab.* 56.
Cygnus cucullatus Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 37. *N°.* 4.
Cygnus cucullatus Nierembergii, ſive Gallus Gallinaceus peregrinus Cluſii. *Willugh. Ornith. pag.* 107. *hujus icon à Bontio mutuata Tab. XXVII, ſub titulo*, Dodo.
Dronte, aliis Dod-aers. *Bont. Ind. Ori. pag.* 70, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Dodo Luſitanorum, Cygnus cucullatus. *Charlet. Exer. pag.* 117. *N°. XV.*
Charlet. Onomazt. pag. 113. *N°. XV.*
Les Portugais l'appellent Dodo. *Jonſt. Charlet.*
Les Hollandois, Walgh-Vogel. *Cluſ. Nieremb. Jonſt. Willugh.*
Les Anglois, Dodo. *Willugh. Raj. Charlet.* Monk-Swan of S. Maurice's Iland. *Charlet.*
Les Habitans de l'Iſle Maurice, Dronte. *Bont.*

Craſſitie *Cygnum* paululùm antecellit. Roſtrum habet longiſſimum & validum ; cujus utriuſque mandibulæ apex aduncus. Pes quatuor

Il eſt un peu plus gros qu'un *Cygne*. Son bec eſt très-long & fort ; & le bout de ſes deux mandibules eſt crochu. Son pied a un peu plus de quatre pouces

de long, & près de quatre pouces de circonférence. Celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a environ trois pouces de long : les latéraux ſont un peu plus courts ; & celui de derriere a deux pouces neuf lignes de longueur ; car ſon ongle eſt le plus long de tous. Sa tête eſt groſſe, mal faite, & couverte d'une membrane qui repréſente aſſez bien un capuchon. Tout ſon corps eſt couvert de plumes griſes, aſſez douces au toucher. Ses aîles, qui ſont extrêmement courtes, ſont compoſées de quelques plumes d'un jaune-cendré. Les plumes de la queue, qui ſont friſées, ſont de la même couleur. (Selon *Cluſius* les plumes de l'aîle & les jambes ſont noires). Ses yeux ſont grands & noirs. Les coins de la bouche s'étendent bien au-delà des yeux ; ce qui rend ſon ouverture extrêmement grande. Le bec eſt d'un bleu clair ou blanchâtre, excepté le bout du demi-bec ſupérieur, qui eſt jaunâtre, & celui du demi-bec inférieur, qui eſt noirâtre. Les pieds ſont jaunâtres ; & les ongles noirs. On le trouve dans l'*Iſle Maurice* en *Afrique*.

pollicum longitudinem non nihil excedit ; & ipſius circumferentia quatuor pollices ferè adæquat. Trium digitorum anticorum medius cum ungue tres circiter pollices longus eſt : laterales paulò ſunt breviores ; poſticus autem duos pollices & novem lineas longus ; ungue enim omnium longiſſimo donatur. Caput habet craſſum, deforme, quâdam coopertum membranâ cucullum referente. In univerſo corpore mollibus veſtitur plumis griſeis. Alæ, quæ quidem valdè breves, quibuſdam conſtant remigibus flavo-cinereis. Caudam componunt rectrices concolores & criſpæ. (Secundùm *Cluſium* remiges & crura nigri ſunt coloris). Oculi magni ſunt & nigri. Oris anguli ultra oculos multùm protenduntur ; unde fit rictus valde patulus. Roſtrum dilutè cœruleum ſive cœruleo-albicans, attamen in mandibulæ ſuperioris extremitate flaveſcens, in mandibulæ inferioris apice nigricans. Pedes flaveſcentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Mauritia*, *Africæ Inſula*.

ORDO XVI.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2
Echelle de 2. Pieds.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Autruche.

2. Casoar.

ORDO XVI. ORDRE XVI.

AVES *LES OISEAUX*

Digitis tribus anticis, membranis deſtitutis ; digito poſtico nullo : cruribus in parte inferiore plumis denudatis : aliſque ſat magnis, & volatui idoneis præditæ.

Qui ont trois doigts devant ; dénués de membranes ; & point de doigt derriere : la partie inférieure des jambes dénuée de plumes : & les aîles aſſez grandes, & propres pour le vol.

HUJUS Ordinis Avium aliæ roſtrum habent conico-incurvum : aliæ roſtrum rectum, in apice craſſius; inter quas aliæ roſtro donantur longiſſimo: aliæ roſtro brevi præditæ ſunt. Hujus Ordinis Aves in tres ſectiones dividimus : in prima continentur illæ quæ roſtrum habent conico-incurvum, ut *Otis* : in ſecunda eæ quæ roſtro donantur recto & longiſſimo, in apice craſſiori, ut *Himantopus*, *Oſtralega* : in tertia tandem illæ quæ roſtrum habent rectum & breve, in apice craſſius, ut *Pluvialis*.

PARMI les Oiſeaux de cet Ordre les uns ont le bec en cone courbé : & les autres ont le bec droit & renflé vers le bout. De ces derniers les uns ont le bec très-long : & les autres ont le bec court. Les Oiſeaux de cet Ordre ſe diviſent en trois ſections : dans la premiere ſont ceux qui ont le bec en cone courbé, comme l'*Outarde* : dans la ſeconde ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout, comme l'*Echaſſe*, l'*Huitrier* : & dans la troiſiéme ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout, comme le *Pluvier*.

SECTION I.

Ceux qui ont le bec en cone courbé.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de l'*Outarde.*

LXVI.

Le genre de l'Outarde.

Son caractere est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes ; & point de doigt derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone courbé.

SECTIO I.

Eæ quæ rostro donantur conico-incurvo.

UNICUM genus, *Otidis* scilicet, hanc sectionem constituit.

LXVI.

Genus Otidis.

Hujus character est
Digiti tres antici, membranis destituti ; digitus posticus nullus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum conico-incurvum.

** 1. L'OUTARDE.

Otis superne nigricante, fulvo & rufescente transversim striata, infernè alba, cum leviſſima fulvi mixtura ; (capite, gutture & collo dilutè cinereis *mas*) ; rectricibus tæniis transversis nigris versùs apicem notatis . . . . OTIS.

Otis jugulo utrinque cristato. Tarda. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 85. *sp.* 1.
Otis. *Gesn. Avi. pag.* 484.
Moehr. Avi. Gen. 58.
Otis sive Tarda. *Jonst. Avi. pag.* 42. *hujus duæ icones, una à Gesnero, altera ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.*
Otis seu Tarda Avis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 85. *hujus icon non satis accurata pag.* 89 ; *& insuper altera icon à Gesnero mutuata pag.* 88.
Otis seu Tarda Avis Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 58. *N°. A.* 1.

Otis, Tarda Avis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 129. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
Otis Aristotelis : Recentiorum Tarda vel Bistarda. *Gesn. icon. Avi. pag.* 67, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Otis, Tarda & Bistarda. *Charlet. Exer. pag.* 82. *N°. VIII.*
Charlet. Onomazt. pag. 73. *N°. VIII.*
Otis Græcis; Tarda Isidoro; Bistarda Alberto. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 289.
Otis, seu Tarda Isidori & Aldrovandi; Bistarda Alberti magni; Anser Trappa. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol pag.* 401.
Tarda Pyrenaica, fulva, maculis nigricantibus, marginibus pennarum roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. IX. sp.* 1.
Tarda. *Frisch. hujus icon accurata Tab.* 106.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 64. *sp.* 1.
Tarda simpliciter. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 1.
Tarda Recentiorum. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 355.
Tarda vel Bistarda. *Gesn. Avi. pag.* 486, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Tetrax vel Tarax Nemesiani. *Gesn.*
Tetraon Longolio. *Schwenck. Charlet. Klein.*
Erythrontaon Olai magni. *Schwenck. Charlet. Klein.*
Outarde. *Alb. Tom. III. pag.* 16; *avec des figures mal coloriées, du mâle Pl.* 38, *& de la femelle Pl.* 39.
Edwards. Tom. II. pag. LXXIII & LXXIV; avec des figures exactes, du mâle Pl. 73, *& de la femelle Pl.* 74.
Otarde. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag.* 101; *avec une figure exacte Pl.* 51.
Ostarde. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 235; *avec une mauvaise figure pag.* 236.
Ostarde, Houtarde, Bistarde. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 56 *a*, *dans laquelle est la même figure.*
An *hujus speciei junior*, Oedicnemo congener? *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 101. *hujus icon non satis accurata pag.* 102.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. XI.*
Oedicnemo congener Aldrovandi. *Jonst. Avi. pag.* 43.
Les Hébreux l'appellent ALHABARI. *Aldrov.*
Les Grecs, Οτις; Ω'τός *Bel. Schwenck.* Ωτιδα; Οτιδα. *Aldrov.* Τέτριξ; Ο"υραξ. *Schwenck.*
Les Italiens, STARDA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, TRAPP. *Gesn. Aldrov. Rzac. Frisch.* TRAPPE. *Schwenck. Rzac.* ACKER-TRAPP. *Gesn.* ACKER TRAPPE. *Schwenck.*
Les Flamands, TRAPP-GANSS. *Gesn. Aldrov.* TRAPP-GANS. *Schwenck.*

Les Illyriens, DROFA. *Geſn. Aldrov.*
Les Polonois, DROP. *Rzac.*
Les Suédois, TRAPP. *Linn.*
Les Anglois, BUSTARD. *Geſn. Willugh. Charlet. Alb.* BISTARD. *Geſn. Aldrov.*
Les Ecoſſois, GUSTARD. *Aldrov.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'un *Dindon*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de trois pieds un pouce, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces trois lignes de long ; ſa queue neuf pouces ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes ; ſon pied ſix pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur un pouce neuf lignes, & l'intérieur un pouce ſix lignes. Elle a ſix pieds huit pouces de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, la gorge & le col ſont d'un cendré clair. De chaque côté de la mâchoire inférieure partent de longues plumes de la même couleur, dont quelques-unes ont juſqu'à trois pouces de long, & qui forment une eſpece de barbe. Le tour des yeux eſt d'un blanc-rouſſâtre. Toute

Craſſitie *Gallo-pavonem* circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes & duos pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & totidem lineas longum eſt ; cauda novem pollices ; pars crurum plumis denudata quindecim lineas ; pes ſex pollices ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus unum pollicem cum novem lineis, intimus octodecim lineas. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſex pedum & octo pollicum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput, guttur & collum ſunt dilutè cinerea. Ex utroque mandibulæ inferioris latere longæ oriuntur pennæ pariter dilutè cinereæ, quarum quædam trium pollicum longi-

tudine pollent, quæque quodammodo barbam constituunt. Oculorum ambitus ex albo rufescit. Tota dorsi superficies, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ maculis, tæniisque variegantur nigricantibus, fulvis & rufescentibus, aliis irregularibus, alteris transversis, strictioribus & à se invicem non multùm remotis. Uropygium maculis pariter & tæniis transversis nigricantibus & rufis varium. Superiores caudæ tectrices sunt rufæ, tæniis quibusdam striatæ transversis nigricantibus, inter quas minutæ quædam disseminantur maculæ similiter nigricantes. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferioresque caudæ tectrices albent & aliquid fulvi admixtum habent. Pennæ alas subtus obtegentes sunt penitùs candidæ. Tectrices alarum superiores majores & minores à corpore remotiores cinereo-albæ. Ala notha eodem imbuitur colore; hujus tamen extima penna in latere exteriore & apice fusca est, & rufescente terminatur. Universum corpus sub pennis lanugine roseâ obducitur.

la surface du dos, les plumes scapulaires, ainsi que les grandes & les petites couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps, sont variées de noirâtre, de fauve & de roussâtre par taches & bandes, les unes irrégulieres, les autres transversales, assez étroites & proches les unes des autres. Le croupion est varié de même de noirâtre & de roux par taches & bandes transversales. Les couvertures du dessus de la queue sont rousses, & rayées de quelques bandes transversales noirâtres, entre lesquelles sont parsemées quelques petites taches de la même couleur. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de fauve. Les couvertures du dessous des aîles sont tout-à-fait blanches. Les grandes & les petites du dessus les plus éloignées du corps sont d'un gris-blanc. L'aîle bâtarde est de la même couleur, excepté le côté extérieur & le bout de la plume la plus extérieure, qui sont bruns, le bout étant terminé de roussâtre. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. L'aîle en composée de vingt-six plumes: les neuf premieres sont

noirâtres : les ſept ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la ſeiziéme incluſivement, ſont blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, le reſte étant noirâtre : la dix-ſeptiéme & la dix-huitiéme ſont blanches dans toute leur longueur, & tachetées de noirâtre & de rouſſâtre depuis environ les deux tiers de leur longueur juſqu'à leur extrémité : les trois ſuivantes, ſçavoir depuis la dix-neuviéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont blanches à leur origine, mais dans le reſte de leur longueur leur côté extérieur eſt roux & rayé de bandes tranſverſales & en zigzags noirâtres, & leur côté intérieur eſt d'un blanc tacheté de brun : enfin les cinq plus proches du corps ſont rayées tranſverſalement de roux & de noirâtre. Dans quatre des plumes de l'aîle, ſçavoir la troiſiéme, la quatriéme, la cinquiéme & la ſixiéme, les barbes extérieures deviennent ſubitement beaucoup plus courtes que les autres, & cela vers l'endroit où finiſſent leurs couvertures. La queue eſt compoſée de vingt plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-blanc à leur origine ; le reſte de leur longueur eſt roux & marqué vers le bout de deux ban-

Viginti ſex remigibus ala conflatur : novem primores nigricant : ſeptem quæ ſequuntur, à decima ſcilicet ad decimam ſextam uſque incluſivè, ab ipſarum exortu ad duas ciciter tertias longitudinis partes uſque candidæ, in reliqua longitudine nigricantes : decima ſeptima & decima octava per totam longitudinem albæ, nigricante & rufeſcente à duabus circiter tertiis longitudinis partibus ad apicem uſque maculatæ : tres proximè ſequentes, à decima nona ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, in exortu candidæ, per reliquam autem longitudinem in latere exteriore rufæ, tæniis tranſverſis & undatis nigricantibus ſtriatæ, in interiore candidæ, fuſcis maculis variæ : quinque tandem corpori finitimæ rufo & nigricante tranſverſim ſtriatæ. Quatuor remigum, tertiæ ſcilicet, quartæ, quintæ & ſextæ, pinnulæ exteriores fiunt ſubitò cæteris multò breviores eum versùs locum, in quo ipſarum tectrices deſinunt. Caudam componunt viginti rectrices, quarum binæ intermediæ ſunt in exortu cinereo-albæ, in reliqua longitudine rufæ, versùs api-

cem duabus insignitæ tæniis transversis nigris, inter quas, sicut & supra & infra illas, minutæ disseminantur maculæ similiter nigræ : utrinque proximè sequens in exortu candida, dein rufa, duabus insignita tæniis transversis nigris, quarum una rufum colorem distinguit, altera infra eumdem colorem collocatur; binas inter tænias istas nigras quædam disseminantur maculæ concolores; & tandem rectrix albo ad fulvum dilutum inclinante terminatur : tres utrinque sequentes, tertia scilicet, quarta & quinta, sunt in exortu candidæ, dein rufo imbutæ colore, quem colorem sequitur tænia transversa nigra, supra quam tæniam quædam extant maculæ concolores in rufo colore positæ; unaquæque tandem rectrix albo ad fulvum dilutum vergente terminatur : utrinque sexta & septima sunt in exortu candidæ, dein albo-fulvæ, binis tæniis transversis nigricantibus notatæ : tres utrinque extimæ in exortu albæ, dein ex albo ad fulvum dilutissimum inclinantes, & tæniâ transversâ nigricante insignitæ. Oculorum irides elegantes aurantiæ. Rostrum griseo-

des transversales noires, entre lesquelles, ainsi qu'au-dessus & au-dessous desquelles, sont semées çà & là de petites taches de la même couleur : celle qui les suit immédiatement de chaque côté, est blanche à son origine, ensuite rousse & marquée de deux bandes transversales noires, l'une placée sur le roux & l'autre au-dessous de cette couleur; entre ces deux bandes noires sont semées quelques taches de la même couleur; & enfin la plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair : les trois suivantes de chaque côté, sçavoir la troisiéme, la quatriéme & la cinquiéme, sont blanches à leur origine, ensuite rousses, cette couleur étant suivie d'une bande transversale noire, au-dessus de laquelle sont quelques taches de la même couleur placées sur le roux; après quoi chaque plume est terminée d'un blanc tirant sur le fauve clair : la sixiéme & la septiéme de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc-fauve, sur lequel sont deux bandes transversales noirâtres : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches à leur origine, ensuite d'un blanc tirant sur le fauve très-clair, & marqué d'une bande transversale noirâtre. L'i-

ris des yeux eſt d'un bel orangé. Le bec eſt d'un gris-brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont cendrés; & les ongles, qui ſont convexes en-deſſous comme en-deſſus, ſont gris.

La *femelle* différe du *mâle* par ſa grandeur, qui eſt beaucoup moindre. Elle en différe encore en ce qu'elle n'a point aux côtés de la mâchoire inférieure ces longues plumes qui forment une barbe au *mâle*. Deplus ſa gorge & les côtés de ſa tête ſont bruns. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont de la même couleur que le dos, lequel n'eſt pas de couleurs ſi vives que dans le *mâle*. La partie inférieure du col eſt cendrée. Le bord de l'aîle eſt noir. Du reſte elle reſſemble parfaitement au *mâle*.

Elles ſe nourriſſent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ſuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque cinerei; ungues verò, qui quidem ſicut ſuperne ita & infernè convexi, ſunt griſei.

Fœmina à *mare* diſcrepat magnitudine, quâ ei multò cedit. Ab illo præterea differt in eo quod in utroque maxillæ inferioris latere longis iſtis careat pennis barbam in *mare* conſtituentibus. Guttur inſuper & caput ad latera fuſca ſunt. Partes capitis & colli ſuperiores dorſo concolores; dorſum autem coloribus imbuitur non ita quàm in *mare* vîvidis. Collum inferius cinereum. Margines alarum nigræ. In reliquis cum *mare* perfectè convenit.

Herbis & ſeminibus victitant. Habitant in campeſtribus locis. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 2. La petite Outarde, appellée vulgairement Canne-petiere.

Voyez Pl. II. le mâle Fig. 1, *& la femelle Fig.* 2.

Otis ſuperne nigro, fulvo, rufeſcente & albo eleganter variegata, infernè alba, (ad latera nigro tranſverſim ſtriata; pectore albo-rufeſcente, tæniis nigricantibus vario *fœmina*); (collo nigro, torque albo cincto *mas*); rectricibus tæniis tranſverſis

transversis nigricantibus notatis . . . . OTIS MINOR, ANAS CAMPESTRIS VULGO DICTA.

Otis capite juguloque lævi. Tetrax. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 85. *sp.* 3.
Tarda nana. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 2.
Anas campestris. *Jonst. Avi. pag.* 43.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. IX.*
Anas campestris, Canne petiere Gallorum, seu Tetrax Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 96.
Anas campestris, Canne petiere Gallorum, seu Tetrax Bellonii, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 129.
Raj. Syn. Avi. pag. 59. *N°.* 2.
Ortygometra melina, maculis fuscis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp.* 3.
Stella. *Charlet. Exer. pag.* 83. *N°. X.* (*fœmina*).
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. X.* (*fœmina*).
Stella Avis. *Jonst. Avi. pag.* 43. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVI.* (*fœmina*).
Stella Avis dicta. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 98. *hujus icon minùs accurata pag.* 97. (*fœmina*).
Stella Avis Aldrovandi. *Willugh. Ornith. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXXII.* (*fœmina*).
Canne petiere. *Gesn. Avi. pag.* 795.
Bel. Hist. nat. des Ois. pag. 237 ; *avec une mauvaise figure de la femelle pag.* 238.
Canne petiere, nommée par aucuns, Olive. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 56 *b*, *dans laquelle est la même figure.*
Canard de pré de France. *Alb. Tom. III. pag.* 17 ; *avec une figure mauvaise & mal coloriée de la femelle Pl.* 41.
Petite Outarde. *Edwards. Glanur. pag.* 89. *Chap. XLI* ; *avec une figure exacte de la femelle Pl.* 251.
Les Italiens l'appellent FASANELLA. *Bel.*
Les Anglois FRENCH FIELD DUCK. *Alb.* LITTLE BUSTARD. *Edwards.*
Les Barbares, RHAAD, *ou* SAF-SAF. *Edwards.*

Cum *Phasiano* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem & quinque pollices explet, & ad extremos ungues unum

Elle est à peu près de la grosseur du *Faisan*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied six pouces.

Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſeize lignes de long; ſa queue quatre pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, onze lignes; ſon pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Elle a deux pieds huit pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes noires, marquées chacune d'une ligne rouſſâtre qui s'étend ſelon la longueur de ſa tige. Les côtés de la tête & la gorge ſont d'un rouſſâtre très-clair, varié de petites taches longitudinales noirâtres. Le col eſt noir; cependant au-deſſous de la gorge eſt un collier blanc, qui remonte des deux côtés, en ſe rétréciſſant, juſque vers le derriere de la tête. Au-deſſous de ce collier le noir eſt parſemé de quelques taches rouſſâtres: enſuite eſt une bande tranſverſale blanche, au-deſſous de laquelle, vers la poitrine, eſt une autre bande tranſverſale noire. Le dos & le croupion ſont joli-

pedem & ſex pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſexdecim lineas longum eſt; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata undecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum octo pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Partem capitis ſuperiorem veſtiunt pennæ nigræ, lineâ rufeſcente, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, notatæ. Caput ad latera, & guttur dilutiſſimè rufeſcunt, minutiſque variegantur maculis longitudinalibus nigricantibus. Collum nigrum eſt; attamen infra guttur extat torquis albus, utrinque versùs partem capitis poſteriorem aſſurgens, quique, ſic procedendo, fit ſtrictior. Infra torquem iſtum maculis quibuſdam rufeſcentibus aſpergitur color niger: deinde ſequitur tænia tranſverſa can-

dida, quam iterùm sequitur altera tænia transversa nigra, versùs pectus posita. Dorsum & uropygium nigro, fulvo, rufescente & pauco albo eleganter variegantur, coloribus istis per minutissimas tænias undatas dispositis, majusculisque maculis nigris iterùm variegatis. Pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur; majores tamen caudæ tectrices superiores sunt penitùs candidæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque alarum tectrices albent. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt similiter albæ, sed nigro transversim striatæ. Universum corpus sub pennis lanugine roseâ obducitur. Superiores alarum tectrices minimas & medias variegant iidem colores ac isti quibus dorsum ipsum variegatur; in illis tamen color niger majusculas maculas non efformat : tectrices majores à corpore remotiores sunt nigricantes, albo terminatæ; reliquæ majores tectrices, sicut & minimæ alæ articulum carpo humano respondentem cooperientes, candidæ; majores tamen cor-

ment variés de noir, de fauve, de roussâtre & d'un peu de blanc, & cela par très-petites bandes en zigzags, le tout mêlé d'assez grandes taches noires. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs; cependant les plus grandes couvertures du dessus de la queue sont tout-à-fait blanches. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous de la queue sont de la même couleur, & rayées transversalement de noir. Le duvet sous toutes les plumes du corps est de couleur de rose. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont variées des mêmes couleurs que le dos, excepté que le noir n'y est pas répandu par grandes taches : les grandes couvertures les plus éloignées du corps sont noirâtres & terminées de blanc; les autres grandes couvertures, ainsi que les plus petites qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, sont blanches; cependant des grandes les plus proches du corps sont variées d'un peu de brun le long de leur tige. Le bord de l'aîle au-dessous du pli qui ré-

pond à celui du poignet, eſt blanc. L'aîle bâtarde eſt de la même couleur. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſept plumes : les quatre premieres ſont blanches à leur origine, & noirâtres dans le reſte de leur longueur : les ſix ſuivantes, ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une large bande tranſverſale noirâtre : les dix qui ſuivent ces dernieres, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont tout-à-fait blanches : la vingt-uniéme eſt de la même couleur, mais elle eſt variée dans ſon milieu de bandes tranſverſales & en zigzags fauves & noirâtres : enfin les ſix plus proches du corps ſont variées des mêmes couleurs que les plumes ſcapulaires, mais diſtribuées par plus larges bandes. Ces dernieres plumes, lorſque l'aîle eſt pliée, vont auſſi loin que les plus grandes, & s'étendent, comme elles, un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue eſt compoſée de dix-huit plumes, dont les quatre du milieu ſont fauves, & marquées de larges bandes tranſverſales noirâtres, entre leſquelles ſont d'autres petites bandes de la même couleur, qui ſuivent dipori finitimæ paululùm fuſci ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem admixtum habent. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, albæ. Ala notha eodem colore imbuta. Alam componunt viginti ſeptem remiges : quatuor primores ſunt in exortu candidæ, in reliqua longitudine nigricantes : ſex quæ ſequuntur, à quinta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, albæ, latâ tæniâ tranſversâ nigricante versùs ipſarum extremitates inſignitæ : decem iſtis ultimis proximæ, ab undecima ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, penitùs candidæ : vigeſima prima eodem candore nitens, tæniis tamen tranſverſis & undatis fulvis & nigricantibus in ipſius medio variegata : ſex tandem corpori viciniores iiſdem coloribus ac ſcapulares pennæ variegantur, qui tamen colores tænias latiores efformant. Noviſſimè dictæ rectrices, dum ala complicatur, majorum rectricum extremitates attingunt, & illarum inſtar, nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Octodecim rectricibus cauda conflatur :

quatuor intermediæ fulvæ, latis notatæ tæniis transversis nigricantibus, quas inter aliæ extant exiguæ tæniæ concolores, secundùm varias directiones positæ : reliquæ omnes rectrices candidæ, exiguis similiter notatæ tæniis nigricantibus, secundùm varias directiones quoque positis, & latâ insuper tæniâ transversâ eodem colore imbutâ, versùs ipsarum extremitatem sitâ, insignitæ. Rectrix quatuor intermediis utrinque proxima aliquid quoque fulvi admixtum habet. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque grisei.

Fœmina coloribus paululùm à *mare* differt. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ nigro & rufescente longitudinaliter variæ. Collum rufescens, quælibet tamen penna in medio secundùm scapi longitudinem fusca. Guttur ex albo rufescit. Dorsum, uropygium & scapulares pennæ iisdem coloribus ac in *mare* variegantur, sed colores isti majores maculas efficiunt. Pectus est albo-rufescens, tæniis nigricantibus, aliis longitudinalibus, alteris transférentes directions : toutes les autres plumes sont blanches, marquées de même de petites bandes noirâtres, qui suivent différentes directions, & de plus d'une large bande transversale de la même couleur, placée vers l'extrémité de chacune de ces plumes. La plume qui de chaque côté est la plus proche des quatre du milieu, est aussi mêlée d'un peu de fauve. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris.

La *femelle* différe un peu du *mâle* par ses couleurs. La partie supérieure de sa tête est couverte de plumes variées longitudinalement de noir & de roussâtre. Le col est de cette derniere couleur, chaque plume étant brune dans son milieu tout le long de sa tige. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Le dos & le croupion, ainsi que les plumes scapulaires, sont variées des mêmes couleurs que dans le *mâle*, mais par plus grandes taches. La poitrine est d'un blanc-roussâtre, varié de bandes noirâtres, les unes lon-

gitudinales, les autres tranſverſales. Le ventre & le haut des jambes, ainſi que les couvertures du deſſous des aîles, ſont blancs. Les côtés, & les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue ſont d'un blanc rayé tranſverſalement de noirâtre. Les plumes de l'aîle & ſes couvertures ſupérieures, qui ſont blanches dans le *mâle*, ſont dans la *femelle* d'un blanc rayé tranſverſalement de noirâtre. Du reſte elle reſſemble au *mâle*.

Elles ſe nourriſſent d'herbes & de graines. On les trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

verſis, varium. Venter, crurum ſuprema pars, inferioreſque alarum tectrices albent. Latera, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores ſimiliter candidæ, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Alarum remiges, ſicut & ipſarum ſuperiores tectrices, quæ in *mare* albicant, in *fœmina* albent quidem, ſed nigricante tranſverſim ſtriantur. In reliquis cum *mare* convenit.

Herbis & ſeminibus victitant. Habitant in campeſtribus locis. *Ex muſeo Realmuriano.*

3. L'Outarde d'Arabie.

Otis criſtata, ſuperne rufeſcens, nigricante tranſverſim ſtriata, infernè alba; criſtâ & tæniâ ſupra oculos nigris; gutture & collo inferiore cinereis, fuſco tranſverſim ſtriatis; rectricibus tæniis tranſverſis nigris versùs apicem notatis.... Otis Arabica.

Otis auribus erecto-criſtatis. Tarda Arabs. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10, *Gen.* 85. *ſp.* 2.
Tarda Mechaenſis Arabica. *Klein. Avi. pag.* 18. *N°.* 3.
Outarde d'Arabie. *Edwards. Tom. I. pag. XII; avec une figure très-exacte Pl.* 12.
On l'appelle à Mocha, dans l'Arabie heureuſe, Lohong. *Edwards.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur de la *nôtre*; mais elle a les jambes & le bec plus longs, & le col plus delié. Son bec de-

Otidem noſtratem craſſitie circiter æmulatur; ſed cruribus & roſtro longioribus, colloque graciliori donatur.

Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est. Capitis anterior pars albicat. In utroque capitis latere tænia extat longitudinalis nigra, prope rostri exortum orta, supra oculos ducta, & longiusculas pertingens pennas similiter nigras, elegantem cristam efficientes. Capitis posterior pars, collum superius, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt rufescentes, nigricante transversim striatæ. Guttur & collum superius cinerea, lineolis transversis fuscis striata. Pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ albæ. Quæ caudam subtus obtegunt, tectricesque alarum inferiores eodem albore nitent. Superiores minores & majores corpori finitimæ sunt dorso concolores, quælibet tamen tectrix maculâ albâ lunulatâ terminatur : minores à corpore remotiores, sicut & alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, albæ, quibusdam minutis maculis nigris respersis : majores tandem à corpore remotiores, sicut & alæ nothæ pennæ,

puis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long. La partie antérieure de la tête est blanche. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, passe par-dessus les yeux, & va joindre de longues plumes de la même couleur, qui forment une jolie hupe. Le derriere de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un cendré rayé de petites lignes transversales brunes. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites & les grandes couvertures du dessus des aîles les plus proches du corps sont de la même couleur que le dos, & terminées chacune par une tache blanche en forme de croissant : les petites les plus éloignées du corps, ainsi que le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, sont blanches, quelques unes étant parsemées de petites taches noires : enfin les grandes les plus éloig-

nées du corps & les plumes de l'aîle bâtarde ſont noires, & terminées de blanc. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les ſuivantes ſont variées de noir & de blanc par petites taches : & les plus proches du corps ſont d'un rouſſâtre rayé tranſverſalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue ſont de la même couleur que ces dernieres plumes de l'aîle : les latérales ſont blanches & un peu variées des mêmes couleurs que celles des deux du milieu ; elles ſont de plus marquées chacune vers leur bout d'une large bande tranſverſale noire. L'iris des yeux eſt d'un brun obſcur. Le bec eſt de couleur de corne claire, qui s'obſcurcit un peu vers le bout du bec. Les narines ſont oblongues, & placées vers l'origine du demi-bec ſupérieur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un brun clair. On la trouve aux environs de *Mocha* dans l'*Arabie heureuſe*.

nigræ, albo terminatæ. Remiges alarum majores nigræ : ſequentes albo & nigro variæ, albore & nigredine exiguas maculas efformantibus : corpori viciniores rufeſcentes, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Binæ rectrices intermediæ noviſſimè deſcriptis remigibus concolores : laterales candidæ, iiſdem coloribus ac binæ intermediæ tinguntur, paululùm variegatæ, latâ inſuper tæniâ tranſversâ nigrâ versùs ipſarum extremitatem notatæ. Oculorum irides obſcurè fuſcæ. Roſtrum dilutè corneo tinctum colore, versùs roſtri apicem nonnihil obſcuriore. Nares oblongæ, & versùs mandibulæ ſuperioris exortum collocatæ. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque dilutè fuſci. Habitat circa *Mocham* in *Arabia felice*.

SECTIO II.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petite Outarde ou Canne-petiere, mâle. 2. Petite Outarde ou Canne-petiere, femelle.

SECTIO II.

Eæ quæ rostro donantur recto, longissimo, in apice crassiori.

DUo in illa sectione continentur genera Avium, rostri formâ à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostro donantur cylindraceo, ut *Himantopus*: aliæ verò rostro lateraliter plano præditæ sunt, ut *Ostralega*.

LXVII.

Genus Himantopi.

Hujus character est
Digiti tres antici, membranis destituti; digitus posticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, longissimum, cylindraceum, in apice crassius.

SECTION II.

Ceux qui ont le bec droit, très-long & renflé vers le bout.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec cylindrique, comme l'*Echasse*: & les autres ont le bec applati par les côtés, comme l'*Huitrier*.

LXVII.

Le genre de l'Echasse. (1)

Son caractere est d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, très-long, cylindrique & renflé vers le bout.

(1) *Echasse*, nom que j'ai donné aux especes de ce genre à cause de la longueur de leurs jambes.

** 1. L'ECHASSE.

Voyez Pl. III. Fig. 1.

Himantopus candidus; dorso supremo & alis nigro-viridantibus; occipitio nigro; rectricibus decem intermediis ci-

nereo-albis, utrinque extimâ ferè penitùs candidâ . . . . .

HIMANTOPUS.

Himantopus caſtaneus, roſtro nigro, tibiis pedibuſque ſanguineis. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. II. ſp.* 2.

Himantopus. *Jonſt. Avi. pag.* 109. *maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab.* 52, *ſub titulo*, Hæmantopus.
Charlet. Exer. pag. 112. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 3.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 316. *N°.* 6. *hujus icon minimè accurata Tab.* 267.

Himantopus Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 443. *icones non ſatis accuratæ, maris pag.* 445, *& fœminæ pag.* 446.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 18. *hujus duæ icones minùs accuratæ, una Tab.* 11. *fig.* 1, *& altera Tab.* 13. *fig.* 2.
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 46. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 21.
Klein. Avi. pag. 22.

Himantopus Plinii, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 219. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 9.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 7.

Himantopus Maderaſpatanus, è nigro albente, cruribus rubris. *Raj. Syn. Avi. pag.* 193. *N°.* 1. *hujus icon non ſatis accurata Tab. I. fig.* 3.

Hæmatopus. *Geſn. Avi. pag.* 547, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Geſn. icon. Avi. pag. 137, *in qua eadem icon.*

Charadrius ſupra niger, ſubtus albus, roſtro nigro, capite longiore, pedibus rubris longiſſimis. Himantopus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 10.

Grand Chevalier d'Italie. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 53 *a*, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*
Les Grecs l'appellent Ιμαντόπους. *Bel.*
Les Italiens, MERLO AQUAIOLO GRANDE. *Bel.*
Les Allemands, FROEMBDER VOGEL. *Geſn.*
Les Flamands, MATHOEN. *Klein.*
Les Anglois, LONGLEGS. *Sloane. Raj.*
Les Anglois de la Jamaïque, RED LEGGED CRANE. *Raj.*

Il n'eſt pas ſi gros qu'un *Biſet*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de douze pouces trois lignes, & juſqu'à celui des on-

Columbæ Liviæ craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duodecim pollices & tres lineas æquat, & ad ex-

tremos ungues unum pedem sex pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est ; cauda tres pollices cum totidem lineis ; pars crurum plumis denudata tres pollices & quinque lineas ; pes quatuor pollices & sex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & septem lineas , extimus quindecim cum semi lineas, intimus quatuordecim lineas. Extimus digitus cum medio membranulâ, ad primum usque articulum protensâ , connectitur. Alis expansis , extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad duorum pollicum & quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput posterius nigrum est : nigredo autem , quæ per occipitium ducta , ab oculo ad oculum extenditur. Capitis anterior pars , guttur , collum , dorsum infimum , uropygium , pectus , venter , latera , crurum pars suprema , tectrices caudæ inferiores & minores superiores candore nitent. Majogles d'un pied six pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long ; sa queue trois pouces trois lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , trois pouces cinq lignes ; son pied quatre pouces six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , un pouce sept lignes , l'extérieur quinze lignes & demie , & l'intérieur quatorze lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane , qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol ; & ses aîles , lorsqu'elles sont pliées , s'étendent jusqu'à deux pouces quatre lignes au-delà du bout de la queue. La partie postérieure de la tête est noire : cette couleur s'étend depuis un œil jusqu'à l'autre , en passant par l'occiput. La partie antérieure de la tête , la gorge , le col , la partie inférieure du dos , le croupion , la poitrine , le ventre , les côtés , le haut des jambes , les couvertures du dessous de la queue & les petites du dessus sont d'un beau blanc. Les grandes couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos , les plumes scapulaires , & les

couvertures du deſſus & du deſſous des aîles ſont d'un noir qui a un certain luſtre de verd. Les plumes de l'aîle ſont noires, ayant auſſi un luſtre de verd, mais ſeulement en-deſſus du côté extérieur. Les moyennes plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'au bout de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-blanc; la plus extérieure de chaque côté eſt cependant preſque tout-à-fait blanche. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges; & les ongles ſont noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

res caudæ tectrices ſuperiores ſunt cinereo-albæ. Dorſi ſuprema pars, pennæ ſcapulares, alarumque tectrices ſuperiores & inferiores nigræ, quodam virore refulgentes. Remiges ſunt nigræ, cum quodam virore admixto, ſed tantùm ſuperne in latere exteriore. Minores remiges corpori finitimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad caudam extremam pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-albæ; utrinque tamen extima ferè penitùs candida. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat. *Ex muſeo Realmuriano.*

2. L'ECHASSE DU MEXIQUE.

Himantopus candidus; alis albo & nigro variis; capite ſuperiore nigro; rectricibus candidis . . . . . HIMANTOPUS MEXICANUS.

Comaltecatl. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 19. *Cap. XXII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 177.
Les Mexiquains l'appellent COMALTECATL. *Fern.*

Il eſt plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces,

Craſſitie præcedentem antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quindecim pollices æ-

quat, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices longum eſt; cauda tres pollices cum ſex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices & ſex lineas; pes quatuor pollices & ſeptem lineas; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas: laterales paulò ſunt breviores. Capitis pars ſuperior eſt nigra. Reliquum caput, guttur, collum, dorſum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem ſupremam veſtiunt pennæ candidæ. Tectrices caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Alæ ſuperne & infernè albo & nigro variegantur. Cauda duodecim conſtat rectricibus candidis. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes rubeſcentes; ungues verò nigricantes. Hyeme habitat in *Mexico*.

& juſqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; ſa queue trois pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, a auſſi trois pouces ſix lignes; ſon pied quatre pouces ſept lignes; & celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes: les latéraux ſont un peu plus courts. La partie ſupérieure de la tête eſt noire. Le reſte de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & les côtés ſont blancs. Les aîles ſont en-deſſus & en-deſſous variées de blanc & de noir. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rougeâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve pendant l'hiver au *Mexique*.

LXVIII.

Le Genre de l'Huitrier.

Son caractere eſt d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit, très-long, applati par les côtés, & renflé vers le bout.

LXVIII.

Genus Oſtralegæ.

Hujus character eſt
Digiti tres antici, membranis deſtituti; digitus poſticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Roſtrum rectum, longiſſimum, lateraliter planum, in apice craſſius.

** 1. L'HUITRIER, APPELLÉ VULGAIREMENT PIE DE MER.

Voyez Pl. III. Fig. 2.

Oſtralega ſuperne nigra, infernè & in uropygio alba; capite & collo nigris; minutâ maculâ infra oculos candidâ; rectricibus in exortu albis, apice nigris . . . . OSTRALEGA; PICA MARINA VULGO DICTA.

Oſtralega. *Klein. Avi. pag.* 23.
Hæmatopus. Oſtralegus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 81. *ſp.* 1.
Hæmatopus. *Geſn. Avi. pag.* 546.
Bell. Obſ. pag. 18.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 105. *N°. XI.*
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Faun. Suec. Linn. N°. 161.
Moehr. Avi. Gen. 89.
Hæmatopus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 447, *in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*
Jonſt. Avi. pag. 106.
Raj. Syn. Avi. pag. 105. *N°. A.* 7.
Hæmatopus Bellonii; Pica marina Gallorum & Anglorum. *Willugh. Ornith. pag.* 220. *hujus icon peſſima Tab. LV.*

Himantopus corpore gracili & adducto, rostro pedibusque rubentibus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. II. sp.* 3.

Pica marina. *Charlet. Exer. pag.* 76. *N°.* 4.
Charlet. Onomazt. pag. 68. *N°.* 4.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°. XVII.*
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 57. *sp.* 1.

Preneur d'Huitres. *Catesb. Tom. I. pag.* 85 ; *avec une figure assez exacte Pl.* 85.

Pie de mer. *Alb. Tom. I. pag.* 68 ; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 78.

Pie, ou Beccasse de mer. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 203, *dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Pie de mer, Beccasse de mer. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 46 *a*, *dans laquelle est la même figure.*

Oiseau appellé Hæmatopus marinus. *Feuillée. Journ. des Obs. phys. pag.* 289. (*ed.* 1725).

Les Grecs l'appellent Αἱματοπους. *Bel.*

Les Gothlandois, MARSPITT. *Linn.*

Les Oëlandois, STRANDFKJURA. *Linn.*

Les Anglois, SEA-PIE. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.* RED-SHANK. *Charlet.* OYSTER CATCHER. *Catesb.*

Crassitie *Cornicem* adæquat, superatve. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sesquilineam longum est; cauda quatuor pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & sex lineas, extimus quindecim lineas,

Il est pour le moins aussi gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne & demie de long; sa queue quatre pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce six lignes, l'extérieur quinze lignes, & l'intérieur treize lignes. Le doigt extérieur

eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & même un peu au-delà. Il a deux pieds ſept pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête, la gorge, le col, la partie ſupérieure du dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un beau noir; il y a cependant quelques plumes blanches mêlées à la partie ſupérieure du dos & parmi les ſcapulaires. Au-deſſous de chaque œil eſt une petite tache blanche. Il y a au-deſſous de la gorge une bande tranſverſale variée de blanc & de noir, qui s'étend de chaque côté du col ſans en faire le tour, & forme une eſpece de collier. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont noires: les moyennes ſont de la même couleur, & terminées de blanc: les grandes les plus proches du corps ſont tout-à-fait blanches, ſi l'on en excepte le côté extérieur qui eſt noirâtre vers l'origine de la plume

intimus tredecim lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum, & etiam nonnihil ultrà, productâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum ſeptem pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Caput, guttur, collum, pars dorſi ſuprema & ſcapulares pennæ nigri ſunt coloris; quædam tamen pennæ candidæ in dorſo ſupremo & inter ſcapulares immiſcentur. Infra utrumque oculum minuta adeſt macula candida. Infra guttur tænia extat tranſverſa albo & nigro variegata, in utroque colli latere protenſa, collum tamen non penitùs ambiens, & torquem quodammodo efficiens. Dorſum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, tectrices caudæ ſuperiores & inferiores, & pennæ alas ſubtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices minimæ ſunt nigræ: mediæ concolores, albo terminatæ: majores corpori finitimæ penitùs candidæ, excepto tamen latere

latere exteriore, in quo versùs ipsarum exortum tantùm nigricant : majores tandem à corpore remotiores penitùs nigræ. Remiges majores nigricantes ; omnes autem (primâ exceptâ, pauco albo notatâ) sunt in latere interiore maximâ parte candidæ, fusco marginatæ ; omnes quoque longâ notantur maculâ albâ, super scapum versùs ipsarum extremitatem posita : quæ macula eò magis in latere exteriore protenditur, quò remix fit corpori vicinior: minorum remigum primores albæ, nigricante terminatæ, qui color nigricans eò minus spatium occupat, quò remix fit corpori finitima : sequentes candidæ, sed ex istis quædam, illæ scilicet quæ corpori magis appropinquant, maculâ insigniuntur nigricante, in latere exteriore versùs ipsarum extremitatem positâ : corpori tandem viciniores nigræ sunt & immaculatæ. Ultimæ istæ majorum remigum longitudinem ferè adæquant, & dum ala complicatur, nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus albis, nigro terminatis ; color autem niger in illis eò minus spatium occupat, quò magis ad corporis latus accedit : in reliquis verò ultimis, quæ corpori sunt vicinissimæ, nullum omnino spatium occupat.

seulement : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont tout-à-fait noires. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres, & toutes (excepté la premiere, qui n'a que fort peu de blanc) ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche & bordée de brun ; toutes ont aussi une longue tache blanche, placée sur leur tige vers leur extrémité : cette tache s'étend d'autant plus sur le côté extérieur, que la plume est plus proche du corps : les premieres des moyennes sont blanches & terminées de noirâtre, cette derniere couleur occupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps : les suivantes sont blanches, quelques-unes de celles-là, sçavoir celles qui sont les plus près du corps, étant marquées d'une tache noirâtre, placée sur leur côté intérieur vers leur extrémité : enfin les plus proches du corps sont noires & sans taches. Ces dernieres sont presqu'aussi longues que les plus grandes plumes de l'aîle, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, un peu au-delà de la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches & terminées de noir ; cette derniere couleur occupe d'autant

moins d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure; car elle couvre la moitié de la longueur des deux du milieu, au lieu qu'elle n'occupe que le quart de la longueur de la plus extérieure de chaque côté. L'iris des yeux eſt jaune: les paupieres ſont rouges. Le bec eſt de la même couleur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un rouge de ſang; & les ongles ſont noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer, où il mange beaucoup d'*Huitres*; ce qui lui a fait donner le nom d'*Huitrier*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

cupat, quò rectrix exterior fit; duarum enim intermediarum mediam longitudinem obtegit, dum utrinque extimæ quartam tantùm longitudinis partem occupat. Oculorum irides luteæ: palpebræ rubræ. Roſtrum pariter rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſanguinei coloris; ungues verò nigricantes. Maris littora frequentat, ibique maximam *Oſtrearum* copiam devorat; unde *Oſtralegæ* nomen. *Ex muſeo Realmuriano.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec droit, court & renflé vers le bout.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Pluvier*.

LXIX.

Le genre du Pluvier.

Son caractere eſt d'avoir
Trois doigts devant, dénués de membranes; & point de doigt derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

SECTIO III.

Eæ quæ roſtro donantur recto, brevi, in apice craſſiori.

IN illa ſectione unicum continetur genus, ſcilicet *Pluvialis*.

LXIX.

Genus Pluvialis.

Hujus character eſt
Digiti tres antici, membranis deſtituti; digitus poſticus nullus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Echaße.

2. Huitrier.

Rostrum rectum, breve, in apice crassius.

Le bec droit, court, & renflé vers le bout.

** 1. Le Pluvier doré.

Voyez Pl. IV. Fig. 1.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavescentibus varia, infernè alba; collo inferiore & pectore grisеis, maculis flavescentibus variegatis; rectricibus nigricantibus, albo-flavicante transversim striatis . . . . . Pluvialis aurea.

Pluvialis cinereus, luteis & albis maculis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen VII. sp.* 1.

Pluvialis. *Gesn. Avi. pag.* 714. *hujus icon non satis accurata pag.* 715. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 528. *maris icon non satis accurata pag.* 531.

Pluvialis viridis. *Willugh. Ornith. pag.* 229. *hujus icon minùs accurata Tab. LVII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 2.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 9.

Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 318. *N°. X. hujus icon pessima Tab.* 269. *fig.* 1.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 61. *sp.* 2.

Pluvialis viridis, seu Pardalis. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 54. *hujus icon minimè accurata Tab.* 25.

Pluvialis viridis Gesneri; Pardalus tertius Schwenckfeldii; Vivago Bodini; Gallina novalis media. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 415.

Pluvialis flavescens. *Jonst. Avi. pag.* 113.

Pluvialis flavo-virescens. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°.* 2.

Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 2.

Pardalus tertius. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 317.

Gavia viridis. *Klein. Avi. pag.* 19. *N°.* 2.

Charadrius nigro lutescenteque variegato, pectore concolore. *Faun. Suec. Linn. N°.* 157.

Charadrius pedibus cinereis, corpore nigro viridique maculato, subtus albido. Pluvialis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 8.

Charadrius. *Moehr. Avi. Gen.* 90.

Gorriones o Pardales de Oviedo. *Raj. Sloane.*

Pluvier. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 260.

Pluvier verd. *Alb. Tom. I. pag.* 66; *avec une figure mal coloriée Pl.* 75.

Les Catalans l'appellent Dorada. *Barr.*

Les Italiens, Piviero. *Marsil.*

Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov. Jonſt.*

Les Allemands, PULVIER. *Geſn. Aldrov.* PULVER; PULROSZ. *Geſn. Aldrov. Jonſt.* SEE TAUBE; GROSSER BRACH-VOGEL. *Schwenck.* GREUNER KEUWIT. *Rzac.*

Les Siléſiens, BRACH-VOGEL. *Schwenck.*

Les Polonois, PTAK DESSCZOWY. *Rzac.*

Les Suédois, AOKERHOENS. *Linn.*

Les Dalécarliens, AOKERHOENA, *ou* AOKERHOENS. *Linn.*

Les Lapons, HUTTI. *Linn.*

Les Anglois, GREEN PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* WHISTLING PLOVER. *Charlet.*

Les Anglois de la Jamaïque, GREY PLOVER. *Sloane.*

Il eſt de la groſſeur d'une *Tourterelle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſept lignes; ſon pied un pouce ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes & demie. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied ſix pouces huit lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le

Cum *Turture* craſſitie convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam decem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata ſeptem lineas; pes unum pollicem cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas, extimus decem cum ſemi lineas, intimus novem cum ſemi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis ſex pollicum & octo linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ex-

tremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium pennis vestiuntur nigricantibus, maculis flavescentibus ad margines variegatis. Scapulares similiter nigricant, & iisdem maculis variegantur. Superiores caudæ tectrices sunt nigricante & flavescente transversim striatæ. Basim rostri circumdant plumulæ griseæ, maculis fuscis variegatæ. Oculorum ambitus albicat. Genæ, sicut & collum ad latera, fusco & sordidè flavescente variegantur. Guttur candicans, minutis maculis griseo-fuscis varium. Pennæ collum inferius vestientes sunt in medio griseo-fuscæ, ad margines dilutiùs griseæ, & minutis maculis sordidè flavescentibus variæ. Quæ pectus obtegunt, iisdem variegantur coloribus, sed paulò magis, præsertim ad pectoris latera, flavescunt. Venter & crurum suprema pars albent; attamen crurum pars suprema pauco fusco & flavicante exteriùs tantùm variegatur. Inferiores caudæ tectrices pariter albicant; sed ex istis extimæ sunt in latere exteriore tantùm nigricante & flavescente transversim striatæ. Fusco &

dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre. La bâse du bec est entourée de petites plumes grises, variées de taches brunes. Le tour des yeux est blanc. Les joues & les côtés du col sont variés de brun & de jaunâtre sale. La gorge est blanchâtre, & variée de petites taches d'un gris-brun. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu, d'un gris plus clair sur leurs bords, & variées de petites taches d'un jaunâtre terni. Celles qui couvrent la poitrine, sont variées des mêmes couleurs, mais il y a un peu plus de jaunâtre, sur-tout vers les côtés de la poitrine. Le ventre & le haut des jambes sont blancs; cependant le haut des jambes est varié d'un peu de brun & de jaunâtre du côté extérieur seulement. Les couvertures du dessous de la queue sont pareillement blanches; mais celles qui sont les plus extérieures, sont rayées transversalement de noirâtre & de jaunâtre, & cela du côté extérieur seulement. Les

côtés ſont variés de brun & de jaunâtre. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches; celles qui ſont vers les bords, ſont variées de gris-brun; & de ces dernieres les plus grandes ſont d'un cendré clair. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont noirâtres, & variées ſur leurs bords de taches jaunâtres: les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & bordées de blanc par le bout ſeulement. Les plumes de l'aîle ſont en-deſſous d'un cendré clair, & en-deſſus elles ſont d'un brun brillant & comme doré, & ont leur tige blanche vers leur extrémité: les moyennes ſont de plus bordées de blanc par le bout; cependant de celles-la les plus proches du corps ſont noirâtres, & variées ſur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſque juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres, rayées de bandes tranſverſales d'un blanc-jaunâtre, poſées obliquement ſur chacun de leurs côtés,

flavicante latera variegantur. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt candidæ; quæ verſùs margines locum obtinent, griſeo-fuſco variegatæ; & ex iſtis majores ſunt dilutè cinereæ. Tectrices alarum ſuperiores minores, ſicut & majores corpori finitimæ, nigricantes, maculis flaveſcentibus ad margines variegatæ: majores à corpore remotiores fuſcæ, albo in apice tantùm fimbriatæ. Remiges ſunt ſubtus dilutè cinereæ, ſuperne verò ſplendidè fuſcæ & quaſi auro perluſtratæ, ipſarum ſcapis verſùs extremitatem candidis: minores ſunt inſuper albo in apice marginatæ; ex minoribus tamen corpori viciniores ſunt nigricantes, & maculis flaveſcentibus ad margines variæ. Quæ noviſſimè deſcriptæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Remix prima reliquas omnes longitudine ſuperat. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, tæniis ſtriatæ tranſverſis albo-flavicantibus, in utroque latere obliquè poſitis, & ſimul efficientibus angulum, cujus apex rectricis

scapo insidet. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides obscurè rubræ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricantes. In campestribus locis habitat, & juxta aquas quoque versatur. *Ex museo Realmuriano.*

& formant ensemble un angle, dont le sommet est sur la tige de la plume. La prunelle des yeux est noire : leur iris est d'un rouge obscur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. Le petit Pluvier doré.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavescentibus varia, infernè alba ; rectricibus nigricantibus, albo-flavicante ad margines maculatis . . . . Pluvialis aurea minor.

Pluvialis altera species. *Gesn. Avi. pag.* 716, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Pluvialis, seu Pardalus minor ; Gallina novalis minor Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 415.
Pardalus quartus. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 318.
Les Allemands l'appellent Kleiner Brach-Vogel. *Schwenck. Rzac.*

Magnitudine & crassitie nonnihil præcedenti cedit. Rostrum habet ab ipsius apice ad oris angulos unum pollicem longum. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices nigricant, & flavescentibus variegantur maculis. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, tectrices

Il est un peu moins grand & moins gros que le précédent. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un noirâtre varié de taches jaunâtres. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couver-

tures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les aîles ſont fort longues. Leurs grandes plumes ſont moitié brunes & moitié blanches ſelon leur longueur : les moyennes ſont tout-à-fait brunes. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres, variées ſur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaunâtre obſcur; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs & aux bords des eaux.

caudæ inferiores & pennæ alas ſubtus obtegentes albicant. Alæ longæ ſunt. Ipſarum majores remiges ſunt fuſcæ, attamen mediotenùs ſecundùm longitudinem candidæ : minores penitùs fuſcæ. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, albo-flavicante ad margines maculatæ. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque obſcurè luteſcentes; ungues verò nigri. In campeſtribus locis & juxta aquas degit.

** 3. Le Pluvier doré de S. Domingue.

Voyez Pl. VI. Fig. 1.

Pluvialis ſuperne nigricans, maculis flaveſcentibus varia, infernè alba; collo inferiore & pectore dilutè griſeis, marginibus pennarum flaveſcentibus; rectricibus fuſcis, albo-flavicante ad margines maculatis . . . . Pluvialis Dominicensis aurea.

Il eſt à peu près de la groſſeur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces une ligne. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; ſa queue

Pluvialem auream noſtratem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices cum linea una. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos

uſque

usque unum pollicem longum est ; cauda duos pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata undecim lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus octo cum semi lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad decem linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ nigricantes, maculis flavescentibus ad margines variegatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fuscæ, flavicante transversim striatæ. Basim rostri ambiunt plumulæ albo-rufescentes. Guttur ex albo quoque rufescit. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ dilutè griseæ, marginibus flavescentibus præditæ. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant ;

deux pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, onze lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur huit lignes & demie. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied huit pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à dix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, variées sur leurs bords de taches jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont brunes, & rayées transversalement de jaunâtre. La bâse du bec est entourée de petites plumes d'un blanc-roussâtre. La gorge est de la même couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes d'un gris clair, bordées de jaunâtre. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs ; les côtés sont cependant variés d'un peu de gris. Les couvertures du dessous des aîles

ſont blanches ; celles qui ſont vers les bords, ſont variées de gris-brun ; & de ces dernieres les plus grandes ſont d'un cendré clair. Les plumes ſcapulaires, les petites & les grandes couvertures du deſſus des aîles les plus proches du corps ſont de la même couleur que les plumes du dos : les ſuivantes, grandes & petites, ſont d'un gris-brun, variées ſur leurs bords de taches blanchâtres : les petites & les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun foncé, mais les grandes ſont bordées de blanchâtre par le bout. Les plumes de l'aîle ſont d'un cendré clair en-deſſous, brunes en-deſſus, & ont leur tige blanche vers leur extrémité : les moyennes ſont de plus bordées de blanchâtre par le bout ; cependant de celles-là les plus proches du corps ſont d'un brun foncé, & variées ſur leurs bords de taches jaunâtres. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſque vers les trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premieres des plumes de l'aîle ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, variées ſur leurs bords de taches d'un blanc-jaunâtre. Le bec eſt noir. La par-

attamen latera pauco variegantur griſeo. Pennæ alas ſubtus cooperientes albent ; quæ versùs margines locum tenent, griſeo-fuſco variegantur ; & ex iſtis majores ſunt dilutè cinereæ. Scapulares, ſuperiores alarum tectrices majores & minores corpori finitimæ pennis dorſum veſtientibus concolores : quæ ſequuntur, majores ſcilicet & minores, griſeo-fuſcæ, maculis candicantibus ad margines variegatæ : minores & majores à corpore remotiores ſaturatè fuſcæ, majoribus tamen albido in apice fimbriatis. Alarum remiges ſunt ſubtus dilutè cinereæ, ſuperne fuſcæ, ipſarum ſcapis versùs extremitatem candidis : minores ſunt inſuper candicante in apice marginatæ ; ex minoribus tamen corpori finitimæ ſunt ſaturatè fuſcæ, maculis flaveſcentibus ad margines variegatæ. Quæ nuper deſcriptæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Binæ primores remiges reliquarum omnium longitudinem excedunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſcis, albo-flavicante

ad margines maculatis. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicensi Insula*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Chervain.*

tie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain.*

4. Le Pluvier doré de la Baye de Hudson.

Pluvialis superne nigricans, maculis flavo-aurantiis varia, infernè nigra; tæniâ in syncipite albâ, supra oculos & secundùm colli latera protensâ, collum inferius ambiente; rectricibus fusco & nigro transversim striatis .... Pluvialis aurea Freti Hudsonis.

Pluvialis nigro-flavus. *Linn. Syst. Nat. ed. 6. Gen. 61. sp. 1.*
Charadrius nigro-luteſcente variegatus, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°. 156.*
Charadrius pectore nigro, rostro basi gibbo, pedibus cinereis. Charadrius apricarius. *Linn. Syst. Nat. ed. 10. Gen. 79. sp. 7.*
Pluvier moucheté. *Edwards. Tom. III. pag. CXL; avec une figure exacte Pl. 140.*
Les Anglois l'appellent Spotted-Plover. *Edwards.*
Les Anglois de la Baye de Hudson, Hawk's-Eye. *Edwards.*
Les Suédois, Aokerhoens. *Linn.*
Les Oelandois, Alwargrim *ou* Alfwargrim. *Linn.*
Les Smolandois, Myrpytta. *Linn.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & decem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda duos pollices cum octo lineis; pars

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'onze pouces dix lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dé-

garnie de plumes, ſix lignes; ſon pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce, l'extérieur dix lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes noirâtres, variées ſur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant ſur l'orangé. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La bâſe du demi-bec ſupérieur eſt entourée d'une petite ligne de plumes noires, au-deſſus de laquelle eſt une bande blanche, qui s'étend de chaque côté, paſſe par-deſſus les yeux, & ſe courbant enſuite, deſcend tout le long des côtés du col, va en entourer la partie inférieure immédiatement au-deſſus de la poitrine, & forme une eſpece de collier. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont noirs. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la

crurum plumis denudata ſex lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem, extimus decem lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Pennæ partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium veſtientes ſunt nigricantes, maculis ex ſplendidè luteo ad aurantium colorem vergentibus ad margines variæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Baſim mandibulæ ſuperioris circumdat lineola plumulis nigris conflata, ſupra quam tænia extat alba, utrinque extenſa, ſupra oculos ducta, indeque reflexa, ſecundùm colli latera protenditur, collum inferius ſupra pectus ambit, & torquem quodammodo efformat. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera & crurum pars ſuprema nigri ſunt coloris. Inferiores caudæ tectrices ſimili nigro imbutæ, maculis candidis variegatæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes cinereo-fuſcæ,

Alarum margines, ab articulo carpo humano respondente ad alas extremas, vestiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, nigricantes, maculis ex splendidè luteo ad aurantium colorem inclinantibus ad margines variæ : majores à corpore remotiores nigricantes, pauco candido in apice marginatæ. Remiges majores obscurè nigræ, nigro nonnihil dilutiore fimbriatæ : minores fusco & nigro transversim striatæ. Ex minoribus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, duas ferè tertias longitudinis caudæ partes attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Habitat in *Freto Hudsonis*, & in Septentrionali *Sueciæ* regione.

même couleur, & variées de taches blanches. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun. Le bord de l'aîle, depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à son extrémité, est couvert de petites plumes noirâtres, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont noirâtres, & variées sur leurs bords de taches d'un jaune brillant & tirant sur l'orangé : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un noir sombre, bordées d'une couleur un peu plus claire : les moyennes sont rayées transversalement de brun & de noir. De celles-là les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve à la *Baye de Hudson* & dans le Nord de la *Suéde*.

** 5. Le petit Pluvier ou le Guignard.

Voyez le mâle Pl. IV. Fig. 2.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, marginibus pennarum rufeſcentibus, infernè rufeſcens; capite ſuperiore fuliginoſo, rufeſcente vario; tæniâ ponè oculos albo-rufeſcente; (ventre ſupremo fuliginoſo *mas*); imo ventre albo; rectricibus griſeis, apice fuſcis, quatuor utrinque extimis albo terminatis . . . . Pluvialis minor sive Morinellus.

Morinellus. *Charlet. Exer. pag.* 111. *N°. I.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. I.*
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 61. *ſp.* 3. (*Mas*).
Morinellus Avis Anglica. *Geſn. Avi. pag.* 615, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Morinellus Anglorum. *Geſn. icon. Avi. pag.* 131, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 540, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Willugh. Ornith. pag. 230. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LV; & inſuper altera icon minimè accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 4.
Charadrius pectore ferrugineo: lineâ albâ tranſversâ collum pectuſque diſtinguente. *Faun. Suec. Linn. N°.* 158. (*Mas*).
Charadrius abdomine rufeſcente, pectore cinereo, vertice fuſco. *Faun. Suec. Linn. N°.* 160. (*Fœmina*).
Charadrius Lapponicus. *Linn. Syſt. Nat. ed.* 6. *Gen.* 61. *ſp.* 5. (*Fœmina*).
Charadrius pectore ferrugineo, faſcia ſuperciliorum pectoriſque lineari alba, pedibus nigris. Morinellus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 6.
Gavia Morinellus ſimpliciter. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 5.
Dotralle des Anglois. *Alb. Tom. II. pag.* 40; *avec des figures paſſables, du mâle Pl.* 61, *& de la femelle Pl.* 62.
Les Anglois l'appellent Dotterell. *Geſn. Aldrov. Raj.* Dotterel. *Willugh. Charlet.* Dottrell. *Willugh.* Dotteril. *Alb.*
Les Lapons, Lahul. *Linn.*

Il n'eſt pas ſi gros que le *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pou-

Pluviali aureæ craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo pollices & ſex li-

neas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quinque cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus ſeptem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſexdecim pollicum & quatuor linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Synciput obtegunt pennæ griſeæ, in utroque latere albido marginatæ. Quæ partem capitis ſuperiorem & occipitium veſtiunt, ſunt fuliginoſæ, in utroque latere rufeſcente fimbriatæ. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufeſcens, ab oculo infra occipitium uſque protenſa. Pars colli ſuperior, ſicut & dorſi ſuprema, ſcapulareſque pennæ ſunt griſeo-fuſcæ, marginibus pennarum rufeſcentibus. Pennæ

ces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, cinq lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur ſept lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a ſeize pouces quatre lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt couvert de plumes griſes, bordées des deux côtés de blanchâtre. Celles qui couvrent le deſſus de la tête & l'occiput, ſont de couleur de ſuie, & bordées des deux côtés de rouſſâtre. De chaque côté de la tête eſt une bande d'un blanc-rouſſâtre, qui s'étend depuis l'œil juſqu'au-deſſous de l'occiput. Les parties ſupérieures du col & du dos, & les plumes ſcapulaires ſont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de rouſſâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le

croupion, ainſi que les couvertures du deſſus de la queue, ſont griſes, & bordées pareillement de rouſſâtre. Les côtés de la tête ſont d'un blanc-rouſſâtre, chaque plume étant marquée d'une petite ligne brune, qui s'étend ſelon la longueur de ſa tige. La gorge eſt blanchâtre. La partie inférieure du col eſt d'un gris mêlé d'un peu de rouſſâtre. La poitrine & les côtés ſont d'un rouſſâtre, qui devient de plus en plus foncé en approchant du ventre. Le haut du ventre eſt de couleur de ſuie. Le bas-ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont de la même couleur. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un gris-brun, & bordées de rouſſâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont griſes. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les vingt premieres ſont d'un gris-blanc en-deſſous ; mais en-deſſus les ſix premieres ſont d'un gris tirant ſur le rouſſâtre, & la tige de la premiere eſt blanche : les quatre ſuivantes, ſçavoir depuis la ſeptiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont griſes, & bordées d'un peu de rouſſâtre

verò dorſum infimum & uropygium veſtientes, ſicut & ſuperiores caudæ tectrices, ſunt griſeæ, ipſarum marginibus ſimiliter rufeſcentibus. Caput ad latera ex albo rufeſcit, quælibet tamen penna lineolâ inſignitur fuſcâ, ſecundùm ipſius ſcapi longitudinem ductâ. Guttur candicat. Pars colli inferior eſt griſea, pauco rufeſcente mixta. Pectus & latera rufeſcunt ; color autem rufeſcens, versùs ventrem procedendo, magìs magìſque fit ſaturatior. Venter ſupremus fuliginoſo imbuitur colore. Venter imus & crurum ſuprema pars albicant. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes ſimiliter albicantes. Tectrices alarum ſuperiores minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt griſeofuſcæ, rufeſcente marginatæ : majores à corpore remotiores griſeæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : viginti primores ſunt ſubtus cinereo-albæ ; ſuperne verò ſex primores ex griſeo ad rufeſcentem vergentes colorem, prioris ſcapo candido : quatuor proximè ſequentes, à ſeptima ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, griſeæ,

griseæ, pauco rufescente in apice marginatæ : decem quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, griseæ, per totam circumferentiam albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniores griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Quæ novissimè descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ griseæ, attamen versùs apicem fuscæ : quatuor utrinque extimæ concolores, sed albo terminatæ, albore scilicet eò majus spatium occupante, quò rectrix exterior fit : binæ insuper utrinque extimæ oris quoque exterioribus albis præditæ sunt. Rostrum, unguesque nigri ; pars crurum plumis denudata & pedes fusci.

Fœmina à *mare* discrepat ventre supremo nequaquam fuliginoso. In reliquis cum illo satis perfectè convenit.

In campestribus locis habitant, & juxta aquas quandoque degunt. *Ex museo Realmuriano.*

par le bout : les dix qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont grises, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, & bordées de roussâtre. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont grises, excepté vers le bout, où elles sont brunes : les quatre plus extérieures de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus extérieure : de plus les deux plus extérieures de chaque côté sont aussi bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirs ; la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns.

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle n'a point le haut du ventre de couleur de suie. Du reste elle lui ressemble assez bien.

On les trouve dans les champs, & quelquefois aux bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

6. Le Guignard d'Angleterre.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, marginibus pennarum flaveſcentibus, infernè albo-fulveſcens; capite ſuperiore albo, flaveſcente & griſeo-fuſco vario; tæniâ ſupra oculos candidâ; rectricibus binis intermediis griſeo-fuſcis, lateralibus albis.... Morinellus Anglicanus.

Gavia Morinella altera. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 7.
Dotralle de la Province de Lincoln. *Alb. Tom. II. pag.* 40; *avec une figure mauvaiſe & mal coloriée Pl.* 63.
Les Anglois l'appellent Dottrel. *Alb.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ neuf pouces. Son bec a près d'un pouce de long. Il a environ un pied cinq pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt joliment variée de blanc, de jaunâtre & de gris-brun. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui paſſe pardeſſus les yeux, & s'étend juſque vers l'occiput La partie ſupérieure du col eſt d'un gris-brun. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue, ainſi que l'aîle bâtarde, ſont de la même couleur, chaque plume étant bordée de jaunâtre. La

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem circiter pollices æquat. Roſtrum habet unum ferè pollicem longum. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis pars ſuperior albo, flaveſcente & griſeo-fuſco eleganter variegatur. In utroque capitis latere tænia extat candida, ſupra oculos ducta, & versùs occipitium uſque producta. Collum ſuperius eſt griſeo-fuſcum. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne cooperiunt, ala notha & ſuperiores caudæ tectrices ſunt

quoque griseo-fuscæ, marginibus pennarum flavescentibus. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant & aliquid fulvescentis admixtum habent. Remiges majores sunt nigræ; prior tamen in latere exteriore alba est: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ sunt griseo-fuscæ: laterales omnes albæ. Oculorum pupilla nigra; ipsorum irides candicantes. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque viresentes; ungues verò nigricantes. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Habitat in *Anglia* in *Comitatu Lincolniæ.*

gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, excepté le côté extérieur de la premiere, qui est blanc: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun: toutes les latérales sont blanches. La prunelle des yeux est noire; & leur iris est blanchâtre. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres; & les ongles noirâtres. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Angleterre* dans le *Comté de Lincolne.*

** 7. Le Pluvier a collier.

Voyez Pl. V. Fig. 1.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, infernè alba; tæniâ ſupra oculos albo-rufeſcente; torque duplici, ſupremo albo, infimo nigricante; rectricibus octo intermediis griſeo-fuſcis, versùs apicem nigricantibus, apice albis, binis utrinque extimis candidis, extimâ exteriùs griſeo-fuſco, proximè ſequenti interiùs nigricante maculatâ . . . . Pluvialis torquata.

An Charadrius fuſcus, fronte collarique dorſali abdomineque albis, rectricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus nigris. Charadrius Alexandrinus? *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 3.

An Charadrius faſciâ pectorali nigrâ, ſuperciliis albis, rectricibus apice albis faſciâ nigrâ, pedibus cœruleis. Charadrius Ægyptius? *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 5.

Il eſt un peu plus gros que le *Mauvis*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces cinq lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſept lignes & demie de long; ſa queue deux pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur ſix lignes & demie. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par

Craſſitie *Turdum Iliacum* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues ſeptem pollices & quinque lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſeptem cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices cum totidem lineis; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo lineas, intimus ſex cum ſemi lineas. Extimus digitus cum

medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis pars superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices griseo-fusco imbuuntur colore. Synciput ex albo ad rufescentem colorem nonnihil inclinat : rufescens autem color utrinque supra oculos protenditur. Caput ad latera griseo-fuscum quidem, sed quàm in capite superiore saturatiùs. Guttur candidum. Partem colli capiti finitimam cingit torquis pariter albus, infra quem alius extat torquis nigricans, priore majorem obtinens latitudinem, & pectori dorsoque supremis paululùm insidens. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albi sunt coloris. Crurum suprema pars est in latere exteriore grisea, in interiore candida. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, sunt dorso concolores, qui-

une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatorze pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. Le synciput est d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre : cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Les côtés de la tête sont d'un gris-brun plus foncé que celui du dessus de la tête. La gorge est blanche. La partie du col qui est la plus voisine de la tête est entourée d'un collier de la même couleur, au-dessous duquel en est un autre noirâtre & plus large que le premier, qui porte un peu sur le haut de la poitrine & du dos. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos, quelques-unes étant bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un

brun-noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur, ayant cependant la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de plus les trois premieres ont vers les deux tiers de leur longueur leur tige blanche; & les ſix ſuivantes, ſçavoir depuis la quatriéme juſqu'à la neuviéme incluſivement, ont dans le même endroit une longue tache blanche, qui s'étend ſur leur côté extérieur: les moyennes plumes de l'aîle ſont blanches & terminées obliquement de brun-noirâtre; cependant les quatre plus proches du corps ſont de la même couleur que le dos; & les deux ſuivantes ſont entiérement blanches. Ces ſix plumes ſe terminent en pointe; mais les quatre plus proches du corps ſont très-longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes: les deux du milieu ſont d'abord d'un gris-brun, enſuite noirâtres vers leur extrémité, & terminées de blanc ſale: les trois qui les ſuivent immédiatement de chaque côté, ſont de la même couleur, mais elles ſont terminées de blanc: les deux plus extérieures

buſdam tamen albo marginatis: majores à corpore remotiores ex fuſco nigricant. Remiges alarum majores ſimiliter fuſco-nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte albæ; trium inſuper priorum ſcapi versùs duas tertias longitudinis partes albent; & ſex remiges proximè ſequentes, à quarta ſcilicet ad nonam uſque incluſivè, eodem in loco longiuſculâ inſigniuntur maculâ candidâ, in latere exteriore protensâ: minores remiges candidæ, fuſco-nigricante obliquè terminatæ; quatuor tamen corpori finitimæ eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur; & binæ proximè ſequentes penitùs albicant. Quæ ſex noviſſimè deſcriptæ remiges in acumen deſinunt; quatuor verò corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ primùm griſeo-fuſcæ, dein versùs extremitatem nigricantes, ſordidè albo terminatæ;

tres utrinque proximè sequentes concolores, apicibus tamen albis præditæ: binæ utrinque extimæ penitùs candidæ; extima tamen versùs ipsius extremitatem maculâ insignitur griseo-fuscâ, in latere exteriore collocatâ; & proximè sequens minutis quibusdam notatur maculis nigricantibus, in latere interiore positis. Rostrum, ungueſque nigri sunt coloris; pars crurum plumis denudata, pedesque rubri. Maris littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

de chaque côté sont entiérement blanches; cependant la plus extérieure est marquée vers son extrémité d'une tache de gris-brun, placée sur son côté extérieur; & la suivante est marquée de quelques petites taches noirâtres, placées sur son côté intérieur. Le bec & les ongles sont noirs; la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 8. Le petit Pluvier a collier.

Voyez Pl. V. Fig. 2.

Pluvialis superne griseo-fusca, infernè alba; tæniâ in syncipite transversâ candidâ, nigro circumdatâ; fasciâ per oculos nigrâ; torque duplici, supremo albo, infimo nigro; rectricibus octo intermediis griseo-fuscis, versùs apicem nigricantibus, tribus utrinque lateralibus apice albis, sequenti in exortu & apice albâ, in medio fusco-nigricante, utrinque extimâ candidâ, interiùs fusco-nigricante maculatâ. . . . .

Pluvialis torquata minor.

Charadrius pectore nigro, fronte nigricante lineolâ albâ, vertice fusco. *Faun. Suec. Linn* N°. 159.

Charadrius pectore nigro, fronte nigricante fasciolâ albâ, vertice fusco, pedibus luteis. Hiaticula. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 2.

Charadrius. *Charlet. Exer. pag.* 114. N°. XV.

Charlet. Onomast. pag. 109. N°. XV.

Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.

Charadrios, sive Hiaticula. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 536. *hujus icon non satis accurata pag.* 537.

Charadrius, Gazæ Hiaticula. *Jonſt. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *ſub titulo*, Charadrios.
Charadrius ſive Hiaticula. *Willugh. Ornith. pag.* 230. *hujus icon minùs accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 112. *N°. A.* 6.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 13.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 319. *N°. XIII. hujus icon peſſima Tab.* 269; *fig.* 2.
Charadrius, ſeu Hiaticula Willughby; Icterus; Galgulus aliorum; *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 370.
Hiaticula. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 61. *ſp.* 4.
Gavia littoralis. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 6.
Matuitui Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 199, *in qua hujus icon peſſima.*
Jonſt. Avi. pag. 136. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.
Alouette de mer. *Alb. Tom. I. pag.* 70; *avec une figure paſſable Pl.* 80.
An Pluvier, ou Pluvialis miniatis cruribus? *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag.* 410. (*ed.* 1725).
Les Grecs l'appellent Χαραδριος. *Aldrov.*
Les Polonois, Zoltaczek. *Rzac.*
Les Suédois, Strandpipare. *Linn.*
Les Lapons, Pago. *Linn.*
Les Anglois, Sea-Lark. *Willugh. Raj. Sloane. Sibbald. Alb.*
Les Braſiliens, Matuitui. *Marcgr. Jonſt.*

Il eſt un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſix pouces quatre lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſix pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſept lignes de long, ſa queue deux pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, cinq lignes; ſon pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur ſept lignes & demie;

Præcedenti nonnihil craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem ſex pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues ſex pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſeptem lineas longum eſt; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem cum ſemi lineas, extimus ſeptem cum

ſemi

semi lineas, intimus sex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est quatuordecim pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Basim mandibulæ superioris ambit tænia nigra, quæ deinde majorem obtinens latitudinem, in utroque capitis latere per oculos ducta, ab oris angulis ad aures usque protenditur, & tæniam insuper transversam simili nigro imbutam in parte superiore capitis efformat. Niger autem color latam circumdat tæniam transversam candidam, ab interiore cantho unius oculi ad alterius canthum interiorem extensam, & per synciput ductam. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. Guttur & colli suprema pars albicant; quæ albedo quodammodo torquem efficit, infra quem alius extat latiusculus torquis niger. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices sunt griseo-fuscæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Superiores alarum tectrices minimæ & me-

& l'intérieur six lignes. Il a quatorze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La bâse du demi-bec supérieur est entourée d'une bande noire, qui devient ensuite plus large, s'étend de chaque côté de la tête depuis les coins de la bouche jusqu'aux oreilles, en passant par les yeux, & forme de plus sur la partie supérieure de la tête une bande transversale de la même couleur : ce noir entoure une large bande transversale blanche, qui s'étend depuis l'angle intérieur d'un œil jusqu'à l'angle intérieur de l'autre, & passe par le synciput. Le reste de la partie supérieure de la tête est d'un gris-brun. La gorge & le haut du col sont blancs; ce qui forme une espece de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-brun. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps sont

de la même couleur, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, quelques-unes d'entr'elles étant bordées de blanc par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſix plumes : les dix premieres ſont d'un brun d'autant plus foncé, que la plume eſt plus éloignée du corps ; & une grande partie de leur côté intérieur eſt blanchâtre : de celles-là les quatre premieres ont leur tige blanche depuis environ les deux tiers de leur longueur juſque vers leur bout ; les ſix autres ont dans le même endroit une tache blanche, placée du côté extérieur, & qui devient d'autant plus grande, que la plume ſe rapproche plus du corps : les neuf ſuivantes, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la dix-neuviéme incluſivement, ſont blanches à leur origine & dans une grande partie de leur côté intérieur ; le reſte eſt d'un gris-brun & bordé de blanc ; cette bordure eſt d'autant plus large, que la plume eſt plus proche du corps : la vingtiéme & la vingt-uniéme ſont blanches, & ont ſeulement une tache d'un gris-brun, placée du côté intérieur, & qui eſt beaucoup plus grande ſur la vingt-uniéme plume que ſur la précédente : les cinq plus proches

diæ ſunt griſeo-fuſcæ : majores corpori viciniores concolores, albo terminatæ : majores à corpore remotiores nigricantes ; ex iſtis tamen quædam albo in apice marginantur. Viginti ſex remigibus ala conflatur : decem primores fuſco imbutæ eò ſaturatiore, quò remix fit à corpore remotior, & in latere interiore maximâ parte candicantes : inter iſtas quatuor primores ſcapis donantur à duabus circiter tertiis ipſarum longitudinis partibus versùs extremitatem uſque albis ; ſex reliquæ eodem in loco maculâ inſigniuntur candidâ, in latere exteriore poſitâ, quæ macula eò major fit, quò remix eſt corpori vicinior : novem ſequentes remiges, ab undecima ſcilicet ad decimam nonam uſque incluſivè, ſunt in exortu & maxima lateris interioris parte candidæ, in reliqua longitudine griſeo-fuſcæ, marginibus albis præditæ ; quæ margines eò fiunt latiores, quò remix fit corpori finitima : vigeſima & vigeſima prima candidæ, maculâ tantùm notatæ griſeo fuſcâ, interiùs collocatâ, & multò quidem majore in vigeſima prima remige

quàm in præcedente : quinque corpori viciniores dorso concolores. Quæ ultimæ longissimæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ sunt griseo-fusco imbutæ ; qui color, versùs rectricis apicem procedendo, nigricat : tres utrinque proximè sequentes eodem colore tinctæ, sed apice albæ : quinta in exortu alba, dein fusco-nigricans, albo terminata, & in latere exteriore albo insuper fimbriata : utrinque extima in tota longitudine candida, minutâ tantùm insignita maculâ fusco-nigricante, versùs duas tertias longitudinis partes in latere interiore positâ. Rectrix autem ista noviſſimè descripta reliquis paululùm longitudine cedit ; aliæ verò omnes æqualem circiter obtinent longitudinem. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs extremitatem usque eleganter aurantium, ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes similiter eleganter aurantii ; ungues verò nigri. Trium digitorum anterius unitus exteriori ad primam articulationem.

du corps sont de la même couleur que le dos. Ces dernieres sont très-longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun qui devient noirâtre en approchant du bout de la plume : les trois suivantes de chaque côté sont de la même couleur, & terminées de blanc : la cinquiéme est blanche à son origine, ensuite d'un brun-noirâtre, & terminée de blanc ; elle est aussi bordée de blanc du côté extérieur : la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur, & a seulement une petite tache d'un brun-noirâtre, placée sur le côté intérieur vers les deux tiers de sa longueur. Cette derniere plume est un peu plus courte que les autres, qui sont à peu près d'égale longueur entr'elles. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un bel orangé depuis son origine jusque vers son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont aussi d'un bel orangé ; & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite

membrane, qui s'étend depuis ſon origine juſqu'à la premiere articulation. On le trouve aux bords de la mer, dans les rochers deſquels il fait ſon nid. Ses œufs ſont verdâtres, tachetés de brun, ſon extrémité obtuſe étant tout-à-fait brune. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ab ipſius exortu ad primum uſque articulum extensâ. Maris littora frequentat; ibique in rupibus nidificat. Ova ponit virideſcentia, fuſco maculata, extremitate quidem obtusâ penitùs fuſcâ. *Ex muſeo Realmuriano.*

9. Le Pluvier a collier de Virginie.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, infernè alba; tæniâ in ſyncipite candidâ, per oculos protensâ; maculâ in vertice & tæniâ infra oculos nigris; torque duplici, ſupremo albo, infimo nigro; uropygio rufo; rectricibus in exortu rufis, versùs apicem nigris, apice rufeſcentibus .... Pluvialis Virginiana torquata.

Charadrius faſciis pectoris colli frontis genarumque nigris, caudâ luteâ faſciâ nigrâ, pedibus pallidis. Charadrius vociferus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 4.

Gavia brachyptera, vocifera. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 8.

Pluvier criard. *Catesb. Tom. I. pag.* 71; *avec une figure très-exacte Pl.* 71.

Les Anglois l'appellent Chattering Plover. *Catesb.*

Les Habitans de Virginie, Kill-deer. *Catesb.*

Il eſt un peu plus gros que le *Guignard*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ neuf pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue quatre pouces; la partie de ſes jambes qui eſt

Morinellum nonnihil craſſitie ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem novem pollices & totidem circiter lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda quatuor pollices; pars

crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes unum pollicem cum sex lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. In syncipite lata adest tænia candida, in utroque capitis latere protensa, & per oculos ducta. Supra quam tæniam majuscula extat macula nigra, in capitis vertice posita. Reliquum caput superius est griseo-fuscum. In utroque capitis latere tænia extat nigra, ab exortu rostri orta, infra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Guttur albicat: quæ albedo utrinque protenditur, collum cingit, & quodammodo torquem efficit, infra quem alius adest latiusculus torquis niger. Dorsum, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices griseo-fusco imbuuntur colore. Uropygium & tectrices caudæ superiores sunt rufæ. Pectus, ventrem, crurum supremam

dégarnie de plumes, quatre lignes ; son pied un pouce six lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Sur le synciput est une large bande blanche, qui s'étend de chaque côté de la tête, & passe par les yeux. Au-dessus de cette bande sur le sommet de la tête est une grande tache noire. Le reste du dessus de la tête est d'un gris-brun. De chaque côté de la tête est une bande noire, qui part de l'origine du bec, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est blanche : cette couleur s'étend de chaque côté, fait le tour du col, & forme une espece de collier, au-dessous duquel est un autre collier noir passablement large. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. La poitrine, le ventre, le haut des

jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. Sur le haut de la poitrine eſt une large bande tranſverſale noire. Les grandes plumes de l'aîle ſont brunes : les moyennes ſont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes rouſſes depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, enſuite noires vers leur bout & terminées de rouſſâtre. Les paupieres ſont rouges. Le bec eſt noir. La partie des jambes, qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune très-clair; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Virginie* & à la *Caroline*.

partem & latera veſtiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ tectrices concolores. Summum pectus latâ inſignitur tæniâ tranſversâ nigrâ. Remiges alarum majores ſunt fuſcæ : minores eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque rufis, dein versùs apicem nigris, apice rufeſcentibus. Palpebræ rubræ ſunt. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque dilutiſſimè lutei ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Virginia* & *Carolina*.

** 10. LE PLUVIER A COLLIER DE S. DOMINGUE.

Voyez Pl. VI. Fig. 2.

Pluvialis ſuperne griſeo-fuſca, marginibus pennarum rufeſcentibus, infernè alba ; tæniâ in ſyncipite candidâ, ſupra oculos protensâ; maculâ in vertice nigrâ; torque duplici, ſupremo albo, infimo nigro ; uropygio rufo ; rectricibus binis intermediis griſeo-fuſcis, apice rufeſcentibus, binis utrinque proximis griſeo-fuſcis, versùs apicem nigris, apice rufeſcentibus, tribus utrinque extimis rufis, versùs apicem

nigris, apice albis, extimâ in exortu albâ, nigricante transversim striata .... PLUVIALIS DOMINICENSIS TORQUATA.

Crassitie *Pluvialem torquatam nostratem* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & lineam unam. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos decem lineas longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum semi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & quinque pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem & dorsum vestiunt pennæ griseo-fuscæ, marginibus rufescentibus præditæ. Scapulares concolores. Uropygium & superiores caudæ tectrices rufi sunt coloris. In syncipite,

Il est à peu près de la grosseur de *notre Pluvier à collier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces une ligne. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes & demie; son pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, & l'intérieur huit lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête, le dos & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée de roussâtre. Le croupion est roux, ainsi que les couvertures du dessus de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, est une bande transversale blanche, qui s'é-

tend de chaque côté au-deſſus des yeux. Sur le ſommet de la tête, au-deſſus de la bande blanche, eſt une tache noire. La gorge eſt blanche : cette couleur s'étend de chaque côté, entoure le col, & forme une eſpece de collier, au-deſſous duquel eſt une bande noire, qui entoure de même le col, & forme un ſecond collier. Ce dernier collier eſt beaucoup plus large ſur la partie inférieure du col, que ſur ſa partie ſupérieure. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Sur la poitrine eſt une large bande tranſverſale variée de noir & de blanc ; c'eſt-à-dire qu'en cet endroit les plumes ſont blanches à leur origine, enſuite noires, & bordées de blanc par le bout. Les petites couvertures du deſſus des aîles les plus proches du corps ſont d'un gris-brun : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur, & bordées de rouſſâtre : enfin les petites & les grandes les plus éloignées du corps ſont noires, & bordées de blanc par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les cinq premieres ſont noires, & ont

immediatè ſupra roſtri exortum, tænia extat tranſverſa candida, utrinque ſupra oculos protenſa. In capitis vertice, ſupra tæniam candidam, macula adeſt nigra. Guttur albicat : albedo autem in utroque latere extenditur, collum ambit, & quodammodo torquem efficit, infra quem tænia extat nigra, collum ſimiliter cingens, & torquem alterum efformans : qui noviſſimus torquis multò majorem in parte colli inferiore quàm in ſuperiore latitudinem obtinet. Pectus, ventrem, latera & crurum partem ſupremam veſtiunt pennæ albæ. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes eodem albore nitent. In pectore latiuſcula extat tænia tranſverſa albo & nigro varia ; eo ſcilicet in loco pennæ ſunt in exortu albæ, deinde nigræ, apice albo fimbriatæ. Tectrices alarum ſuperiores minimæ corpori viciniores griſeo-fuſcæ : mediæ, ſicut & majores corpori finitimæ, eodem imbutæ colore, ſed rufeſcente marginatæ : minores tandem, majoreſque à corpore remotiores nigræ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti

viginti quatuor remiges : quinque primores sunt nigræ, attamen in latere interiore secundùm ipsarum longitudinem maximâ parte candidæ, & maculâ insuper insignitæ candidâ, super scapum versùs ipsarum extremitatem collocatâ; quæ macula eò magìs in latere exteriore extenditur, quò remix fit corpori vicinior : quinque proximè sequentes, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, nigræ, & præcedentium instar, in latere interiore maximâ parte candidæ, candidoque imbutæ in lateris exterioris media parte : octo quæ sequuntur, ab undecima scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albæ, in reliqua longitudine nigræ, albo marginatæ; in illis autem color niger eò minus spatium occupat, quò corpori viciniores fiunt : pleræque insuper istæ remiges, à tertia scilicet ad decimam octavam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : decima nona penitùs candida : vigesima eodem colore tincta, attamen in latere exteriore versùs ipsius exortum griseo-fusca :

la plus grande partie de leur côté intérieur blanche selon leur longueur ; elles sont de plus marquées d'une tache blanche, placée sur leur tige vers leur extrémité, laquelle tache s'étend d'autant plus sur le côté extérieur, que la plume s'approche plus du corps : les cinq suivantes, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont noires, ayant de même une grande partie de leur côté intérieur blanche ; elles sont aussi de cette couleur dans le milieu de leur côté extérieur : les huit qui suivent, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste étant noir & bordé de blanc; dans ces plumes le noir occupe d'autant moins d'espace, qu'elles sont plus proches du corps : de plus la plûpart de ces plumes, sçavoir depuis la troisiéme jusqu'à la dix-huitiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : la dix-neuviéme est tout-à-fait blanche : la vingtiéme est de la même couleur, excepté du côté extérieur, vers son origine, où elle est d'un gris-brun : la vingt-uniéme est blanche à son origine & à son bout, & d'un gris-brun dans son mi-

lieu ; cette derniere couleur coupant obliquement la plume : enfin les trois plus proches du corps ſont d'un gris-brun. Ces trois dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Les deux premieres plumes de l'aîle ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-brun & terminées de rouſſâtre : les deux qui les ſuivent immédiatement de chaque côté, ſont d'abord d'un gris-brun, enſuite noires vers leur bout, & terminées de rouſſâtre : les trois plus extérieures de chaque côté ſont d'abord rouſſes, enſuite noires vers leur bout, & terminées de blanc ; la plus extérieure cependant eſt depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur blanche, & rayée tranſverſalement de noirâtre. Le bec eſt d'un cendré-bleuâtre, excepté ſon bout, qui eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont auſſi d'un cendré-bleuâtre ; & les ongles ſont noirs. On le trouve à *S. Domingue*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain.*

vigeſima prima in exortu & apice candida, in medio griſeo-fuſca, griſeo-fuſco colore remigem obliquè dividente : tres tandem corpori finitimæ griſeo-fuſcæ. Tres iſtæ noviſſimæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Binæ primores remiges ſunt omnium longiſſimæ. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ griſeo-fuſcæ, apice rufeſcentes : binæ utrinque proximè ſequentes primùm griſeo-fuſcæ, dein versùs apicem nigræ, rufeſcente terminatæ : tres utrinque extimæ primùm rufæ, dein versùs apicem nigræ, apice albæ ; attamen extima ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque alba, nigricante tranſverſim ſtriata. Roſtrum cinereo-cœruleſcens, excepto apice nigro. Pars crurum plumis denudata & pedes quoque cinereo-cœruleſcentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Dominicenſi Inſula*, unde in *muſeum Realmurianum* miſſa à *D. Chervain.*

11. LE PLUVIER A COLLIER DE LA JAMAIQUE.

Pluvialis ſuperne obſcurè fuſca, infernè alba; pectore nigris maculis vario; torque albo; rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis . . . . PLUVIALIS JAMAICENSIS TORQUATA.

Pluvialis viridis ex fuſco & albo varia, caudâ longiore. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 318. *N°. XI. hujus icon peſſima Tab.* 265. *fig.* 3.
Pluvialis ex fuſco & albo varia, caudâ longiore. *Raj. Syn. Avi. pag.* 190. *N°.* 10.
Tringa ſubcinerea ventre albido, collo annulo albo nigro marginato cincto. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 477.
Les Anglois de la Jamaïque l'appellent GREATEST SNIPE. *Sloane. Raj.* LARGER GREY SNIPE WITH A WHITE NECK. *Browne.*

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem longum eſt; cauda tres pollices cum ſex lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem cum ſemi lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſexdecim pol-

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; ſa queue trois pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes; ſon pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes & demie, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a ſeize pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées,

s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un brun obſcur. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. La poitrine eſt variée de blanc & de noir. La partie du col la plus voiſine de la tête eſt entourée d'un collier blanc. Les plumes de l'aîle ſont d'un brun obſcur. La queue eſt compoſée de douze plumes blanchâtres, variées de roux & de noirâtre. Les paupieres ſont orangées. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont blancs, toutes les articulations étant cependant noirâtres; & les ongles ſont noirs. On le trouve à *la Jamaïque* ſur le bord des rivieres.

licum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt obſcurè fuſcæ. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, crurum pars ſuprema & tectrices caudæ inferiores albicant. Pectus albo & nigro variegatur. Partem colli corpori finitimam circumdat torquis albus. Alarum remiges tingit color obſcurè fuſcus. Cauda duodecim conflatur rectricibus albidis, rufo & nigricante variegatis. Palpebræ aurantiæ. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata & pedes albicantes, omnibus tamen articulis nigricantibus; ungues verò nigri. Habitat in *Jamaica*, ibique juxta flumina degit.

** 12. Le grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.

Voyez Pl. VII. Fig. 1.

Pluvialis ſuperne griſeo-fulva, pennis in medio fuſcis, circa margines fulvis, infernè fulva, medio pennarum in collo inferiore & ſupremo pectore fuſco; tæniâ ſupra & infra oculos albo-fulveſcente; lineolâ infra oculos fuſcâ; rec-

tricibus sex intermediis grisеis, fasciis fuscis circumferentiæ parallelis, tribus utrinque extimis candidis, binis utrinque extimæ proximis nigricante transversim striatis, lateralibus nigricante terminatis . . . . PLUVIALIS MAJOR, OEDICNEMUS VULGO DICTA.

Oedicnemus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 98. *hujus icones minimè accuratæ pag.* 99 & 100.
Jonst. Avi. pag. 43. *hujus duæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab. XXVI, quarum altera sub titulo*, Charadrios.
Willugh. Ornith. pag. 227. *hujus icon minimè accurata Tab. LVIII; & insuper altera icon ab Aldrovando mutuata Tab. LXXVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 4.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 74. *N°. XI.*
Charadrius. *Gesn. Avi. pag.* 256, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Charadrius Aristotelis. *Gesn. icon. Avi. pag.* 125, *in qua eadem icon.*
Charadrius brevicaudus, rufescens, maculatus. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. X. sp.* 1.
Charadrius grisеus, remigibus primoribus duabus nigris medio albis, rostro aucto, pedibus cinereis. Oedicnemus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *sp.* 9.
Gavia rostro virescente, conico, acuto. *Klein. Avi. pag.* 20. *N°.* 4.
Arquatæ congener, seu minor. *Charlet. Exer. pag.* 111.
Charlet. Onomazt. pag. 106.
Fedoæ tertia species. *Willugh. Ornith. pag.* 216.
Fedoa nostra tertia. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 6.
Ostardeau ou Oedicnemus. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 239, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*
Ostardeau. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 57 *a*, *dans laquelle est la même figure.*
Outarde ou Ostarde & Bitarde. *Alb. Tom. I. pag.* 61; *avec une mauvaise figure Pl.* 69.
Les Grecs l'appellent Οἰδίκνημος. *Bel.*
Les Italiens, CORUZ. *Gesn. Aldrov.*
Les Romains, CARLOTTE. *Willugh.*
Les Allemands, en quelques endroits, TRIEL *ou* GRIEL. *Gesn. Aldrov.*
Les Anglois, STONE CURLEW. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.*
Les Habitans de la Province de Cornouaille, STONE CURLEW. *Willugh. Raj.*

Crassitie *Columbam Romanam* antecellit. Ipsius longi-

Il est plus gros qu'un *Pigeon Romain*. Sa longueur depuis le

bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſeize pouces deux lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce dix lignes & demie de long; ſa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce ſix lignes; ſon pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, ſeize lignes, l'extérieur un pouce, & l'intérieur onze lignes. Le doigt extérieur eſt réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds deux pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le deſſus du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & cela ſelon la longueur de leur tige, & d'un gris-fauve ſur les deux côtés, le tout étant bordé de fauve. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. De chaque côté de la tête eſt une bande d'un blanc tirant tant ſoit peu ſur le fauve, qui s'étend au-deſſus des yeux,

tudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem quindecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues ſexdecim pollices & lineas binas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & decem cum ſemi lineas longum eſt; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata unum pollicem & ſex lineas; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue ſexdecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum totidem pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Caput, partem colli ſuperiorem, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem fuſcæ, in utroque latere griſeo-fulvæ, marginibus fulvis prædítæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. In utroque capitis latere tæ-

nia extat ex albo ad fulvescentem colorem nonnihil inclinans, supra oculos ducta, infra quos altera adest tænia eodem colore imbuta. Noviſſimam tæniam iſtam inter & oculum lineola extat fuſca. Guttur ex albo nonnihil ad fulvum vergit. Partem colli inferiorem & pectus ſupremum obtegunt pennæ ad latera fulvæ, in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem fuſcæ. Quæ latera cooperiunt, ex albo paululùm ad fulvum inclinant, & ſtrictâ inſigniuntur lineâ fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ. Pectus infimum, venter & crurum ſuprema pars albi ſunt coloris. Inferiores caudæ tectrices ſunt fulvæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes candidæ, ex iſtis autem ultimis quædam ſtrictâ quoque notantur lineâ fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem protensâ; & majores à corpore remotiores cinereo-fuſco terminantur. Tectrices alarum ſuperiores minimæ pennis dorſum veſtientibus concolores: mediæ cinereo albæ, lineâ fuſcâ, ſecundùm ſcapi longitudinem ductâ, inſignitæ, & ſtrictiſſimâ margine fulvâ præditæ: majores corpori finitimæ

au-deſſous deſquels eſt une autre bande de la même couleur. Entre cette derniere bande & l'œil eſt une petite ligne brune. La gorge eſt d'un blanc tirant tant ſoit peu ſur le fauve. La partie inférieure du col & le haut de la poitrine ſont couverts de plumes fauves ſur leurs côtés, & brunes dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent les côtés, ſont d'un blanc tirant tant ſoit peu ſur le fauve, & marquées chacune d'une étroite ligne brune, qui s'étend tout le long dela tige. Le bas de la poitrine, le ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſous de la queue ſont fauves. Celles du deſſous des aîles ſont blanches; quelques-unes de ce dernieres ſont auſſi marquées d'une étroite ligne brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige; & les grandes les plus éloignées du corps ſont terminées de cendré-brun. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont de la même couleur que les plumes du dos: les moyennes ſont d'un gris-blanc, marquées d'une ligne brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige, & bordées très-étroitement de fauve: les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-blanc, & terminées obliquement de

noirâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont tout-à-fait noirâtres. La premiere des plumes de l'aîle eſt noirâtre à ſon origine & à ſon extrémité, & blanche dans ſon milieu : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la ſeconde juſqu'à la ſixiéme incluſivement, ſont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; de plus la ſeconde eſt marquée vers les trois quarts de ſa longueur d'une large bande tranſverſale blanche; & la troiſiéme eſt auſſi marquée dans le même endroit d'une petite tache blanche, placée auprès de ſa tige ſur ſon côté extérieur : les trois qui ſuivent, ſçavoir depuis la ſeptiéme juſqu'à la neuviéme incluſivement, ſont blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, le reſte eſt noirâtre, & terminé d'un peu de blanc : toutes les autres ſont noirâtres du côté extérieur & à leur bout, & blanches du côté intérieur; il faut cependant en excepter les trois plus proches du corps, qui ſont griſes & bordées de blanc, la bordure de celle qui eſt la plus proche du corps, tirant un peu ſur le fauve. Ces trois dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus

cinereo - albæ, nigricante obliquè terminatæ : majores tandem à corpore remotiores penitùs nigricantes. Remix prima in exortu & apice nigricat, in ipſius medio eſt candida : quinque proximè ſequentes, à ſecunda ſcilicet ad ſextam uſque incluſivè, ſunt nigricantes, & in latere interiore maximâ parte candidæ; ſecunda inſuper versùs tres quartas ipſius longitudinis partes latâ notatur tæniâ tranſverſâ albâ; & tertia eodem in loco minutâ quoque inſignitur maculâ candidâ, prope ipſius ſcapum in latere exteriore poſitâ : tres quæ ſequuntur, à ſeptima ſcilicet ad nonam uſque incluſivè, ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque albæ, in reliqua longitudine nigricantes, pauco albo terminatæ : reliquæ omnes remiges in latere exteriore & apice nigricantes, in latere interiore candidæ; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt tres corpori viciniores griſeæ, marginibus albis præditæ, remigis corpori finitimæ margine paululùm ad fulvum vergente colorem. Tres iſtæ remiges noviſſimè deſcriptæ longæ ſunt & acutæ,

&

& dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat: binæ intermediæ griseæ, fasciis variegatæ fuscis, ipsarum circumferentiæ parallelis, apice albido, fasciâ similiter fuscâ, rectricis extremitatis circumferentiæ parellelâ, præditæ: binæ utrinque proximè sequentes concolores, in eo tamen discrepantes quod apicibus nigricantibus præditæ sint, & fasciæ fuscæ in latere exteriore non multùm sint conspicuæ: tres utrinque extimæ candidæ, nigricante terminatæ, nigricante colore majus in latere exteriore spatium occupante quàm in interiore; binæ insuper utrinque extimæ viciniores sunt nigricante transversim striatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales verò sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides & palpebræ sunt luteæ. Infra utrumque oculum spatium extat plumis denudatum, luteo-virideſcente colore tinctum. Rostrum quoque ab ipsius exortu ultra nares us-

longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises, variées de bandes brunes, paralleles à leur circonférence, & terminées de blanchâtre, sur lequel est aussi une bande brune parallele à la circonférence de l'extrémité de la plume : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, avec cette différence qu'elles sont terminées de noirâtre, & que les bandes brunes paroissent fort peu sur le côté extérieur : les trois plus extérieures de chaque côté sont blanches & terminées de noiratre, cette derniere couleur occupant plus d'espace sur le côté extérieur que sur l'intérieur; de plus les deux plus proches de la plus extérieure de chaque côté sont rayées de bandes transversales noirâtres. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux & les paupieres sont jaunes. Au-dessous de chaque œil est un espace nud d'un jaune verdâtre. Le bec est de cette derniere couleur depuis son origine jusqu'au-delà

des narines, & noir depuis les narines juſqu'à ſon extrémité. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune-verdâtre; & les ongles noirs. On le trouve dans les champs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

que luteo-virideſcens, à naribus ad apicem uſque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque luteo-virideſcentes; ungues verò nigri. In campeſtribus locis habitat. *Ex muſeo Realmuriano.*

13. Le grand Pluvier de Bengale.

Pluvialis ſuperne ſplendidè fuſca, nigro reſperſa, infernè nigra; capite ſuperiore, gutture & collo nigris; genis dilutè caſtaneis; rectricibus ſplendidè fuſcis, punctulis & tæniis tranſverſis nigris notatis . . . . Pluvialis Bengalensis major.

Outarde des Indes. *Edwards. Glanur. pag.* 87. *Chap. XL; avec une figure exacte Pl.* 250.
Les Anglois l'appellent, Indian Bustard. *Edwards.*
Les Habitans de Bengale Churge. *Edwards.*

Il eſt aſſez menu à proportion de ſa grandeur. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ un pied onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a environ deux pouces trois lignes de long; ſa queue cinq pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, environ deux pouces; ſon pied cinq pouces trois lignes; & celui du milieu des trois doigts

Pro ratione magnitudinis corpore gracili donatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & undecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes totidem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & tres circiter lineas longum eſt; cauda quinque pollices & ſex lineas; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes quinque pollices cum tribus li-

neis ; & trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas : laterales multò sunt breviores. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Partem capitis superiorem, guttur & collum vestiunt pennæ nigræ, longiusculæ, strictæ. Caput ad latera sive genæ sunt dilutè castaneæ. Dorsum, uropygium, superioresque caudæ tectrices splendidè fuscæ, nigro respersæ : & ex pennis dorsum vestientibus quælibet insuper majusculâ maculâ nigrâ in medio insignitur. Qui color fuscus nigro variegatus in utroque colli inferioris latere protenditur, illud immediatè supra pectus ambit, ibique tæniam transversam efficit. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus cooperientes nigri sunt coloris. Superiores alarum tectrices sunt penitùs candidæ ; minimæ tamen, istæ scilicet quæ versùs articulum carpo humano respondentem sunt positæ, nigro marginantur. Remiges majores sunt in latere exteriore albæ, ad apicem obscurè cinereæ : mediæ candidæ, in tota su-

antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes : les latéraux sont beaucoup plus courts. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le dessus de la tête, la gorge & le col sont couverts de plumes noires, assez longues & étroites. Les côtés de la tête ou les joues sont d'un marron clair. Le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun brillant, tout parsemé de noir : de plus les plumes du dos ont chacune dans leur milieu une grande tache noire. Ce brun varié de noir s'étend de chaque côté de la partie inférieure du col, l'entoure immédiatement au-dessus de la poitrine, & forme là une bande transversale. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont noirs. Les couvertures du dessus des aîles sont tout-à-fait blanches, excepté les plus petites, placées vers le pli qui répond à celui du poignet, qui sont bordées de noir. Les plus grandes plumes de l'aîle sont blanches du côté extérieur, & terminées d'un cendré obscur : les moyennes sont d'un blanc tout parsemé de noir, & varié de larges bandes transversales de la même

couleur : enfin les plus proches du corps ſont d'un griſâtre tout parſemé de petites taches noires. La queue eſt compoſée de douze plumes du même brun que le dos, parſemé pareillement de petits points noirs, & varié de bandes tranſverſales de la même couleur. Les yeux ſont grands : leur iris eſt de couleur de noiſette ; & les paupieres ſont cendrées. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont blanchâtres ; & les ongles ſont bruns. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

perficie nigro reſperſæ, latiſque tæniis tranſverſis ſimiliter nigris variegatæ : corpori tandem vicinioresad griſeum accedentes, minutis maculis nigris in univerſa ipſarum ſuperficie diſſeminatis. Caudam componunt duodecim rectrices, dorſi inſtar, ſplendidè fuſcæ, punctulis nigris pariter aſperſæ, & tæniis tranſverſis concoloribus variæ. Oculi ſunt magni : ipſorum irides avellaneæ ; palpebræ verò cinereæ. Pars crurum plumis denudata, pedeſque candicantes ; ungues verò fuſci. Habitat in *Bengalenſi* Regno.

14. LE PLUVIER HUPÉ DE PERSE.

Pluvialis criſtata, ſuperne caſtaneo-fuſca, infernè nigra ; pectore ad violaceum inclinante ; imo ventre albo ; capite ſuperiore & criſtâ nigro-viridantibus ; genis, occipitio & collo ad latera candidis ; rectricibus albis, apice nigris.... PLUVIALIS PERSICA CRISTATA.

Charadrius gulâ pileo pectoreque nigris, occipitio criſtato, dorſo teſtaceo, pedibus nigris. Charadrius criſtatus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 1.

Garia, ſ. Vanellus Indicus. *Klein. Avi. pag.* 22. *N°.* 10.

Pluvier des Indes à la gorge noire. *Edwards. Tom. I. pag. XLVII ; avec une figure exacte Pl.* 47.

Il eſt un peu plus gros que le *Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ dix

Craſſitie *Vanellum* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam decem cir-

citer pollices æquat, & ad extremos ungues undecim pollices cum tribus lineis. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duos pollices & tres lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue ſexdecim lineas, extimus tredecim lineas, intimus undecim lineas. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Capitis ſuperior pars pennis veſtitur nigro-viridantibus; quæ pennæ ſunt longiuſculæ; harum enim quædam unius pollicis longitudine pollent, elegantemque criſtam efformant. Genæ, occipitium & collum ad latera albicant. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt caſtaneo-fuſcæ. Guttur & collum inferius nigri coloris. Pectus ex nigro ad violaceum inclinat. Ventrem ſupremum tingit color niger. Venter imus, pennæ caudam ſubtus cooperientes & crurum ſuprema pars albent. Superiores alarum tectrices, majores ſcilicet & minores, corpori finitimæ ſunt dorſo conco-

pouces, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes; ſon pied deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, ſeize lignes, l'extérieur treize lignes, & l'intérieur onze lignes. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes d'un noir mêlé d'un luſtre de verd: ces plumes ſont aſſez longues, quelques-unes ayant juſqu'à un pouce de long, & formant une joli hupe. Les joues, l'occiput & les côtés du col ſont blancs. La partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un marron rembruni. La gorge & la partie inférieure du col ſont noires. La poitrine eſt d'un noir tirant ſur le violet. Le haut du ventre eſt noir. Le bas-ventre, les couvertures du deſſous de la queue & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſus des aîles, grandes & petites, les plus proches du corps ſont

de la même couleur que le dos ; les plus éloignées du corps ſont auſſi d'un marron rembruni, & terminées de blanc. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du poignet, juſqu'à ſon extrémité eſt varié de blanc & de noir. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les moyennes ſont d'un marron rembruni. De ces dernieres les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, & noires à leur extrémité. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un brun foncé. On le trouve dans le Royaume de *Perſe*.

lores ; à corpore remotiores ſimiliter caſtaneo-fuſcæ, ſed albo terminatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano reſpondente ad ipſarum extremitates uſque albo & nigro variegatæ. Remiges majores nigræ : minores caſtaneo-fuſcæ. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad duas tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque albæ, apice nigræ. Roſtrum quoque nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ſaturatè fuſci. Habitat in *Perſiæ* Regno.

** 15. Le Pluvier armé du Sénégal.

Voyez Pl. VII. Fig. 2.

Pluvialis criſtata, ſuperne griſea, infernè albo-fulva ; capite, criſtâ, gutture & maculâ ferri equini æmulâ in medio ventre nigris ; rectricibus albo-fulvis, nigro terminatis, binis utrinque extimis albo-fulvo in apice marginatis, alis armatis .... Pluvialis Senegalensis armata.

An Charadrius remigibus pectore abdomine pedibuſque atris, rectricibus dimidiato-albis, humeris ſpinoſis. Charadrius ſpinoſus? *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 79. *ſp.* 11.

Cum *Pluviale aurea* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim cum semi lineas longum est; cauda tres pollices & septem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus undecim lineas, intimus novem lineas. Extimus digitus cum medio connectitur membranulâ ad primum usque articulum protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis undecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad quatuor linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. In utriusque alæ summitate, id est, versùs articulum carpo humano respondentem calcar extat substantiæ cornu æmulæ, sex cum semi lineas longum, acutissimum & nigrum. Partem capitis superiorem & guttur tingit elegantissimus

Il est à peu près de la grosseur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces deux lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; sa queue trois pouces sept lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied deux pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes, & l'intérieur neuf lignes. Le doigt extérieur est réuni avec celui du milieu par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied onze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. Sur le haut de chaque aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est un épron d'une substance semblable à de la corne, long de six lignes & demie, très-pointu & noir. La partie supérieure de la tête & la gorge sont d'un très-beau noir; cette couleur descend un peu sur la partie inférieure du col. Les plumes qui couvrent l'occiput, dont

quelques-unes ont juſqu'à un pouce neuf lignes de long, ſont fort étroites, & forment une jolie hupe. La partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont gris. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & celles du deſſous des aîles ſont d'un blanc-fauve. Le milieu du ventre eſt marqué d'une aſſez grande tache noire, en forme de fer à cheval, dont la convexité eſt tournée vers la poitrine. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont noires: les moyennes ſont griſes: les grandes les plus proches du corps ſont d'un blanc-fauve; & les plus éloignées du corps ſont noires. L'aîle eſt compoſée de vingt-cinq plumes: les neuf premieres ſont noires: les dix qui ſuivent, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la dix-neuviéme incluſivement, ſont d'un blanc-fauve à leur origine, & noires à leur extrémité, ces deux couleurs coupant obliquement chaque plume, & le noir oc-

color niger; qui color ſupra collum inferius paululùm protenditur. Pennæ occipitium obtegentes, quarum quædam unius pollicis & novem linearum longitudinem obtinent, ſunt ſtrictiſſimæ, elegantemque criſtam efficiunt. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium & ſcapulares pennæ ſunt griſeæ. Caput ad latera, idque infra oculos, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, pennæ caudam ſuperne & infernè cooperientes, inferioreſque alarum tectrices ex albo ad fulvum vergunt. Medius venter majuſculâ inſignitur maculâ nigrâ, ferri equini æmulâ, cujus convexitas pectus ſpectat. Superiores alarum tectrices minimæ, iſtæ ſcilicet quæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, ſunt nigræ: mediæ griſeæ: majores corpori finitimæ albo-fulvæ; à corpore autem remotiores nigræ. Viginti quinque remigibus ala conflatur: novem primores ſunt nigræ: decem proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad decimam primam uſque incluſivè, ſunt in exortu albo-fulvæ, in extremitate nigræ, duo-

bus

bus istis coloribus unamquamque remigem obliquè dividentibus, nigroque colore eò minus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior: vigesima & vigesima prima albo-fulvæ: quatuor corpori finitimæ grisæ. Quæ noviſſimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus albo-fulvis, nigro terminatis: color autem niger tertiam circiter duarum intermediarum longitudinis partem tingit; in lateralibus verò eò minus spatium occupat, quò rectrix fit exterior: binæ insuper utrinque extimæ sunt albo-fulvo in apice marginatæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Habitat in *Senegalensi* regione, unde in *muſeum Realmurianum* missa à *D. Adanſon.*

cupant d'autant moins d'espace, que la plume est plus proche du corps : la vingtiéme & la vingt-uniéme sont d'un blanc-fauve : les quatre plus proches du corps sont grises. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un blanc-fauve, & terminées de noir : cette derniere couleur occupe environ le tiers de la longueur des deux du milieu ; & dans les latérales elle occupe d'autant moins d'espace, que la plume est plus extérieure ; les deux plus extérieures de chaque côté sont de plus bordées de blanc-fauve par le bout. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanſon.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pluvier doré.

2 Petit Pluvier ou Guignard.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Pluvier à collier.* 2. *Petit Pluvier à collier.*

Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 3 pouces pour la 1re. Figure

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Pluvier doré de S. Domingue.

2. Pluvier à collier de S. Domingue.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Grand Pluvier ou Courly de terre.

2. Pluvier armé du Sénégal.

ORDO XVII.

AVES

Digitis quatuor, membranis deſtitutis, tribus ſcilicet anticis, uno poſtico: cruribus in parte inferiore plumis denudatis: aliſque ſat magnis, & volatui idoneis præditæ.

INTER hujus Ordinis Aves aliæ roſtro donantur recto, apice craſſiori : aliæ roſtro ſubrecto, ſursùm modicè tendente, & horizontaliter paululùm compreſſo : aliæ roſtro ſuperne convexo, & apice lateraliter compreſſo: aliæ roſtro recto, lateraliter compreſſo : aliæ roſtro gracili : aliæ roſtro deorſum arcuato : aliæ roſtro recto, horizontaliter plano ; apice ampliato, ſubrotundo, ſpathæformi : aliæ roſtro craſſo & longo : aliæ roſtro craſſo, brevi ; mandibulâ ſuperiore cochleariformi, apice unguiculatâ : aliæ roſtro brevi, recto, apice conico : aliæ

ORDRE XVII.

LES OISEAUX

Qui ont quatre doigts dénués de membranes, trois devant, un derriere : la partie inférieure des jambes dénuée de plumes : & les aîles aſſez grandes, & propres pour le vol.

PARMI les Oiſeaux de cet Ordre les uns ont le bec droit & renflé vers le bout : d'autres ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement : d'autres ont le bec convexe en-deſſus, & comprimé par les côtés vers le bout : d'autres ont le bec droit, & comprimé par les côtés : d'autres ont le bec menu : d'autres ont le bec courbé en arc en en-bas : d'autres ont le bec droit, plat horizontalement ; & ſon bout plus large & arrondi en forme de ſpatule : d'autres ont le bec gros & long : d'autres ont le bec gros, court ; la mandibule ſupérieure ayant la forme d'une cuilliere,

& étant onguiculée à ſon bout: d'autres ont le bec court, droit & conique vers le bout: d'autres ont le bec en cone courbé: d'autres enfin ont le bec en cone applati par les cotés. Je diviſe les Oiſeaux de cet Ordre en douze ſections: dans la premiere ſont ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout, comme le *Vanneau*, le *Jacana*: dans la ſeconde ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement, comme le *Coulon-chaud*: dans la troiſiéme ceux qui ont le bec convexe en-deſſus, & comprimé par les côtés vers le bout, comme la *Perdrix-de-mer*: dans la quatriéme ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés; tous ceux-là ont le corps applati par les côtés, comme le *Rale*: dans la cinquiéme ceux qui ont le bec menu, comme le *Beccaſſeau*, la *Barge*, la *Beccaſſe*: dans la ſixiéme ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas, comme le *Courly*: dans la ſeptiéme ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement, & ſon bout plus large & arrondi en forme de ſpatule, comme la *Spatule*: dans la huitiéme ceux qui ont le bec gros & long, comme la *Cigogne*,

roſtro conico-incurvo: aliæ tandem roſtro conico, lateraliter compreſſo. Hujus Ordinis Aves in duodecim ſectiones dividuntur: prima continet eas quæ roſtro donantur recto, apice craſſiori, ut *Vanellus*, *Jacana*: ſecunda eas quæ roſtrum habent ſubrectum, ſurſum modicè tendens, & horizontaliter paululùm compreſſum, ut *Arenaria*: tertia illas quæ roſtrum habent ſuperne convexum, apice lateraliter compreſſum, ut *Glareola*: quarta eas quæ roſtrum habent rectum, lateraliter compreſſum; quæ omnes corpore donantur quoque lateraliter compreſſo, ut *Rallus*: quinta illas quæ roſtrum habent gracile, ut *Tringa*, *Limoſa*, *Scolopax*: ſexta illas quæ roſtrum habent deorſum arcuatum, ut *Numenius*: ſeptima eas quæ roſtrum habent rectum, horizontaliter planum; ipſius apice ampliato, ſubrotundo, ſpathæformi, ut *Platea*: octava illas quæ roſtro donantur craſſo & longo, ut *Ciconia*, *Ardea*, *Scopus*: nona eas quæ roſtrum habent craſſum & breve; ipſius mandibulâ ſuperiore cochleariformi, apice unguiculatâ,

ut *Cochlearius* : decima illas quæ roſtrum habent breve & rectum ; ipſius apice conico ; iſtæ autem in capite ornantur corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ, ut *Balearica* : undecima eas quæ roſtrum habent conico-incurvum ; ut *Cariama*, *Anhima* : duodecima tandem illas quæ roſtro donantur conico, lateraliter compreſſo ; quæ omnes calvitio in fronte præditæ ſunt, ut *Porphyrio*.

le *Héron*, l'*Ombrette* : dans la neuviéme ceux qui ont le bec gros & court ; la mandibule ſupérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à ſon bout, comme la *Cuilliere* : dans la dixiéme ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout ; ceux-là ont la tête ornée d'une hupe compoſée de plumes reſſemblantes à des racines de Chiendent, comme l'*Oiſeau-royal* : dans l'onziéme ceux qui ont le bec en cone courbé, comme le *Cariama*, le *Kamichy* : & enfin dans la douziéme ceux qui ont le bec en cone applati par les côtés ; tous ceux-là ont le front chauve, comme la *Poule-ſultane*.

SECTIO I.

Eæ quæ roſtrum habent rectum, in apice craſſius.

SECTIO iſta duobus conſtat generibus Avium, unguiculorum longitudine à ſe invicem diſcrepantium. Aliæ enim unguiculis donantur breviſſimis, ut *Vanellus* : aliæ unguiculis gaudent longiſſimis, ut *Jacana*.

SECTION I.

Ceux qui ont le bec droit & renflé vers le bout.

CETTE ſection contient deux genres d'Oiſeaux, qui ſe diſtinguent entr'eux par la longueur de leurs ongles. Les uns ont les ongles très-courts, comme le *Vanneau* : les autres ont les ongles très-longs, comme le *Jacana*.

LXX.

Le genre du Vanneau.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec droit & renflé vers le bout :
Les ongles très-courts.

LXX.

Genus Vanelli.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum rectum, in apice craſſius :
Unguiculi breviſſimi.

** 1. Le Vanneau.

Voyez Pl. VIII. Fig. 1.

Vanellus criſtatus, ſuperne viridi-aureus, infernè albus; capite ſuperiore nigro-viridante; criſtâ nigrâ; tæniâ infra oculos nigricante; gutture albo; collo inferiore nigro-viridante, pennis in apice albo fimbriatis; rectricibus decem intermediis primâ medietate candidis, alterâ nigris, apice albido marginatis, utrinque extima candida, maculâ nigrâ interiùs inſignita .... Vanellus.

Vanellus torquatus, pectore albo, dorſo & alis vireſcentibus. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen VI.*

Vanellus. *Geſn. Avi. pag.* 763. *hujus icon ſatis accurata pag.* 764. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 365.

Jonſt. Avi. pag. 113. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata Tab. XXVII, ſub titulo,* Capella.

Charlet. Exer. pag. 113. *N°. XIII.*

Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. XIII.*

Linn. Syſt. Nat. ed. 6. *Gen.* 60. *ſp.* 4.

Moehr. Avi. Gen. 92.

Vanellus Alberto magno; Pavo agreſtis Geſnero, & Bellonio. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 296.

Vanellus Aldrovandi; Gavia cinerea Eberi & Peuceri; Capella Gazæ; Pavo agreſtis Geſneri. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 425.

Capella. *Charlet. Exer. pag.* 113.
Charlet. Onomazt. pag. 109.
Capella Avis. *Gesn. Avi. pag.* 109.
Capella, seu Vanellus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 523. *hujus icon satis accurata pag.* 526.
Willugh. Ornith. pag. 228. *hujus icon satis accurata Tab. LVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 110. *N°. A.* 1.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Capella, seu Capra. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 273.
Capra. *Gesn. Avi. pag.* 240.
Capra vel Capella. *Gesn. icon. Avi. pag.* 99, *in qua hujus icon satis accurata.*
Tringa cristâ dependente, pectore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°.* 148.
Tringa pedibus rubris, crista dependente, pectore nigro. Vanellus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 2.
Gavia vulgaris. *Klein. Avi. pag.* 19. *N°.* 1.
Parcus; Parra Plinii. *Schwenck.*
Kyvitta, *Schwenckfeldii.*
Dixhuit Gallorum. *Bell. Obs. pag.* 17.
Vanneau. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 209; *avec une figure très-peu exacte pag.* 210.
Vaneau, nommé par aucuns Dixhuit, & par d'autres Papechieu. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 47 *a*, *dans laquelle est la même figure.*
Vaneau. *Alb. Tom. I. pag.* 65; *avec une figure mal coloriée Pl.* 74.
Les Grecs l'appellent Α'ιξ. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Bell. Jonst. Charlet.* Ταὼς ἄγριος. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Turcs, Gulguruk. *Gesn. Aldrov.*
Les Portugais, Bybe. *Gesn. Aldrov.*
Les Catalans, Pigra. *Barr.*
Les Italiens, Paoncello; Paonchello. *Bel. Gesn.* Paonzello. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs de Padouë, Pavonzino. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Vénitiens, Paon. *Gesn. Aldrov.*
Les Boulonnois, Filicetta. *Aldrov.*
Les Allemands, Gyvitt; Gybytz; Zweiel; Kyuutz. *Gesn. Aldrov.* Piwip. *Charlet.* Kuvitz. *Gesn.* Kiwit; Himmel-Ziege. *Rzac.* Gruner; Blaw-Gruner. *Aldrov.*
Les Suisses, Gyfitz. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* Gybitz; Gywitt. *Schwenck.* Kifitz. *Rzac.*
Les Hollandois, Kividit. *Aldrov.*
Les Illyriens, Czieyka. *Gesn. Aldrov.*
Les Polonois, Czayka; Kozielek; Baranek. *Rzac.*
Les Suédois, Wipa; Kowipa. *Linn.*
Les Anglois, Lap-wing. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. & quelques-uns*, Lap-wing Plover. *Alb.* Bastard Plover. *Willugh.*

Raj. Charlet. Sibbald.

Les Anglois Septentrionaux, TEWIT. *Raj.*

Il eſt à peu près de la groſſeur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de douze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; ſa queue quatre pouces cinq lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied un pouce neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere ſeulement trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un noir qui a un certain luſtre de verd. De l'occiput ſortent des plumes noires très-longues & étroites, qui forment une joli hupe: quelques-unes de ces plumes ont juſqu'à trois

Columbam craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duodecim pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & quinque lineas; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes unum pollicem & novem cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; poſticus autem tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & quatuor pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Capitis ſuperior pars nigra eſt cum aliquo virore mixta. Ab occipitio pennæ oriuntur nigræ, longiſſimæ, ſtrictæ,

ſtrictæ, elegantem criſtam efficientes : ex iſtis autem pennis quædam trium pollicum & totidem linearum longitudinem obtinent. Caput ad latera tingit color albo-rufeſcens : quem colorem ſupra oculos & versùs occipitium variegant lineolæ longitudinales nigricantes. In utraque gena majuſcula extat macula nigricans, à qua tænia oritur concolor, infra oculos ducta, & versùs occipitium uſque protenſa. Pars colli ſuperior eſt cinerea, aliquâ viriditate perluſtrata. Dorſum & uropygium tingit elegans viridiaureus color. Pennæ ſcapulares concolores ; plerarumque tamen minorum extremitates elegantiſſimo cupri puri colore perluſtrantur, majores verò ſunt in apice albido marginatæ. Guttur albicat. Collum inferius ad pectus uſque nigro imbuitur colore, cum aliquo virore mixto, pleriſque pennis in apice albo marginatis. Pectus, venter, latera & crurum ſuprema pars albicant. Pennæ caudam ſuperne cooperientes ſunt ſpadiceæ : quæ eam infernè obtegunt, eodem imbutæ colore, ſed dilutiore, & quælibet penna

pouces trois lignes de long. Les côtés de la tête ſont d'un blanc-rouſſâtre : cette couleur eſt variée au-deſſus des yeux & vers l'occiput de petites lignes longitudinales noirâtres. Sur chaque joue eſt une grande tache noirâtre, de laquelle part une bande de la même couleur, qui paſſe par-deſſous les yeux, & s'étend juſque vers l'occiput. La partie ſupérieure du col eſt d'un cendré orné d'un certain luſtre de verd. Le dos & le croupion ſont d'un beau verd-doré. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur ; mais l'extrémité de la plûpart des petites eſt d'une belle couleur de cuivre de roſette ; & les grandes ſont bordées de blanchâtre par le bout. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col juſqu'à la poitrine eſt d'un noir orné d'un certain luſtre de verd, la plûpart des plumes étant terminées par une petite bordure blanche. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un rouge-bai : celles du deſſous ſont de la même couleur, mais plus claire, & chaque plume eſt bordée de blanchâtre par le bout. Les couvertures du deſſous des aîles les plus proches du corps

ſont blanches : les plus éloignées du corps ſont noires. Les petites & les moyennes couvertures du deſſus des aîles ſont d'un noir-verd, changeant en violet ſombre : les grandes les plus proches du corps ſont du même verd-doré que le dos, & pluſieurs ſont bordées de blanchâtre par le bout : enfin les grandes les plus éloignées du corps, ainſi que l'aîle bâtarde, ſont d'un beau noir. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſept plumes : les quatre premieres ſont noires & terminées de gris-blanc, cette couleur occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure : les ſix ſuivantes, ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont entiérement noires : les douze qui ſuivent, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la vingt-deuxiéme incluſivement, ſont blanches à leur origine, & noires dans le reſte de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus proche du corps : les cinq plus proches du corps ont auſſi un peu de blanc à leur origine ; le reſte de leur longueur eſt d'un verd-doré en-deſſus & cendré en-deſſous. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt

in apice albido marginatur. Tectrices alarum inferiores corpori viciniores ſunt candidæ, à corpore remotiores nigræ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ nigro-viridantes, violaceo obſcuro variantes : majores corpori finitimæ eodem imbuuntur viridi-aureo ac dorſum ipſum tingitur, & ex iſtis plures albido in apice marginantur: majores tandem à corpore remotiores, ſicut & ala notha, ſunt ſplendidè nigræ. Viginti ſeptem remigibus ala conflatur : quatuor primores nigræ, cinereo-albo terminatæ, qui cinereo-albus color eò majus ſpatium occupat, quo remix fit exterior : ſex quæ ſequuntur, à quinta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, penitùs nigræ : duodecim proximè ſequentes, ab undecima ſcilicet ad vigeſimam ſecundam uſque incluſivè, in exortu albæ, in reliqua longitudine nigræ, albedine eò majus ſpatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : quinque corpori finitimæ ſunt quoque in exortu candidæ, in reliqua longitudine ſuperne viridi-aureæ, infernè cinereæ. Quæ noviſſimè dictæ longæ ſunt & acu-

tæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Tertia & quarta reliquas omnes longitudine superant. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum decem intermediæ ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque candidæ, in reliqua longitudine splendidè nigræ, apice albido marginatæ: utrinque extima per totam longitudinem candida, attamen in latere interiore majusculâ maculâ nigrâ versùs ipsius extremitatem insignita. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, ungueſque nigri. Pars crurum plumis denudata & pedes fusco-rubescentes.

Fœmina à *mare* differt magnitudine quâ ei paulò cedit, & coloribus in parte corporis superiore non ita vividis. Ab illo quoque discrepat cristâ multò breviori. In reliquis cum illo perfectè convenit.

Insectis victitant. In campestribus locis & juxta aquas degunt. *Ex museo Realmuriano.*

pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La troisiéme & la quatriéme sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes: les dix du milieu sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, le reste est d'un noir brillant, & bordé de blanchâtre par le bout: la plus extérieure de chaque côté est blanche dans toute sa longueur, excepté une grande tache noire qu'elle a sur le côté intérieur vers son extrémité. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec & les ongles sont noirs. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-rougeâtre.

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle est un peu plus petite, & que les couleurs du dessus de son corps sont moins vives. Elle en différe encore en ce que sa hupe est beaucoup plus courte. Du reste elle lui ressemble parfaitement.

Ils se nourrissent d'*Insectes*. On les trouve dans les champs & sur les bords des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. Le Vanneau gris.

Voyez Pl. IX. Fig. 1.

Vanellus ſuperne griſeo-fuſcus, marginibus pennarum albidis, infernè albo & fuſco-nigricante varius; gutture & imo ventre albis; rectricibus candidis, fuſco tranſverſim ſtriatis.... Vanellus griseus.

Pardalus. *Geſn. Avi. pag.* 639.
Pardalus ſecundus. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 316.
Pluvialis cinerea, ſeu Pardalus Ariſtotelis. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 533. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 534.
Pluvialis cinerea. *Jonſt. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Raj. Syn. Avi. pag. 111. *N°. A.* 3.
Charlet. Exer. pag. 113. *N°.* 1.
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 1.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 415.
Pluvialis cinerea flaveſcens. *Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag.* 19.
Pluvialis cinerea, Squatarola Venetiis dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 229. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVII.*
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 56. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 26. (*roſtrum longius*).
Pluvialis totus cinereus. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. VII. ſp.* 2.
Gavia, ſ. Pluvialis cinerea. *Klein. Avi. pag.* 20. *N°.* 3.
Tringa nigro-fuſca, ſubtus alba, roſtro nigro, pedibus vireſcentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 155.
Tringa Auguſti menſis. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 11.
Tringa roſtro nigro, pedibus vireſcentibus, corpore griſeo, ſubtus albido. Squatarola. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 13.
Numenius pullus ſubtus albidus. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 478.
Vanellus fuſcus: Kyvitta fuſca. Merula novalium. *Schwenckfeldii.*
Pluvier gris. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 262; *avec une mauvaiſe figure pag.* 263.
Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 63 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.*
Alb. Tom. I. pag. 67; *avec une figure mal coloriée Pl.* 76.
Les Grecs l'appellent Πάρδαλος. *Geſn. Aldrov.*
Les Boulonnois, Pivier Montano. *Aldrov.*
Les Vénitiens, Squatarola. *Willugh. Sibbald. Marſil. Klein.*
Les Allemands, Graver Keuwit. *Rzac.* Grawer Gyfitz; Grosser

BRACH-VOGEL; BRACH AMSEL. *Schwenck.*

Les Polonois, PTAK DESSCZOWY POPIELATY. *Rzac.*

Les Anglois, GREY PLOVER. *Willugh. Raj. Charlet. Alb. Browne.* STONE-PLOVER. *Charlet.*

Les Anglois de la Jamaïque, WAG-TAIL. *Browne.*

Craſſitie *Pluvialem auream* circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem decem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & lineas binas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum decem lineis; pars crurum plumis denudata decem cum ſemi lineas; pes unum pollicem & ſex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas, extimus undecim cum ſemi lineas, intimus decem lineas; poſticus autem ſolummodo ſeſquilineam. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo diſtant, alæ verò complicatæ ad quatuor uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces deux lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; ſa queue deux pouces dix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix lignes & demie; ſon pied un pouce ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere une ligne & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à quatre lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes d'un gris-brun, bordées de

blanchâtre. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés ſont variés de blanc & de brun-noirâtre. Le bas-ventre & le haut des jambes ſont tout-à-fait blancs, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-brun, & marquées ſur leurs bords de taches blanches : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanc par le bout. L'aîle bâtarde eſt d'un brun foncé. Les plumes de l'aîle (excepté les trois plus proches du corps) ſont d'un brun-noirâtre d'autant moins foncé, que la plume eſt plus proche du corps, & ont depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : toutes, excepté les deux premieres, ſont de plus marquées d'une petite tache blanche, placée auprès de leur tige ſur le côté extérieur vers les deux tiers de

ſuperiorem, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ griſeo-fuſcæ, marginibus albidis prædítæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Guttur albicat. Pars colli inferior, pectus, venter ſupremus & latera albo & fuſco-nigricante variegantur. Venter imus, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes penitùs albent. Tectrices alarum ſuperiores minores ſunt pennis dorſum veſtientibus concolores : majores corpori finitimæ griſeo-fuſcæ, maculis candidis ſupra ipſarum margines inſignitæ : majores tandem à corpore remotiores fuſco-nigricantes, albo in apice marginatæ. Ala notha eſt ſaturatè fuſca. Alarum remiges (tribus corpori vicinioribus exceptis) tingit color fuſco-nigricans eò minùs ſaturatus, quò remix fit corpori finitima; attamen ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque ſunt in latere interiore maximâ parte candidæ : omnes inſuper, duabus primoribus exceptis, minutâ inſigniuntur maculâ candidâ, prope ſcapum in latere exteriore versùs duas tertias lon-

gitudinis partes positâ : tres remiges corpori viciniores sunt per totam longitudinem griseo-fuscæ. Quæ tres novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ, fusco transversim striatæ : laterales autem in latere interiore eò minùs insigniuntur tæniis fuscis, quò exteriores fiunt ; & utrinque extima unicâ tantùm tæniâ fuscâ in latere exteriore notatur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricant. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

leur longueur : les trois plumes les plus proches du corps sont d'un gris-brun dans toute leur longueur. Ces trois dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de brun : les latérales ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes, qu'elles sont plus extérieures ; & la plus extérieure de chaque côté n'a même qu'une de ces bandes sur son côté extérieur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. Le Vanneau varié.

Voyez Pl. IX. Fig. 2.

Vanellus superne fuscus, albido variegatus, infernè albus ; collo inferiore maculis longitudinalibus griseo-fuscis vario ; rectricibus decem intermediis albis, fusco transversim striatis, utrinque extima alba, tæniâ longitudinali fuscâ exteriùs notata . . . . Vanellus varius.

Pardali Bellonii congener. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 530, *in quæ hujus icon non satis accurata.*

Præcedentem crassitie paulùlùm antecellit. Ipsius lon-

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur de-

puis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces onze lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; ſa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix lignes; ſon pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere une ligne & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied onze pouces huit lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un brun varié de blanchâtre, de façon que chaque plume eſt brune, marquée ſur ſes bords de petites taches rondes blanchâtres, & bordée de la même couleur par le bout. Celles qui couvrent le croupion ſont pareillement brunes, bordées & variées de même de taches, mais

gitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim lineas, intimus decem lineas; poſticus autem ſeſquilineam tantùm. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis undecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, pars colli ſuperior, dorſum & ſcapulares pennæ ſunt fuſcæ, albido variegatæ; ita ut unaquæque penna ſit fuſca, ſupra margines minutis maculis rotundis albidis inſignita, & eodem colore in apice marginata. Quæ uropygium obtegunt, ſunt quoque fuſcæ, marginibus

marginibus & maculis, non quidem albidis, sed flavicantibus, similiter præditæ. Superiores caudæ tectrices albicant, paucoque grisco & flavicante ad apicem variegantur. Guttur candidum. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem grisco-fuscæ, & ad margines candidæ. Pectus, venter, latera, crurum pars suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, sunt pennis dorsum vestientibus concolores: majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Ala notha nigricat. Remiges alarum majores sunt quoque nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ; ex istis quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice marginatæ: proximè sequentes in latere interiore albæ, in latere exteriore grisco-fuscæ, albo fimbriatæ: sex corpori finitimæ fuscæ, maculis

qui, au lieu d'être blanchâtres, sont jaunâtres. Les couvertures du dessus de la queue sont blanches, & variées à leur bout d'un peu de gris & de jaunâtre. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-brun dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes du dos: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. L'aîle bâtarde est noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur, & ont depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche; cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout: les suivantes sont blanches du côté intérieur, d'un gris-brun & bordées de blanc du côté extérieur: les six plus proches du corps

ſont brunes, & variées ſur leurs bords de taches blanchâtres. Ces dernieres ſont longues & pointues, & lorſque l'aîle eſt pliée, il ne s'en faut que de quinze lignes qu'elles ne s'étendent auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes : les dix du milieu ſont blanches, & rayées tranſverſalement de brun ; le blanc tire un peu ſur le jaunâtre ſur les deux plumes du milieu & ſur le côté extérieur des latérales : ces dernieres ont du côté intérieur d'autant moins de bandes brunes, qu'elles ſont plus extérieures : la plus extérieure de chaque côté eſt blanche, & marquée ſeulement ſur ſon côté extérieur d'une bande longitudinale brune. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

candicantibus ad margines variegatæ. Quæ nuper deſcriptæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates, exceptâ tantùm quindecim linearum diſtantiâ, pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem excedit. Cauda duodecim conſtat rectricibus, quarum decem intermediæ albæ, fuſco tranſverſim ſtriatæ ; quæ albedo in rectricibus binis intermediis & in lateralium exteriore latere ad flavicantem colorem paululùm inclinat : laterales autem eò minùs interiùs inſigniuntur tæniis fuſcis, quò exteriores fiunt : utrinque extima alba, tæniâ tantùm longitudinali fuſcâ in latere exteriore notata. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Juxta maris littora verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 4. Le Vanneau de Suisse.

Voyez Pl. X. Fig. 1.

Vanellus nigricans, ſuperne maculis tranſverſis albis varius ; ſyncipite albido ; capite & collo ſuperioribus fuſcis, marginibus pennarum albidis ; imo ventre albo ; rectricibus candidis, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis, utrinque

extimâ interiùs penitùs candidâ . . . . VANELLUS HELVETICUS.

Cum *Vanello noſtrate* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem decem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues undecim pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus undecim cum ſemi lineas, intimus decem cum ſemi lineas; poſticus autem ſolummodo ſeſquilineam. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis & decem pollicum; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Synciput candicat. Partes capitis & colli ſuperiores veſtiunt pennæ fuſcæ, candicante marginatæ: versùs colli latera procedendo, pennæ ferè

Il eſt à peu près de la groſſeur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; ſa queue trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix lignes; ſon pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts anterieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere une ligne & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt blanchâtre. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont couvertes de plumes brunes, bordées de blanchâtre: en approchant des côtés du col les plumes ſont preſque entiérement blanches, & ſont ſeule-

ment marquées dans leur milieu d'une petite tache brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige. Les plumes qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont noirâtres, & marquées ſur les deux côtés de taches tranſverſales blanches. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ſont griſes, & marquées de même ſur les deux côtés de taches tranſverſales blanches. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés ſont noirâtres : cependant les côtés de la poitrine ſont variés d'un peu de blanc. Le bas-ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Celles du deſſous des aîles ſont pareillement blanches, ſi l'on en excepte les grandes les plus proches du corps, qui ſont noirâtres. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont brunes & bordées de blanc : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont brunes, & marquées des deux côtés de grandes taches blanches : les grandes les plus éloig-

penitùs albicant, & in ipſarum medio minutâ tantùm notantur maculâ fuſcâ, ſecundùm ſcapi longitudinem ductâ. Quæ partem dorſi ſupremam obtegunt, ſicut & ſcapulares, ſunt nigricantes, in utroque latere maculis tranſverſis albis inſignitæ. Quæ verò dorſum infimum & uropygium cooperiunt, ſunt griſeæ, & in utroque latere maculis tranſverſis albis ſimiliter notatæ. Caput ad latera, idque infra oculos, guttur, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter ſupremus & latera nigricant : pectus tamen ad latera pauco variegatur candido. Venter imus & crurum ſuprema pars albicant. Pennæ caudam ſuperne & infernè tegentes eodem candore nitent. Inferiores alarum tectrices ſunt ſimiliter candidæ, exceptis tamen majoribus corpori finitimis nigricantibus. Tectrices alarum ſuperiores minimæ fuſcæ, albo fimbriatæ : mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, fuſcæ, in utroque latere majuſculis maculis albis notatæ : majores à corpore remotiores fuſco-nigricantes, albido in apice marginatæ. Alam componunt viginti ſep-

tem remiges : decem primores sunt fusco-nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ ; ex istis quinque primores scapo donantur à tribus circiter quartis ipsarum longitudinis partibus versùs extremitatem usque candido ; reliquæ quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, eodem in loco maculâ insigniuntur candidâ, in latere exteriore collocatâ ; quæ macula eò major est, quò remix sit corpori vicinior : undecim proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, fuscæ, in latere exteriore & apice albo marginatæ, & insuper in latere interiore maximâ parte candidæ : sex tandem corpori finitimæ fuscæ, in utroque latere majusculis maculis transversis sordidè albis insignitæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus candidis : binæ intermediæ à quarta circiter longitudinis parte ad ipsa-

nées du corps sont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre par le bout. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les dix premieres sont d'un brun-noirâtre, & ont depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur blanche ; de celles-là les cinq premieres ont leur tige blanche depuis environ les trois quarts de leur longueur jusque vers leur bout ; les cinq autres, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont marquées dans le même endroit d'une tache blanche, placée sur leur côté extérieur, & qui est d'autant plus grande, que la plume est plus proche du corps : les onze suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont brunes, & bordées de blanc extérieurement & par le bout ; elles ont de plus la plus grande partie de leur côté intérieur blanche : enfin les six plus proches du corps sont brunes, & marquées sur les deux côtés de grandes taches transversales d'un blanc sale. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est

composée de douze plumes blanches : les deux du milieu sont rayées transversalement de brun-noirâtre depuis environ le quart de leur longueur jusqu'à leur extrémité : les latérales sont rayées de même du côté extérieur ; mais leur côté intérieur n'est marqué de ces bandes transversales que vers le bout de la plume : de plus chacune de ces plumes a d'autant moins de bandes transversales, qu'elle est plus extérieure ; de sorte que la plus extérieure de chaque côté n'en a que deux du côté extérieur, & point du tout du côté intérieur : celle qui la suit immédiatement, en a trois du côté extérieur, & une seulement du côté intérieur ; & ainsi des suivantes. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve en *Suisse*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin.*

rum extremitatem usque sunt fusco-nigricante transversim striatæ : laterales in latere exteriore similiter striatæ, in latere autem interiore tæniis istis transversis versùs ipsarum extremitatem tantùm notatæ : rectrices verò laterales eò minùs tæniis insigniuntur transversis, quò exteriores fiunt ; ita ut utrinque extima in latere exteriore binis tantùm sit notata tæniis, in interiore nullâ : proximè sequens in latere exteriore tribus, in interiore unicâ tantùm tæniâ notetur ; & sic de cæteris. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungues que nigri. Habitat in *Helvetia*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Gannebin.*

5. Le grand Vanneau de Bologne.

Vanellus superne niger, infernè candicans ; capite & collo superiore castaneis ; collo inferiore & pectore maculis ferrugineis vario ; rectricibus nigris .... Vanellus Bononiensis major.

Ginocchiella vulgò. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 538. *hujus icon minimè accurata pag.* 539.

Les Boulonnois l'appellent Ginocchiella. *Aldrov.*

Magnitudine & crassitie *Vanellum nostratem* multùm antecellit. Caput & collum superius castaneo imbuuntur colore. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes & superiores caudæ tectrices sunt nigræ. Guttur, collum inferius & pectus candicant, & maculis variegantur ferrugineis. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices candicant quidem, sed maculis destituuntur. Remiges sunt nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum in exortu flavicans, in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque ex flavo ad ochræ colorem vergentes; ungues verò nigri. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

Il est beaucoup plus grand & plus gros que *notre Vanneau*. La tête & la partie supérieure du col sont de couleur de marron. Le dos & le croupion sont noirs. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine sont blanchâtres, & variées de taches ferrugineuses. Le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres & sans taches. Les plumes de l'aîle sont noires. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec est jaunâtre à son origine, & noir à son bout. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune tirant sur la couleur d'ochre, & les ongles sont noirs. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

** 6. Le Vanneau armé du Sénégal.

Voyez Pl. X. Fig. 2.

Vanellus griseo-fuscus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; syncipite candido; gutture nigro; imo ventre sordidè albo; rectricibus primâ medietate sordidè albis, alterâ nigris, sordidè albo-rufescente terminatis; membranâ utrinque rostrum inter & oculum luteâ, deorsum dependente; alis armatis .... Vanellus Senegalensis armatus.

Il eſt à peu près de la groſſeur de *notre Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied, & juſqu'à celui des ongles de quatorze pouces dix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; ſa queue trois pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; ſon pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere deux lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds trois pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à quinze lignes au-de-là du bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, eſt une membrane mince, d'un beau jaune, longue d'onze lignes ſur quatre de largeur, qui n'eſt attachée à la tête que par un de ſes côtés, & qui pend en en-bas, en ſe terminant en pointe. Le

Cum *Vanello noſtrate* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem unum pedem æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & quinque lineas longum eſt; cauda tres pollices & lineas binas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum ſemi lineas, extimus duodecim cum ſemi lineas, intimus undecim lineas; poſticus autem binas ſolummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum & trium pollicum; alæ verò complicatæ ad quindecim uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere, roſtrum inter & oculum, membrana extat gracilis, eleganter lutea, undecim lineas

neas longa, quatuor lata, in uno tantùm latere capiti adnexa, deorsum dependens, & in acumen desinens. Synciput tingit candidus color. Guttur nigrum est. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & tectrices alarum superiores minores sunt griseo-fuscæ. Pars colli inferior, pectus, venter supremus, latera & crurum pars suprema eodem imbuuntur colore, sed multò dilutiore. Venter imus, tectrices caudæ superiores & inferiores, pennæ alas subtus obtegentes & superiores alarum tectrices majores corpori finitimæ sordidè albicant : majores à corpore remotiores sunt nigræ. Viginti octo remigibus ala conflatur : decem primores nigræ, attamen in latere interiore versùs ipsarum exortum tantùm sordidè albæ : decem proximè sequentes, ab undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, in exortu sordidè albæ, versùs extremitatem nigræ ; sordidè albus autem color eò majus spatium occupat, quò remix fit corpori vicinior : vigesima prima grisea, nigricante terminata : reliquæ omnes

synciput est blanc. La gorge est noire. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun. La partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés sont de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Le bas-ventre, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les grandes du dessus les plus proches du corps sont d'un blanc sale : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle est composée de vingt-huit plumes : les dix premieres sont noires, excepté leur côté intérieur qui est d'un blanc sale vers l'origine de la plume seulement : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un blanc sale à leur origine, & noires vers le bout ; le blanc sale s'étend d'autant plus loin que la plume est plus proche du corps : la vingt-uniéme est grise & terminée de noirâtre : toutes les autres sont d'un gris - brun d'autant plus foncé, que la plume est plus proche du corps. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues,

& s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un blanc ſale depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur; le reſte eſt noir, & terminé de blanc ſale & rouſſâtre. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron long de deux lignes & demie, & qui ſe termine en une pointe très-aiguë : il eſt noir & d'une ſubſtance pareille à de la corne. Le bec eſt d'un verd-jaunâtre, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont auſſi d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Sénégal*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Adanſon.*

colore imbutæ griſeo-fuſco eò ſaturatiore, quò remix fit corpori finitima. Ex iſtis noviſſimè dictis corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque ſordidè albæ, in reliqua longitudine nigræ, ſordidè albo-rufeſcente terminatæ. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat binas cum ſemi lineas longum, in aciem acutiſſimum deſinens, nigrum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum viridi-flavicans, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata & pedes ſunt quoque viridi-flavicantes; ungues verò nigricant. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Adanſon.*

** 7. LE VANNEAU ARMÉ DE LA LOUISIANE.

Voyez Pl. VIII. Fig. 2.

Vanellus ſuperne griſeo-fuſcus, infernè albo-fulveſcens; capite ſuperiore nigro; rectricibus albo-fulveſcentibus, nigro terminatis, albo-fulveſcente in apice marginatis; membranâ utrinque roſtrum inter & oculum luteo-aurantiâ,

ſupra oculum ductâ, & deorſum dependente ; alis armatis . . . . VANELLUS LUDOVICIANUS ARMATUS.

Præcedentem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & lineas binas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuordecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis ; pes duos pollices & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum ſemi lineas , extimus duodecim cum ſemi lineas , intimus undecim lineas; poſticus autem binas tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis , extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & ſex linearum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In utroque capitis latere , roſ-

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces deux lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long ; ſa queue trois pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes ; ſon pied deux pouces neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle, quatorze lignes & demie , l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes ; & celui de derriere deux lignes & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane , qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles , lorſqu'elles ſont pliées , s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. De chaque côté de la tête , entre le bec & l'œil , eſt une membrane mince , d'un jaune - orangé , longue de quatorze lignes ſur

onze de largeur, dont une partie s'étend au-deſſus des yeux, tandis que l'autre pend en enbas, en ſe terminant en pointe. Le deſſus de la tête eſt noir. La partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les petites couvertures du deſſus de la queue ſont d'un gris-brun. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du deſſous des aîles, celles du deſſous de la queue & les grandes du deſſus ſont d'un blanc tirant un peu ſur le fauve. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps ſont noires. L'aîle bâtarde eſt d'un gris-brun. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſix plumes : les trois premieres ſont noires, & terminées de gris-brun foncé, cette couleur occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure : les ſept ſuivantes, ſçavoir depuis la quatriéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont tout-à-fait noires : les onze qui ſuivent, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont griſes à leur origine, &

trum inter & oculum, membrana extat gracilis, luteo-aurantia, quatuordecim lineas longa, undecim lata, cujus pars una ſupra oculum protenditur, dum altera deorſum dependet, & in acumen deſinit. Caput ſuperius tingit color niger. Pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, tectriceſque caudæ ſuperiores minores ſunt griſeo-fuſcæ. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, pennæ alas ſubtus obtegentes, & tectrices caudæ inferiores, ſicut & ſuperiores majores ex albo nonnihil ad fulvum vergunt. Superiores alarum tectrices, ſicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur : majores à corpore remotiores ſunt nigræ. Ala notha griſeo-fuſca. Alam componunt viginti ſex remiges : tres primores ſunt nigræ, griſeo-fuſco ſaturato terminatæ, qui color griſeo-fuſcus eò majus ſpatium occupat, quò remix exterior fit : ſeptem proximè ſequentes, à quarta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, penitùs nigræ : undecim quæ ſequuntur, ab

undecima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, sunt in exortu griseæ, nigro terminatæ, colore griseo eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior; ita ut undecima sit solummodo in exortu grisea, in reliqua verò longitudine nigra; in sequentibus autem color niger sensim atque sensim minus spatium occupat, ità ut vigesima prima sit tantùm in extremitate nigra: quinque corpori finitimæ sunt dorso concolores. Quinque istæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Ex remigibus tertia & quarta sunt omnium longissimæ. Cauda duodecim constat rectricibus ex albo nonnihil ad fulvescentem vergentibus colorem, nigro terminatis, & albo-fulvescente in apice marginatis. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar extat quatuor cum semi lineas longum, in basi duarum cum semi linearum latitudinem obtinens, in aciem acutissimum desinens, flavum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum aurantio

terminées de noir, le gris occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que l'onziéme n'a de gris qu'à son origine, & est noire dans tout le reste de sa longueur; ensuite le noir diminue peu à peu dans les suivantes, de façon que la vingt-uniéme n'a de noir qu'à son extrémité: les cinq plus proches du corps sont de la même couleur que le dos. Ces cinq dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les troisiéme & quatriéme plumes de l'aîle sont les plus longues de toutes. La queue est composée de douze plumes d'un blanc tirant tant soit peu sur le fauve, terminées de noir, & bordées par le bout de blanc-fauve. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron long de quatre lignes & demie, large de deux lignes & demie à sa bâse & qui se termine en une pointe très-aiguë: il est jaune, & d'une substance pareille à de la corne. Le bec est orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirâtres. On le

trouve à la *Louiſiane*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conſerve dans ſon *cabinet*.

imbuitur colore. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt ſaturatè rubri; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ludovicia*, unde in *muſeum D. Aubry* miſſus eſt.

** 8. LE VANNEAU ARMÉ DE S. DOMINGUE.

Vanellus dilutè fulvus, infernè ad roſeum colorem inclinans; rectricibus dilutè fulvis, lateralibus interiùs ad roſeum colorem vergentibus; membranâ utrinque roſtrum inter & oculum luteâ, ſupra oculum ductâ & deorſum dependente; alis armatis . . . . VANELLUS DOMINICENSIS ARMATUS.

Il eſt à peu près de la groſſeur de *notre Vanneau*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de quatorze pouces cinq lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; ſa queue deux pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; ſon pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere une ligne & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs

Vanellum noſtratem craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & quinque lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum eſt; cauda duos pollices & ſex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus unum pollicem, intimus decem cum ſemi lineas; poſticus autem ſeſquilineam tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. In utroque capitis latere, rostrum inter & oculum, membrana extat gracilis, eleganter lutea, tredecim lineas longa, undecim circiter lata, cujus pars una supra oculum protenditur, dum altera deorsum dependet, & in acumen desinit. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ dilutè fulvæ. Scapulares & superiores caudæ tectrices eodem colore tinguntur. Guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, pars crurum suprema, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex dilutissimo fulvo ad roseum colorem nonnihil inclinant. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores fulvo tinguntur nonnihil saturatio-

est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. De chaque côté de la tête, entre le bec & l'œil, est une membrane mince, d'un beau jaune, longue de treize lignes sur environ onze de largeur, dont une partie s'étend au-dessus des yeux, tandis que l'autre pend en en-bas, en se terminant en pointe. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un fauve clair. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont aussi d'un fauve très-clair & tirant tant soit peu sur le couleur de rose. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un fauve un peu plus foncé. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un fauve rembruni, ayant la plus grande par-

tie de leur côté intérieur d'un fauve plus clair : les moyennes ſont de la même couleur que le dos. De ces dernieres les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un fauve clair : les latérales ſont de la même couleur du côté extérieur, & d'un fauve très-clair tirant ſur le couleur de roſe du côté intérieur. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron long de trois lignes & demie, & qui ſe termine en une pointe très-aiguë : il eſt jaune & d'une ſubſtance pareille à de la corne. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont jaunes. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *S. Domingue* à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

re. Remiges majores ſunt fulvæ, ad fuſcum paululùm vergentes, attamen in latere interiore maximâ parte fulvo dilutiore tinctæ : minores dorſo concolores. Ex minoribus autem remigibus corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ dilutè fulvæ : laterales in latere exteriore concolores, in interiore verò ex dilutiſſimo fulvo ad roſeum colorem nonnihil vergentes. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat tres cum ſemi lineas longum, in aciem acutiſſimum deſinens, flavum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque flavi. Habitat in variis *Americæ* regionibus. Ex *Dominicenſi Inſula* in *muſeum Realmurianum* miſſus eſt à *D. Chervain*.

LXXI.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Vanneau.*

2. *Vanneau armé de la Louisiane.*

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Vanneau gris.*

2. *Vanneau varié.*

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Vanneau de Suisse.

2. Vanneau armé du Sénégal.

LXXI.

Genus Jacanæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, in apice crassius:
Unguiculi longissimi.

LXXI.

Le genre du Jacana.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit & renflé vers le bout:
Les ongles très-longs.

1. Le Jacana.

Jacana nigro-viridans; capite anteriore membranâ dilutè cœruleâ obducto; capite, collo & pectore splendidè violaceo colore variantibus; tectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus nigro-viridantibus . . . . Jacana.

Jacana. *Pison. Hist. Nat. pag.* 90, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Jacana Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 190, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Jonst. Avi. pag. 130. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 57.
Gallinula Brasilienſis, Jacana dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIX.*
Gallinula Brasilienſibus Jacana dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 8.
Les Flamands l'appellent Water-hoen. *Pison.* Water-hun. *Marcgr. Jonst.*
Les Brasiliens, Jacana. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Crassitie *Columbam* adæquat; sed collo & pedibus donatur multò longioribus. Rostrum habet ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & ampliùs longum. Pars crurum plu-

Il est de la grosseur d'un *Pigeon*; mais il a le col & les pieds beaucoup plus longs. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a plus d'un pouce de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, en-

viron dix-huit lignes ; ſon pied environ deux pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes : les latéraux ſont un peu plus courts ; & celui de derriere eſt extrêmement long. Tous les ongles des doigts antérieurs ſont longs d'un demi-pouce. Le devant de la tête eſt couvert par une membrane ronde d'un bleu clair ou de couleur de Turquoiſe. La tête, la gorge, le col & la poitrine ſont d'un noir-verd, changeant en un violet éclatant. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles, celles du deſſus de la queue, le ventre, les côtés & le haut des jambes ſont d'un noir-verd. Les couvertures du deſſous de la queue ſont blanches. Les plumes de l'aîle ſont auſſi d'un noir changeant en verd. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur. Le bec eſt d'une belle couleur d'écarlate depuis ſon origine juſqu'à la moitié de ſa longueur, & de là juſqu'à ſon bout il eſt d'un jaune tirant un peu ſur le verd. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune-verdâtre ; & les ongles tout-à-fait jaunes. On le trouve au

mis denudata octodecim circiter lineas longa eſt ; pes duos pollices cum tribus circiter lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & ſex lineas : laterales paulò ſunt breviores ; poſticus longiſſimus. Ungues autem omnes digitorum anticorum ſemi pollicis longitudinem obtinent. Caput anterius membranâ quâdam obducitur rotundâ dilutè cœruleâ ſive Turcoidis colore imbutâ. Caput, guttur, collum & pectus ex nigro virideſcunt, & ſplendidè violaceo colore variant. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne veſtiunt, ſuperiores caudæ tectrices, venter, latera & pars crurum ſuprema ſunt nigro-viridantes. Tectrices caudæ inferiores albæ. Alarum remiges ex nigro quoque virideſcunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Roſtrum ab ipſius exortu ad medietatem uſque egregii eſt miniati coloris, à medietate ad apicem flavi, cui aliquid viriditatis admixtum eſt. Pars crurum plumis denudata, pedeſque flavo-virideſcentes ; ungues verò lutei. Ha-

bitat in paluſtribus *Braſiliæ* locis.

Bréſil dans les marais.

2. Le Jacana armé ou le Chirurgien.

Jacana nigro-viridans; alis ad fuſcum vergentibus, armatis; rectricibus nigro-viridantibus . . . . Jacana armata.

Jacanæ alia ſpecies, Braſilienſibus Aguapecaca dicta. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191.
Jonſt. Avi. pag. 130.
Gallinula Braſilienſis Aguapecaca dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 9.
Gallina aquatica, minor, alticrura, alis cornutis. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 132.
Porphyrio Americanus, alticrus, alis cornutis. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXIV. ſp.* 5.
Les François de la Guiane l'appellent Poule-d'eau. *Barr.*
Les Indiens de la Guiane, Kapoua. *Barr.*
Les Braſiliens, Aguapecaca. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Magnitudine & craſſitie cum præcedente convenit. Totum corpus pennis veſtitur nigro-viridantibus. Alæ tamen ad fuſcum vergunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-viridantes. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat rectum, acutiſſimum, flavum, ſubſtantiæ corneæ æmulum, quo ſe defendit. Habitat in paluſtribus *Braſiliæ* locis.

Il eſt de la grandeur & de la groſſeur du précédent. Tout ſon corps eſt couvert de plumes d'un noir-verd. Ses aîles tirent cependant ſur le brun. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noir-verd. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron droit, très-pointu, jaune & d'une ſubſtance ſemblable à de la corne, au moyen duquel il ſe défend. On le trouve dans les marais du *Bréſil*.

3. Le Chirurgien noir.

Jacana ſuperne nigra, infernè fuſca; capite anteriore membranâ rufâ obducto; remigibus viridibus, apice fuſcis; rectricibus nigris; alis armatis .... Jacana armata nigra.

Jacanæ tertia ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191.
Jonſt. Avi. pag. 131.
Gallinula Braſilienſis tertia Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 237.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N°.* 10.

Il eſt de la grandeur & de la groſſeur des précédens. La partie antérieure de la tête eſt couverte par une membrane rouſſe. La tête, la gorge, le col, le dos & le croupion ſont noirs. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Les plumes qui couvrent la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſus des aîles, ſont brunes. Les plumes de l'aîle ſont vertes, excepté leur extrémité, qui eſt brune. La queue eſt compoſée de douze plumes noires. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron droit, très-pointu, jaune & d'une ſubſtance ſemblable à de la corne. Le bec eſt d'un jaune de ſafran. La partie des jambes

Magnitudine & craſſitie præcedentes æmulatur. Capitis pars anterior membranâ quâdam obducitur rufâ. Caput, guttur, collum, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices nigri ſunt coloris. Pectus, ventrem, latera & crurum ſupremam partem veſtiunt pennæ fuſcæ. Quæ caudam ſubtus obtegunt, ſuperioreſque alarum tectrices concolores. Remiges ſunt virides, attamen in extremitate fuſcæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus nigris. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat rectum, acutiſſimum, flavum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum croceo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ci-

nerei. Habitat in paluſtribus *Braſiliæ* locis.

qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont cendrés. On le trouve au *Bréſil* dans les marais.

** 4. Le Chirurgien brun.

Voyez Pl. XI. Fig. 1.

Jacana ſuperne caſtaneo-purpurea, infernè ex nigro ad violaceum inclinans; ſyncipite membranâ bipartitâ rubro-aurantiâ obducto; capite, gutture & collo ex nigro ad violaceum vergentibus; remigibus viridi-olivaceis, in extremitate fuſco marginatis; rectricibus binis intermediis fuſcis, caſtaneo-purpureo mixtis, lateralibus caſtaneo-purpureis, omnibus apice nigro-violaceis; alis armatis . . . . .

Jacana armata fusca.

Jacanæ quarta ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191. *Jonſt. Avi. pag.* 131.

Gallinula Braſilienſis quarta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 237. *Raj. Syn. Avi. pag.* 115. *N°.* 11.

Avis cornuta. *Euſ. Nieremb. pag.* 214.

Anſer Chilenſis, ſeu Caput nocturnum. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. I. Charlet. Onomazt. pag.* 115. *N°. I.*

Yohualcuachili, ſeu Caput Chilli nocturnum. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 50. *Cap. CLXXXI.*

Yohualquachili ſeu Caput Chilli nocturnum. *Raj. Syn. Avi. pag.* 178. *N°.* 5.

Jochualcuachili, ſeu Caput nocturnum. *Jonſt. Avi. pag.* 126.

Les Anglois l'appellent Spur-wing'd Goose of America. *Charlet.*

Les Mexiquains, Yohualcuachili. *Nieremb. Fern.*

Morinello paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & undecim lineas.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi groſ que le *Guignard*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces onze lignes. Son bec de-

puis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long ; ſa queue un pouce dix lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce huit lignes ; ſon pied deux pouces deux lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces huit lignes, l'extérieur deux pouces ſix lignes, l'intérieur deux pouces cinq lignes & demie ; & celui de derriere deux pouces trois lignes ; car ſon ongle a juſqu'à ſeize lignes & demie de long, & eſt tout-à-fait droit. Il a ſeize pouces dix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & ſix lignes de hauteur, & eſt arrondie & diviſée en deux lobes dans ſa partie ſupérieure. De chaque côté de la tête eſt une autre petite membrane de la même couleur, arrondie, d'environ deux lignes de large, & qui pend à côté du coin de la bouche. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un noir tirant ſur le violet. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les cou-

Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum eſt ; cauda unum pollicem & decem lineas ; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum octo lineis ; pes duos pollices & totidem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & octo lineas, extimus duos pollices cum ſex lineis, intimus duos pollices & quinque cum ſemi lineas ; poſticus tandem duos pollices & tres lineas ; ungue enim armatur ſexdecim cum ſemi lineas longo, & planè recto. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſexdecim pollicum & decem linearum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Synciput membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudinem & ſex linearum altitudinem obtinente, in parte ſuprema rotundatâ & bipartitâ. In utroque capitis latere altera extat membranula concolor, rotundata, binas circiter lineas lata, & prope oris angulum dependens. Caput, guttur, collum, pectus, venter, inferioreſque caudæ

tectrices ex nigro ad violaceum inclinant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt eleganter castaneo-purpureæ. Latera & tectrices alarum inferiores minores idem tingit color, sed saturatior : tectrices alarum inferiores majores sunt fuscæ. Crurum pars suprema nigricat. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori finitimæ fuscæ ; à corpore remotiores nigræ. Alarum margines, versùs articulum carpo humano respondentem, vestiunt plumulæ castaneo-purpureo & nigricante variæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur : novemdecim primores sunt dilutè viridi-olivaceæ ; ex istis autem septem primores fusco terminatæ, & quartâ circiter longitudinis parte eodem colore in apice marginatæ ; quæ margo fusca per totam prioris remigis longitudinem in latere exteriore protenditur : duodecim quæ sequuntur, ab octava scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, margine fuscâ in apice tantùm præditæ sunt : quatuor corpori

vertures du dessus de la queue sont d'un beau marron-pourpré. Les côtés & les petites couvertures du dessous des aîles sont de la même couleur, mais plus foncée : les grandes couvertures du dessous des aîles sont brunes. Le haut des jambes est noirâtre. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus proches du corps sont brunes ; & les plus éloignées du corps sont noires. Le bord de l'aîle, vers le pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes variées de marron-pourpré & de noirâtre. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les dix-neuf premieres sont d'un verd-d'olive clair ; & de celles-là les sept premieres sont terminées & bordées de brun par le bout dans environ le quart de leur longueur ; cette bordure brune s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la premiere plume : les douze suivantes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont seulement bordées de brun par le bout : les quatre plus proches du corps, sçavoir depuis la vingtiéme jusqu'à la vingt-troisiéme inclusivement, sont d'un

marron-pourpré ; & la vingtiéme eſt variée ſur ſon côté extérieur d'un peu de verd-d'olive. Ces quatre dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un brun mêlé de marron-pourpré, & terminées de noir-violet : les latérales ſont d'un marron-pourpré, & terminées pareillement de noir-violet. Les deux plumes du milieu de la queue ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Sur la partie antérieure de l'aîle, ſçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, eſt une eſpece d'épron large à ſa bâſe de deux lignes & demie, long de quatre lignes & demie, & qui ſe termine en une pointe très-aiguë : il eſt jaune, un peu tourné en-dedans, & d'une ſubſtance pareille à de la corne. Le bec eſt d'un bel orangé. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un cendré-verdâtre. On le trouve au *Bréſil*, au *Mexique*, & à *S. Do-*

viciniores, à vigeſima ſcilicet ad vigeſimam tertiam uſque incluſivè, ſunt caſtaneo-purpureæ ; vigeſima autem in latere exteriore pauco variegatur viridi-olivaceo. Quatuor noviſſimè dictæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ fuſcæ, caſtaneo-purpureo mixtæ, apice nigro-violaceæ : laterales caſtaneo-purpureæ, ſimiliter nigro-violaceo terminatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem omnes ſenſim atque ſenſim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. In parte alarum anteriore, ſcilicet versùs articulum carpo humano reſpondentem, calcar extat duas cum ſemi lineas in baſi latum, quatuor cum ſemi lineas longum, in aciem acutiſſimum deſinens, flavum, paululùm introrſum verſum, ſubſtantiæ corneæ æmulum. Roſtrum eleganter aurantium. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque cinereo-virideſcentes. Habitat in *Braſilia*,

sdia, Mexico & Dominicensi Insula, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Chervain.*

mingue, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Chervain.*

5. Le Chirurgien varié.

Jacana superne castaneo-purpurea, infernè alba; syncipite membranâ tripartitâ rubro-aurantiâ obducto; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ nigrâ à rostro per oculos & secundùm colli latera productâ; remigibus viridibus, in extremitate nigro marginatis; rectricibus castaneo purpureis; alis armatis . . . . Jacana armata varia.

Fulica fronte carunculata, corpore variegato, humeris spinosis, digitis simplicibus, ungue postico longissimo. Fulica spinosa. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 82. *sp.* 4.

Rallus digitis triuncialibus, calcaneo biunciali, aculeiformi, anomalo. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 7.

Poule-d'eau aux aîles épronnées. *Edwards. Tom. I. pag. XLVIII; avec une figure exacte Pl.* 48.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem novem circiter pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim lineas longum est; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum novem lineis, extimus duos pollices & quatuor lineas, intimus

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de treize pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lig-

nes ; & celui de derriere un pouce onze lignes ; car ſon ongle a juſqu'à quatorze lignes & demie de long, & eſt tout-à-fait droit. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt couvert par une membrane d'un rouge-orangé, qui a cinq lignes de largeur & ſix lignes de hauteur, & eſt arrondie & diviſée en trois lobes dans ſa partie ſupérieure. Le deſſus de la tête eſt brun, & varié de quelques taches d'un brun plus obſcur. La partie ſupérieure du col eſt d'un brun foncé. Le dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un marron-pourpré. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui paſſe par-deſſus les yeux, & s'étend juſque vers l'occiput. Au-deſſous de celle-là en eſt une noire, qui part d'auprès de l'origine du bec, paſſe par les yeux, & deſcend enſuite, en ſe courbant, tout le long des côtés du col. Les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs: cette couleur eſt variée de quelques taches rougeâtres, placées ſur les côtés du ventre & le haut des jambes. Les

duos pollices & tres lineas ; poſticus autem unum pollicem cum undecim lineis ; ungue enim donatur quatuordecim cum ſemi lineas longo, & planè recto. Alæ complicatæ ad caudam extremam pertingunt. Synciput membranâ quâdam obducitur rubro-aurantiâ, quinque linearum latitudine & ſex linearum altitudine pollente, in parte ſuprema rotundatâ & tripartitâ. Caput ſuperius fuſcum eſt, quibuſdamque maculis fuſco obſcuriore imbutis variegatum. Pars colli ſuperior ſaturatè fuſca. Dorſum, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices ſunt caſtaneo-purpureæ. In utroque capitis latere tænia extat candida, ſupra oculos ducta, & versùs occipitium uſque protenſa. Infra tæniam iſtam altera adeſt faſcia nigra, prope roſtri exortum orta, per oculos ducta, & deinde reflexa deorſum deſcendit, & ſecundùm colli latera protenditur. Genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum pars ſuprema & pennæ caudam ſubtus cooperientes albicant. Albedinem autem variegant maculæ quædam rubeſcentes, ad ventris latera,

inque crurum parte suprema collocatæ. Pennæ alas infernè vestientes sunt fusco-rubescentes. Scapulares dilutè fuscæ. Tectrices alarum superiores minimæ castaneo-purpureæ : mediæ fuscæ : majores verò nigræ. Alarum remiges (quatuor corpori vicinioribus exceptis) eleganter virides, nigro in extremitate marginatæ; quæ margo nigra per totam primoris remigis longitudinem in latere exteriore protenditur : quatuor corpori finitimæ fuscæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè attingunt. Duodecim rectricibus castaneo-purpureis cauda conflatur. In parte alarum anteriore, scilicet versùs articulum carpo humano respondentem, calcar quoddam extat crassiusculum, in aciem acutissimum desinens, flavum, paululùm introrsum versum, substantiæ corneæ æmulum. Rostrum flavo-aurantium. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungues que cinereo-cœruleſcentes. Habitat circa *Carthagenam novam* in *America Meridionali.*

couvertures du dessous des aîles sont d'un brun-rougeâtre. Les plumes scapulaires sont d'un brun clair. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un marron - pourpré : les moyennes sont brunes : & les grandes sont noires. Les plumes de l'aîle (excepté les quatre plus proches du corps) sont d'un beau verd, & bordées de noir par le bout : cette bordure noire s'étend aussi dans toute la longueur du côté extérieur de la premiere plume : les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Sur la partie antérieure de l'aîle, sçavoir vers le pli qui répond à celui du poignet, est une espece d'épron assez gros & qui se termine en une pointe très-aiguë : il est jaune, un peu tourné en-dedans, & d'une substance semblable à de la corne. Le bec est d'un jaune-orangé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un cendré-bleuâtre. On le trouve aux environs de *Carthagene* dans l'*Amérique Méridionale.*

SECTION II.

Ceux qui ont le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui du *Coulon-chaud.*

LXXII.

Le genre du Coulon-chaud.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec plutôt courbé en en-haut que droit, & un peu comprimé horizontalement.

SECTIO II.

Eæ quæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens, & horizontaliter paululùm compressum.

UNICO genere, *Arenariæ* scilicet, constituitur hæc sectio.

LXXII.

Genus Arenariæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum subrectum, sursum modicè tendens, horizontaliter paululùm compressum.

** 1. LE COULON-CHAUD.

Arenaria superne nigro, fusco & ferrugineo varia, infernè alba ; genis & collo inferiore nigris ; collo superiore & uropygio candidis ; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuscis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuscis, albo terminatis, utrinque extima candida, maculâ fuscâ interiùs notata .... ARENARIA.

Tringa nigro, albo, ferrugineoque variegata, pectore abdomineque albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 154.

Tringa pedibus rubris ; corpore nigro albo ferrugineoque vario , pectore abdomineque albo. Interpres. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 4.

Tringa maritima. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 10.

Morinellus marinus D. Brown. *Willugh. Ornith. pag.* 231. *hujus icon minùs accurata Tab. LVIII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 112. *N°. A.* 5.

Cinclus. *Moehr. Avi. Gen.* 95.

Gavia , quæ Pluvialis Arenaria nostra, Raji. *Klein. Avi. pag.* 21. *N°.* 9.

Tourne Pierre de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXLI ; avec une figure assez exacte Pl.* 141.

Les Gothlandois l'appellent Tolck. *Linn.*

Les Anglois , Turn-Stone ; Sea-Dotterel. *Raj.* Sea-Dottrel ; Sea-Dottrell. *Willugh.* Turn-Stone from Hudson's-Bay. *Edwards.*

Crassitie *Merulam* circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues octo pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices & quatuor lineas ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes undecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum semi lineas , extimus decem lineas , intimus novem lineas ; posticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum ala-

Il est à peu près de la grosseur d'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de huit pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces quatre lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes quatre lignes ; son pied onze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs , joint avec l'ongle , onze lignes & demie , l'extérieur dix lignes , l'intérieur neuf lignes ; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane , qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quinze pouces six lignes de vol ;

& ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Immédiatement au-deſſus de l'origine du demi-bec ſupérieur eſt une petite bande noire, qui s'étend de chaque côté juſqu'aux yeux. Au-deſſous de cette petite bande l'eſpace contenu entre la narine & l'œil eſt blanc. Le ſommet de la tête eſt couvert de petites plumes noires, bordées de blanc. Le ſynciput, les côtés de la tête derriere les yeux, la gorge & le deſſus du col ſont blancs; cette couleur s'étend de chaque côté juſque vers l'origine de l'aîle. Les joues ou les côtés de la tête au-deſſous des yeux, la partie inférieure & les côtés du col ſont noirs. La partie ſupérieure du dos & les plumes ſcapulaires ſont variées de noir, de brun & de ferrugineux. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus de la queue ſont noires; il faut cependant en excepter les plus longues, qui ſont blanches. Les petites & les moyennes du deſſus des aîles ſont variées de gris-brun, de noirâtre & de ferrugineux

rum extenſarum diſtantia eſt quindecim pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Immediatè ſupra mandibulæ ſuperioris exortum exigua extat tænia nigra, utrinque ad oculos uſque producta. Infra quam tæniam ſpatium narem inter & oculum contentum albicat. Summum caput obtegunt plumulæ nigræ, albo fimbriatæ. Synciput, caput ad latera, idque ponè oculos, guttur & collum ſuperius ſunt candida; qui candor utrinque versùs alarum exortum uſque protenditur. Genæ ſive capitis latera infra oculos, collum inferiùs & ad latera nigri ſunt coloris. Dorſi ſuprema pars & ſcapulares pennæ nigro, fuſco & ferrugineo variegantur. Dorſum infimum, uropygium, pectus, ventrem, latera, crurumque partem ſupremam veſtiunt pennæ albæ. Quæ caudam infernè cooperiunt, alarumque tectrices inferiores concolores. Superiores caudæ tectrices nigræ, exceptis tamen longioribus candidis. Tectrices alarum ſuperiores minimæ & mediæ griſeo-fuſco, nigri-

cante & ferrugineo diluto variegantur : majores corpori finitimæ sunt in latere interiore & apice candidæ, in latere exteriore saturatè fuscæ, albo marginatæ : majores tandem à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem intimæ apicibus albis præditæ sunt. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, deinde fuscæ, albo in apice marginatæ ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior : sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ ; quæ macula eò major est, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ no-

clair : les grandes les plus proches du corps sont blanches du côté intérieur & à leur bout ; leur côté extérieur est d'un brun foncé, & bordé de blanc : enfin les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé ; & de celles-là les plus intérieures sont terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont blanchâtres en-dessous ; mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche ; cinq de celles-là, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout ; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : les six qui suivent, sçavoir depuis la quinziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité ; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps : enfin les quatre plus

proches du corps ſont brunes. Ces quatre dernieres ſont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont blanches à leur origine, enſuite d'un brun foncé dans le reſte de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les ſuivent immédiatement de chaque côté, ſont blanches depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié eſt d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté eſt blanche, & marquée ſeulement d'une aſſez grande tache brune, placée ſur ſon côté intérieur vers le bout. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont orangés ; & les ongles noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

viſſimæ remiges longæ ſunt, ſtrictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus, quarum binæ intermediæ ſunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine ſaturatè fuſcæ, albo in apice marginatæ : quatuor utrinque proximè ſequentes ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque candidæ, alterâ medietate ſaturatè fuſcæ, albo terminatæ ; fuſco tamen colore eò minus ſpatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extima candida, majuſculâ tantùm notata maculâ fuſcâ, in latere interiore versùs ipſius apicem poſitâ. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque aurantii ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 2. Le Coulon-chaud cendré.

Voyez Pl. XI. Fig. 2.

Arenaria ſuperne cinereo-fuſca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; collo inferiore & pectore ſaturatè fuſcis; uropygio candido; rectricibus binis intermediis in exortu albis, in reliqua longitudine fuſcis, in apice albo marginatis, quatuor utrinque proximis primâ medietate candidis, alterâ fuſcis, albo terminatis, utrinque extima candida, maculâ fuſcâ interiùs notata.... Arenaria cinerea.

Allouette de mer. *Cateſb. Tom. I. pag.* 72; *avec une figure exacte Pl.* 72. *Les Anglois l'appellent*, Turn-Stone; Sea-Dottrel. *Catesb.*

Præcedentem craſſitie nonnihil antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem novem pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque undecim cum ſemilineas longum eſt; cauda duos pollices cum quinque lineis; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes undecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum ſemi lineas, extimus decem lineas, intimus octo cum ſemi lineas; poſticus autem tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad

Il eſt un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a onze lignes & demie de long; ſa queue deux pouces cinq lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois lignes; ſon pied onze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur dix lignes, l'intérieur huit lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend

jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces trois lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & le dessus du col sont d'un gris-brun. La partie supérieure du dos est couverte de plumes de la même couleur, & bordées de blanchâtre. Les scapulaires sont pareillement d'un gris-brun, & bordées de même de blanchâtre ; cependant deux de celles-là, sçavoir les inférieures, sont tout-à-fait blanches. La gorge est de cette derniere couleur. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un brun foncé ; & la poitrine est variée sur ses côtés d'un peu de blanchâtre. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus de la queue sont brunes : les grandes sont blanches. Les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-brun, bordées & terminées de blanc : & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé. L'aîle est com-

primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & trium linearum invallo distant ; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput & collum superius sunt griseo-fusca. Dorsi supremam partem vestiunt pennæ eodem colore imbutæ, marginibus albidis præditæ. Scapulares sunt quoque griseo-fuscæ, albido similiter marginatæ ; ex istis tamen binæ, inferiores scilicet, penitùs albent. Guttur quoque albicat. Collum inferius & pectus sunt saturatè fusca ; pectus tamen ad latera pauco candicante varium. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices caudæ superiores minores sunt fuscæ : majores candidæ. Superiores alarum tectrices minimæ & mediæ pennis dorsum vestientibus concolores : majores corpori finitimæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ & terminatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : decem pri-

mores subtus candicant, superne verò sunt fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ, & scapo albo præditæ; ex istis quinque, à sexta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo sunt in apice fimbriatæ : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, in exortu candidæ, dein fuscæ, albo in apice marginatæ; quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò remix fit corpori vicinior : sex quæ sequuntur, à decima quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, candidæ, maculâ fuscâ, in latere interiore versùs ipsarum extremitatem positâ, notatæ; quæ macula eò major est, quo remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ. Quatuor istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ sunt in exortu albæ, dein in reliqua longitudine saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ : quatuor utrinque proximæ ab ipsarum

posée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont blanchâtres en-dessous, mais en-dessus elles sont brunes, & la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un gris-blanc, & leur tige blanche ; cinq de celles-là, sçavoir depuis la sixiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont blanches à leur origine, ensuite brunes, & bordées de blanc par le bout ; cette bordure blanche est d'autant plus large, que la plume est plus proche du corps : les six qui suivent, sçavoir depuis la quinziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches, & marquées d'une tache brune, placée sur leur côté extérieur vers leur extrémité ; cette tache est d'autant plus grande, que la plume est plus éloignée du corps : enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernieres sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont blanches à leur origine, ensuite d'un

brun-foncé dans le reſte de leur longueur, & bordées de blanc par le bout : les quatre qui les ſuivent immédiatement de chaque côté, ſont blanches depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, l'autre moitié eſt d'un brun foncé, & terminée de blanc, le brun occupant d'autant moins d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure : la plus extérieure de chaque côté eſt blanche, & marquée ſeulement d'une aſſez grande tache brune, placée vers ſon bout ſur ſon côté intérieur. Le bec eſt brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

exortu mediam versùs longitudinem uſque candidæ, in altera medietate ſaturatè fuſcæ, albo-terminatæ ; fuſco tamen colore eò minus ſpatium occupante, quò rectrix exterior fit : utrinque extima candida, majuſculâ tantùm notata maculâ fuſcâ, in latere interiore versùs ipſius apicem poſitâ. Roſtrum fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri ; ungues verò nigricantes. Circa maris littora verſatur. *Ex muſeo D. Aubry.*

SECTION III.

Ceux qui ont le bec convexe en-deſſus & comprimé par les côtés vers le bout.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de la *Perdrix-de-mer.*

SECTIO III.

Eæ quæ roſtrum habent ſuperne convexum & apice lateraliter compreſſum.

IN illa ſectione unicum continetur genus, ſcilicet *Glareolæ.*

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Chirurgien brun.

2. Coulon-chaud cendré.

LXXIII.

Genus Glareolæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum superne convexum, apice lateraliter compressum.

LXXIII.

Le genre de la Perdrix-de-mer.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec convexe en-dessus, & comprimé par les côtés vers le bout.

** 1. La Perdrix-de-mer.

Voyez Pl. XII. Fig. 1.

Glareola superne splendidè griseo-fusca, infernè ex albo nonnihil rufescens; gutture & collo inferiore albo-rufescentibus, lineâ nigrâ circumdatis; pectore griseo-rufescente; lateribus dilutè castaneis; rectricibus quatuor utrinque extimis in exortu albis, versùs apicem fusco-nigricantibus, tribus extimæ proximis exteriùs griseo-fusco marginatis. .... Glareola.

Glareola secunda. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Erythropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 109, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinulæ aquaticæ undecimum genus, quod Erythropodem minorem appello, vulgus Koppriegerle. *Gesn. Avi. pag.* 513, *in qua eadem icon.*
Gallinula Erythropos minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 454, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinula Erythropus minor. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Hirundo marina. *Jonst. Avi. pag.* 84.
Charlet. Exer. pag. 96. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 90. *N°.* 5.
Hirundo marina Avis. *Aldrov. Avi. Tom. II. pag.* 696. *hujus icon non satis accurata pag.* 697.
Hirundo marina Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 156.

Raj. Syn. Avi. pag. 72.

Hirundinis ripariæ ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 96. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 46.

Pratincola. *Kramer. Elench. veget. & Anim. pag.* 381; *cum icone ſatis accurata.*

Les Allemands l'appellent KOBEL REGERLIN; SAND-VOGEL. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Straſbourg, KOPPRIEGERLE. *Geſn. Aldrov. Schwenck.*

Les Autrichiens, BRACH-VOGEL. *Kramer.*

Les Anglois, SEA-SWALLOW. *Charlet.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'un *Merle.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces huit lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix lignes & demie de long; ſa queue quatre pouces une ligne; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes & demie, l'extérieur ſept lignes & demie, l'intérieur ſept lignes; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a un pied dix pouces trois lignes de vol; & ſes aîles lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à quatre lig-

Merulam craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque decem cum ſemi lineas longum eſt; cauda quatuor pollices cum linea unica; pars crurum plumis denudata tres cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim cum ſemi lineas, extimus ſeptem cum ſemi lineas, intimus ſeptem lineas; poſticus autem quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis decem pollicum & trium linearum intervallo

distant ; alæ verò complicatæ ad quatuor usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, dorsum & uropygium vestiunt pennæ splendidè griseo-fuscæ. Scapulares concolores. Guttur & collum inferius alborufescente tinguntur colore ; quem colorem circumdat linea nigra, ab oris angulo versùs pectus ducta, & sic ad alterum oris angulum protensa. Pectus ex griseo rufescit. Venter, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex albo nonnihil rufescunt ; latus tamen crurum exterius pauco griseo variegatur. Latera sunt dilutè castanea. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniores, eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur : majores à corpore remotiores ex fusco nigricant. Inferiores alarum tectrices minores sunt splendidè fuscæ : majores corpori finitimæ dilutè castaneæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes. Alam componunt viginti tres remiges : novem primores ex fusco nigricant ; omnium tamen prior scapo

nes au-delà du bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion & les plumes scapulaires sont d'un gris-brun assez brillant. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre ; cette couleur est entourée d'une ligne noire, qui s'étend d'un coin de la bouche à l'autre, en passant vers la poitrine, qui est d'un gris-roussâtre. Le ventre, le haut des jambes, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de roussâtre ; il y a cependant un peu de gris sur le côté extérieur des jambes. Les côtés sont d'un marron clair. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont du même gris-brun que celui du dos : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les petites du dessous des aîles sont d'un brun brillant : les grandes les plus proches du corps sont d'un marron-clair : & les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les neuf premieres sont d'un brun-noirâtre, la premiere de toutes ayant sa tige blanchâtre : les huit suivantes, sçavoir depuis la dixié-

me juſqu'à la dix-ſeptiéme incluſivement, & la dix-neuviéme ſont d'un gris-brun brillant du côté extérieur, d'un brun foncé du côté intérieur, & terminées obliquement de blanc; cette couleur ne s'étend que ſur le côté intérieur des dixiéme, onziéme, douziéme & treiziéme plumes : la dix-huitiéme & les quatre plus proches du corps ſont d'un gris-brun brillant comme celui du dos. Ces quatre dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-brun brillant : celle qui les ſuit immédiatement de chaque côté, eſt blanche à ſon origine, enſuite d'un gris-brun brillant dans le reſte de ſa longueur du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre terminé de blanc du côté intérieur : les quatre plus extérieures de chaque côté ſont blanches à leur origine, & d'un brun-noirâtre vers le bout, le blanc occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure ; toutes ces plumes, excepté la plus extérieure de chaque côté, ſont bordées extérieurement d'un gris-brun brillant du côté extérieur, d'un brun foncé du côté intérieur, & terminées obliquement de blanc; cette couleur ne s'étend que ſur le côté intérieur des dixiéme, onziéme, douziéme & treiziéme plumes : la dix-huitiéme & les quatre plus proches du corps ſont d'un gris-brun brillant comme celui du dos. Ces quatre dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus longues plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un gris-brun brillant : celle qui les ſuit immédiatement de chaque côté, eſt blanche à ſon origine, enſuite d'un gris-brun brillant dans le reſte de ſa longueur du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre terminé de blanc du côté intérieur : les quatre plus extérieures de chaque côté ſont blanches à leur origine, & d'un brun-noirâtre vers le bout, le blanc occupant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure ; toutes ces plumes, excepté la plus extérieure de chaque côté, ſont bordées extérieurement d'un gris-brun brillant

candicante donatur : octo proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad decimam ſeptimam uſque incluſivè, & inſuper decima nona ſunt in latere exteriore ſplendidè griſeo-fuſcæ, in interiore ſaturatè fuſcæ, albo obliquè terminatæ ; albedo autem quatuor remigum, decimæ ſcilicet, undecimæ, duodecimæ & tredecimæ, latus tantùm interius occupat : decima octava & quatuor corpori viciniores ſunt, dorſi inſtar, ſplendidè griſeo-fuſcæ. Quatuor iſtæ noviſſimè dictæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ ſplendidè griſeo-fuſcæ : utrinque proximè ſequens in exortu candida, dein in reliqua longitudine exteriùs ſplendidè griſeo-fuſca, interiùs fuſco-nigricans & albo terminata : quatuor utrinque extimæ in exortu albæ, versùs apicem fuſco-nigricantes, albore eò majus ſpatium occupante, quò rectrix exterior fit ; omnes autem iſtæ rectrices, ſi utrinque extimam excipias, ſunt exteriùs griſeo-fuſco ſplendido marginatæ.

marginatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus longitudine cedunt ; laterales autem gradatim longiores fiunt ad utrinque extimam usque binas intermedias unius pollicis & decem linearum longitudine excedentem ; unde fit cauda maximè bifurca. Rostrum basi rubrum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque saturatissimè sanguinei. Maris, fluviorum & stagnorum littora frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

lant. Les deux plumes du milieu de la queue sont plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est plus longue que les deux du milieu d'un pouce dix lignes ; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec est rouge à sa bâse, & noir dans le reste de sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge de sang très-foncé. On la trouve sur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

2. La Perdrix-de-mer a collier.

Glareola superne griseo-fusca, infernè subalbida ; maculâ in syncipite nigrâ ; maculâ utrinque circa oculos, gutture & collo candidis ; torque fusco ; rectricibus griseo-fuscis.... Glareola torquata.

Glareola quinta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 282.
Glareola quinta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°. 6.*
Ochropus minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 109, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 464.
Gallinulæ aquaticæ duodecimum genus, quod Ochropodem minorem nomino, vulgus Riegerle. *Gesn. Avi. pag.* 514, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinula Ochropus minor. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Les Allemands aux environs de Strasbourg l'appellent Riegerle. *Gesn. Aldrov.* Riegerlin. *Schwenck.*
Les Siléſiens, Sand Regerlin ; Tullfisz. *Schwenck.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Caput superius,

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Le dessus

de la tête, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un gris-brun. De chaque côté de la tête eſt une tache blanche, placée vers les yeux. L'eſpace contenu entre ces taches ou le ſynciput eſt noir. La gorge & le col ſont blancs; mais le bas du col eſt entouré d'une ligne brune, qui forme une eſpece de collier. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, & les côtés ſont blanchâtres. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Les petites du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un gris-brun : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur : les moyennes ſont de la même couleur que le dos. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-brun. Le bec eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunâtres; & les ongles noirâtres. Elle fait ſon nid dans le ſable ſur le bord des rivieres, dont elle ne s'éloigne jamais. Elle pond ordinairement ſept œufs oblongs.

dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt griſeo-fuſcæ. In utroque capitis latere macula extat candida, circa oculos poſita. Spatium autem maculas inter iſtas contentum, in ſyncipite ſcilicet, nigrum eſt. Guttur & collum albent; collum autem in parte infima lineâ cingitur fuſcâ, torquem efficiente. Pectus, ventrem, crurum partem ſupremam & latera veſtiunt pennæ ſubalbidæ. Quæ caudam ſubtus obtegunt, concolores. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt griſeo-fuſcæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores ſimiliter nigricant : minores eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices griſeo-fuſcæ. Roſtrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt ſublutei; ungues verò nigricantes. In arenis ad littora fluviorum nidificat; quæ littora nunquam deſerit. Ova parit ut plurimùm ſeptem oblonga.

3. La Perdrix-de-mer tachetée.

Glareola superne fusca, maculis obscurioribus varia, infernè rufa, maculis fuscis & albicantibus variegata; capite & collo pectori concoloribus; imo ventre rufo-candicante, nigris maculis vario; rectricibus candicantibus, apice nigris . . . . . Glareola nævia.

Melampus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 107, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinulæ aquaticæ septimum genus, quod Rot-Knillis vocitant, ego Melampodem cognomino. *Gesn. Avi. pag.* 510, *in qua eadem icon.*
Gallinula Melampos. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 464. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 465.
Gallinula Melampus Gesnero, Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 9.
Gallinula Melampus Willughby. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 380.
Glareola, Gallinula Melampus Gesneri, Aldrovandi, Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 9.
Rot-Knussell Leonardi Baltneri; Gallinula Melampus Gesnero, Aldrovando. *Willugh. Ornith. pag.* 225. *hujus icon non satis accurata Tab. LVI.*
Les Boulonnois l'appellent Giarola. *Aldrov.*
Les Allemands, Rot-Knillis. *Gesn. Aldrov. Willugh.* Wasser-heunlein. *Rzac.*
Les Polonois, Kokosska. *Rzac.*

Magnitudine & crassitie præcedentem antecellit. Caput, guttur, collum, pectus & venter supremus rufo tinguntur, maculisque fuscis & albicantibus variegantur. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices fuscæ sunt, maculis quibusdam obscurioribus distinctæ. Venter imus, latera, crurum pars suprema & pennæ caudam subtus cooperientes ex rufo candi-

Elle est plus grande & plus grosse que la précédente. La tête, la gorge, le col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un roux varié de taches brunes & de taches blanches. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun varié de quelques taches plus obscures. Le bas-ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux-blan-

châtre, joliment varié de taches noires. Les couvertures du deſſus des aîles ſont de la même couleur que le dos, & variées de plus de taches blanches. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les moyennes ſont variées de cendré & de noir. La queue eſt compoſée de douze plumes blanchâtres, terminées de noir. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. On la trouve ſur les bords de la mer & des rivieres.

cant, & nigris maculis elegantur variegantur. Superiores alarum tectrices dorſo concolores, maculis inſuper candidis variæ. Remiges majores nigræ : minores cinereo & nigro diſtinctæ. Caudam componunt duodecim rectrices candicantes, in extremitate nigræ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Circa maris & fluminum littora verſatur.

** 4. La Perdrix-de-mer du Sénégal.

Glareola in toto corpore fuſca ; rectricibus interiùs & ſubtus cinereo-fuſcis . . . . Glareola Senegalensis.

Elle eſt à peu près de la groſſeur de la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces huit lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long ; ſa queue quatre pouces trois lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt degarnie de plumes, quatre lignes ; ſon pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lig-

Glareolam noſtratem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues ſeptem pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque undecim lineas longum eſt ; cauda quatuor pollices cum tribus lineis ; pars crurum plumis denudata quatuor lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim

lineas, extimus septem lineas, intimus sex cum semi lineas; posticus autem tres cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ ad novem usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. In universo corpore, capite scilicet, gutture, collo, dorso, uropygio, pectore, ventre, crurum parte supremâ & lateribus, pennis vestitur fuscis. Scapulares, quæ caudam superne & infernè obtegunt, & superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, concolores: majores à corpore remotiores fusco nonnihil dilutiore imbutæ. Tectrices alarum inferiores minores fuscæ: majores cinereo-fuscæ. Remiges majores sunt saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-fuscæ: minores subtus ex cinereo quoque fusceſcunt, superne verò eodem imbuuntur colore ac

nes, l'extérieur sept lignes, l'intérieur six lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied onze pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à neuf lignes au-delà du bout de la queue. Tout son corps, sçavoir la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, est couvert de plumes brunes. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les petites du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun un peu plus foncé. Les petites couvertures du dessous des aîles sont brunes: les grandes sont d'un cendré-brun. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun foncé; cependant la plus grande partie de leur côté intérieur est d'un cendré-brun: les moyennes sont en-dessous de cette derniere couleur, & en-dessus elles sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres

les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré-brun endeſſous; mais en-deſſus les deux du milieu ſont brunes : toutes les latérales ſont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. Les deux du milieu ſont beaucoup plus courtes que les latérales, qui vont toutes en augmentant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt plus longue que les deux du milieu de près de deux pouces; ce qui rend la queue très-fourchue. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanſon*.

dorſum ipſum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertingunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus ſubtus cinereofuſcis; ſuperne verò binæ intermediæ fuſcæ ſunt : laterales omnes in latere exteriore & apice concolores, in latere interiore cinereofuſcæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus longitudine multò cedunt; laterales autem gradatim majori longitudine pollent ad utrinque extimam uſque binas intermedias duorum ferè pollicum longitudine excedentem; unde fit cauda valdè bifurca. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *muſeum Realmurianum* miſſa à *D. Adanſon*.

SECTION IV.

Ceux qui ont le bec droit & comprimé par les côtés.

CETTE ſection ne contient qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Râle*.

SECTIO IV.

Eæ quæ roſtrum habent rectum & lateraliter compreſſum.

UNICUM genus, *Ralli* ſcilicet, hanc ſectionem conſtituit.

Omnes hujus sectionis Aves corpore donantur lateraliter compresso.

Tous les Oiseaux de cette section ont le corps applati par les côtés.

LXXIV.

Genus Ralli.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum rectum, lateraliter compressum:
Corpus lateraliter compressum.

LXXIV.

Le genre du Râle.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec droit & comprimé par les côtés:
Le corps applati par les côtés.

** 1. Le Rasle d'eau.

Voyez Pl. XII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco-rufescente-olivaceis superne vestitus, infernè cinereus, pennis in imo ventre apice dilutè fulvo marginatis; lateribus nigricantibus, albo transversim striatis; rectricibus nigricantibus, utrinque fusco-rufescente-olivaceo fimbriatis . . . . .
Rallus aquaticus.

Rallus alis grisеis fusco-maculatis, hypochondriis albo-maculatis, rostro luteo. Rallus aquaticus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 2.
Rallus aquaticus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 234. *hujus icon pessima Tab. LVIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 113. *N°. A.* 2.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 12.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 321. *N°. XVI.*
Klein. Avi. pag. 103. *N°.* 2.
Ralla Anglorum & Gallorum ex Gallinularum genere. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 455.
Ralla Anglorum aquatica. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Ortygometra alis fuscis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 58. *sp.* 1.

Ortygometra ſubtus albeſcens, tergore fulvo, maculis caſtaneis. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXV. ſp.* 2.

Ortygometra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 455. *hujus icon à Bellonio mutuata pag.* 456.

Gallinula ſerica. *Geſn. icon. Avi. pag.* 101, *in qua hujus icon minimè accurata.*

Jonſt. Avi. pag. 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata Tab.* 53.

Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 4.

Gallinula ſerica Geſneri, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 235. *Raj. Syn. Avi. pag.* 114. *N°.* 4.

Gallinula, ſeu Gallinago ſerica dicta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 470, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*

Gallinaginis, vel Gallinulæ genus nomine ignoto, quod Samethounle nomino. *Geſn. Avi. pag.* 517, *in qua hujus icon minimè accurata.*

Gallinula Holoſericea. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 4.

Gallinula chloropus, rarior ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 68. *hujus icon minimè accurata Tab.* 32.

Gallinæ aquaticæ ſpecies prima de novo adjecta. *Geſn. Avi. pag.* 515. *in qua hujus icon ſatis accurata (excepto roſtro).*

Glareola ſexta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.

Glareola ſeptima. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.

Glareola ſeptima Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 3.

Gallinago cinerea; Glareola ſeptima Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 381.

Râle d'eau. *Alb. Tom. I. pag.* 67; *avec une figure paſſable (excepté le bec) Pl.* 77.

Raſle noir. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 212; *avec une figure peu exacte pag.* 213.

Raſle, Ralle, Roy & Mere des Cailles. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 49 *a, dans laquelle eſt la même figure.*

Les Catalans l'appellent, GALLA MAREZA. *Barr.*

Les Vénitiens, FORZANE *ou* PORZANA. *Willugh. Alb.*

Les Allemands, SAMETHOUNLE. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Willugh.* AESCH-HEUNLEIN. *Rzac.* AESCH-HEUNLIN; MOTT-HEUNLIN; SCHWARTZ WASSER HEUNLE. *Schwenck.*

Les Anglois, WATER-RAIL. *Willugh. Raj. Sloane. Alb. & quelques-uns* BILCOCK *ou* BROOK-OUZELL. *Willugh. Raj.* VELVET KUNNER. *Charlet.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Râle de Genet* ou *Roi de Cailles*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui

Craſſitie *Rallum Geniſtarum* ſive *Ortygometram* circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam

extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues undecim pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & quinque lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum octo lineis; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus ſexdecim lineas; poſticus autem quinque cum ſemi lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & trium linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ mediam caudæ longitudinem attingunt. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines verò ex fuſco-rufeſcente nonnihil ad olivaceum vergentes. Scapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices eodem imbuuntur colore, iiſdemque marginibus præditæ ſunt. Quæ margines in pennis dorſum veſtientibus

de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; ſa queue un pouce huit lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur ſeize lignes; & celui de derriere cinq lignes & demie. Tous ſes doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Il a douze pouces trois lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un brun-roux tirant un peu ſur l'olivâtre ſur leurs bords. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur & bordées de même. Cette bordure eſt extrêmement large ſur les plumes du dos & ſur les ſcapulaires. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col,

la poitrine & le haut du ventre ſont d'un joli cendré. (Dans quelques individus les plumes de la partie inférieure du col ſont bordées de blanchâtre.) Les côtés ſont couverts de plumes noirâtres, rayées tranſverſalement de blanc. Celles qui couvrent le bas-ventre, & le haut des jambes ſont cendrées & bordées par le bout de fauve clair. Les petites couvertures du deſſous de la queue ſont fauves : les grandes ſont blanches, & ſeulement terminées de fauve. Les couvertures du deſſous des aîles ſont rayées tranſverſalement de blanc & de cendré brun. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont noirâtres, & bordées d'un brun-roux tirant un peu ſur l'olivâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur ; les moyennes ſont pareillement brunes, mais elles ſont bordées extérieurement d'un brun-roux tirant ſur l'olivâtre. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noirâtre brillant, & bordées des deux côtés d'un brun-roux tirant ſur l'olivâtre. Le demi-bec ſupérieur eſt rougeâtre à ſon origine & noirâtre à ſon extrémité ; l'inférieur eſt

& ſcapularibus ſunt latiſſimæ. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ, guttur, collum inferius, pectus & venter ſupremus eleganti tinguntur cinereo. (In quibuſdam individuis pennæ collum inferius obtegentes marginibus gaudent candicantibus). Latera cooperiunt pennæ nigricantes, albo tranſverſim ſtriatæ. Quæ imum ventrem & crurum partem ſupremam veſtiunt, ſunt cinereæ, fulvo diluto in apice fimbriatæ. Inferiores caudæ tectrices minores fulvæ : majores candidæ, fulvo ſolummodo terminatæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes albo & cinereo-fuſco tranſverſim ſtriatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, nigricantes, fuſco-rufeſcente paululùm ad olivaceum vergente marginatæ : majores à corpore remotiores fuſcæ. Remiges majores ſunt quoque fuſco imbutæ : minores concolores, ſed fuſco-rufeſcente ad olivaceum inclinante exteriùs marginatæ. Caudam componunt duodecim rectrices ſplendidè nigricantes, in utroque latere fuſco-rufeſcente-olivaceo fimbriatæ.

Mandibula superior in exortu rubescens, in extremitate nigricans; inferior verò per totam longitudinem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusco-virideſcentes. Juxta aquas degit. *Ex muſeo Realmuriano.*

rougeâtre dans toute sa longueur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. On le trouve sur le bord des eaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. LE PETIT RASLE D'EAU OU LA MAROUETTE.

Voyez Pl. XIII. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines fusco-olivaceis, maculis candidis variegatis, superne vestitus, infernè cinereus, albido varius; syncipite, gutture & collo inferiore cinereis; collo superiore saturatè cinereo, maculis albis vario; collo ad latera & pectore cinereo-olivaceis, maculis albis variegatis; lateribus cinereo-olivaceis, albo transversim striatis; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines fusco-olivaceis, binis intermediis lineâ candidâ utrinque notatis .... RALLUS AQUATICUS MINOR SIVE MARUETTA.

Ochra. *Gesn. icon. Avi. pag.* 108, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinulæ aquaticæ decimum genus, cui Ochræ nomen fecimus, vulgò Wynkernell appellant. *Gesn. Avi. pag.* 513, *in qua eadem icon.*
Gallinula Ochra. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.
Gallinula Ochra, quam Germani Wynkernnell appellant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 468, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinula Ochra Gesneri, quam Germani Wynkernnell appellant, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N°.* 7.
Porzana minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 558, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Jonst. Avi. pag. 111.
Porzana Italorum. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°.* 5.
On l'appelle en quelques endroits de France COCOUAN.

Les Boulonnois l'appellent PORZANA. *Aldrov.*
Les Milanois, GIRARDINA. *Aldrov.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, WYNKERNNELL. *Gesn. Aldrov. Willugh. Raj.*
Les Anglois, GIRARDIN. *Charlet.*

Il est beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces dix lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces onze lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; sa queue un pouce neuf lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; son pied treize lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, seize lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere cinq lignes & demie. Il a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le synciput est cendré; cette couleur s'étend de chaque côté au-dessus des yeux. Le sommet de la tête est couvert de plumes noirâtres, bordées d'un brun tirant sur l'olive. La partie supérieure du col est d'un cendré foncé, varié de petites taches blanches. La partie supérieure

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & decem lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & undecim lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem lineas longum est; cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata quatuor cum semi lineas; pes tredecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue sexdecim lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem quinque cum semi lineas. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duodecim pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Synciput cinereo imbuitur colore; qui color supra oculos utrinque protenditur. Summum caput vestiunt pennæ nigricantes, fusco ad olivaceum vergente

marginatæ. Pars colli superior saturatè cinerea, minutis maculis albis varia. Partem dorsi supremam obtegunt pennæ in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ, minutis variegatæ maculis candidis, in utroque cujuslibet pennæ latere protensis. Scapulares & superiores caudæ tectrices concolores. Dorsum infimum & uropygium cooperiunt pennæ nigricantes, fusco-olivaceo in apice tantùm fimbriatæ, minutisque maculis candidis ad latera variegatæ. Guttur tingit color cinereus, ad oculos usque utrinque productus, & supra collum inferius protensus. Collum ad latera, pectusque ex cinereo paululùm ad olivaceum vergunt, minutisque maculis albis variegantur. Latera cooperiunt pennæ similiter cinereo-olivaceæ, albo transversim striatæ. Quæ ventrem & crurum partem supremam obtegunt, sunt cinereæ, albido terminatæ; qui color albidus in imo ventre & crurum parte suprema paululùm ad fulvum dilutum vergit. Inferiores caudæ tectrices sunt dilutè fulvæ. Pennæ alas subtus obtegentes albæ, cinereo

du dos est couverte de plumes noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre sur leurs bords, & variées de petites taches blanches, qui s'étendent sur chaque côté de chaque plume vers ses bords. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont de la même couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres, bordées par le bout seulement de brun-olivâtre, & variées sur leurs côtés de petites taches blanches. La gorge est cendrée; cette couleur s'étend de chaque côté jusqu'aux yeux, ainsi que sur la partie inférieure du col. Les côtés du col & la poitrine sont d'un cendré tirant un peu sur l'olivâtre, & varié de petites taches blanches. Les côtés sont couverts de plumes du même cendré, rayé transversalement de blanc. Celles qui couvrent le ventre & le haut des jambes sont cendrées, & terminées de blanchâtre; cette derniere couleur sur le bas-ventre & le haut des jambes tire un peu sur le fauve clair. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair. Celles du dessous des aîles sont blanches, & variées de cendré. Le bord de l'aîle, au-dessus & au-dessous du pli qui répond

à celui du poignet, eſt blanc. Les plus petites & les moyennes couvertures du deſſus des aîles ſont d'un brun-olivâtre, & variées de petites taches blanches, placées des deux côtés ſur leurs bords : les grandes les plus proches du corps ſont noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre ſur leurs bords, & variées de bandes blanches tranſverſales & en zigzags : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-olivâtre du côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur. La premiere des plumes de l'aîle eſt blanche du côté extérieur depuis ſon origine juſque vers ſon bout, qui eſt d'un brun-olivâtre; ſon côté intérieur eſt d'un cendré-brun : toutes les autres (excepté les cinq plus proches du corps) ſont d'un brun-olivâtre du côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur : enfin les cinq plus proches du corps ſont noirâtres dans leur milieu, d'un brun-olivâtre ſur leurs bords, & variées ſur leur côté extérieur ſeulement de lignes blanches tranſverſales & en zigzags. Ces cinq dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de

variæ. Alarum margines, ſupra & infra articulum carpo humano reſpondentem, candidæ. Superiores ipſarum tectrices minimæ & mediæ fuſco olivaceæ, minutiſque variegatæ maculis albis, in utroque latere ſupra margines poſitis : majores corpori viciniores in medio nigricantes, ad margines fuſco-olivaceæ, & tæniis tranſverſis undatiſque candidis variæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore fuſco-olivaceæ, in interiore cinereo-fuſcæ. Remix prima in latere exteriore ab ipſius exortu versùs apicem uſque candida, ad apicem fuſco-olivacea, in latere autem interiore cinereo-fuſca : reliquæ omnes remiges (quinque tamen corpori viciniioribus exceptis) exteriùs fuſco-olivaceæ, interiùs cinereo-fuſcæ : quinque tandem corpori viciniores in medio nigricantes, ad margines fuſco-olivaceæ, lineis tranſverſis & undatis albis in latere tantùm exteriore variegatæ. Quæ quinque nuper deſcriptæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam com-

ponunt duodecim rectrices in medio nigricantes, ad margines fusco-olivaceæ : binæ intermediæ exiguâ insuper lineâ candidâ, ab ipsarum exortu versùs tres quartas longitudinis partes usque secundùm margines protensâ, in utroque latere notantur. Rostrum, unguesque flavo-olivacei. Pars crurum plumis denudata & pedes fusco-olivaceo imbuti. Juxta stagnorum & fluviorum ripas versatur. *Ex museo D. de Bandeville.*

douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un brun-olivâtre sur leurs bords : les deux du milieu sont de plus marquées sur chacun de leurs côtés d'une petite ligne blanche, qui s'étend tout le long de leurs bords depuis leur origine jusque vers les trois quarts de leur longueur. Le bec & les ongles sont d'un jaune-olivâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-olivâtre. On le trouve sur le bords des étangs & des rivieres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 3. Le Rasle de Genet ou Roi de Cailles.

Voyez Pl. XIII. Fig. 2.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus, infernè albo-rufescens; genis, collo inferiore & pectore dilutè cinereis; lateribus rufis, albo transversim striatis; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus . . . . Rallus Genistarum sive Ortygometra.

Rallus alis rufo-ferrugineis. Crex. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 1.
Rallus terrestris. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 1.
Crex. *Gesn. Avi. pag.* 362.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 428.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. III.*
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 58. *sp.* 2.
Ortygometra alis rufo-ferrugineis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 162.
Ortygometra tota rufa, plerumque in Genistis degens. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXV. sp.* 1.
Ortygometra. *Gesn. Avi. pag.* 360. *hujus icon minimè accurata pag.* 361.

Geſn. icon. Avi. pag. 71, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. II. pag. 174. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 176.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 313.
Bell. Obſ. pag. 19.
Jonſt. Avi. pag. 48. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXVIII: altera icon non ſatis accurata Tab. XXVII: & tertia icon à Geſnero mutuata eâdem Tab. ſub titulo*, Coturnix.
Charlet. Exer. pag. 83. *N°. XIV.*
Charlet. Onomazt. pag. 75. *N°. XIV.*
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 16.
Moehr. Avi. Gen. 85.

Ortygometra Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 122. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XXIX.*
Raj. Syn. Avi. pag. 58. *N°. A.* 8.

Ortygometra Aldrovandi, Geſneri; Cenchramus Plinii; Coturnix magna; Rex Coturnicum; Rallus terreſtris. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 400.

Coturnico-mater Scaligero. *Charlet.*

Raſle rouge, ou de Genet. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 214, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Raſle rouge, ou Raſle de Genet. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 49 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.*

Roy, ou Mere des Cailles. *Alb. Tom. I. pag.* 27; *avec une figure mal coloriée Pl.* 32.

Les Grecs l'appellent Ορτυγομήτρα. *Bel. Geſn. Aldrov. Schwenck.* Κρεξ. *Aldrov.*

Les Italiens, Re de Quaglie. *Bel. Geſn. Aldrov. Willugh.*

Les Allemands, Schryck. *Willugh.* Schryk; Wachteln Koenig. *Geſn. Aldrov.* Wachtel Koenig. *Schwenck. Rzac.* Alte Knechte. *Schwenck.*

Les Siléſiens, Schnercker. *Schwenck.*

Les Polonois, Chrosciel; Derkacz; Kasper. *Rzac.*

Les Suédois, Korn knarren. *Linn.*

Les Uplandois, Aengsnaerpa. *Linn.*

Les Anglois, Daker-Hen. *Geſn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* Rail. *Willugh. Raj.* Land Rail. *Alb.*

Les Ecoſſois, Corn-Crek. *Sibbald.*

Il eſt un peu plus gros & plus grand qu'une *Caille*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces ſix lignes, & juſ-

Magnitudine & craſſitie *Coturnicem* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & ſex

sex lineas æquat, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda duos pollices ; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet, extimus quatuordecim lineas longus, intimus duodecim cum semi lineas ; posticus autem solummodo quinque lineas. Antici digiti rudimento membranæ in exortu inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum sexdecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Superiores caudæ tectrices & scapulares concolores ; attamen ex scapularibus exteriores nullo modo nigricant, & ad rufum magis inclinant. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, collum

qu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes ; son pied un pouce cinq lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce cinq lignes de long, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derriere cinq lignes seulement. Les doigts antérieurs sont réunis à leur origine par un très-petit commencement de membrane. Il a seize pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les couvertures du dessus de la queue & les plumes scapulaires sont de la même couleur ; cependant les plus extérieures de ces dernieres n'ont rien de noirâtre, & tirent plus sur le roux. La gorge est d'un blanc-roussâtre. Les côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la partie inférieure du col & la poitrine sont d'un cendré clair, les bords des plu-

mes de la poitrine tirant un peu ſur le rouſſâtre. Le ventre eſt d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de rouſſâtre. Les côtés ſont roux & rayés tranſverſalement de blanc. Le haut des jambes eſt rouſſâtre. Les couvertures du deſſous de la queue ſont rouſſes dans leur milieu, & marquées d'une large bordure blanche. Celles du deſſous des aîles ſont entiérement rouſſes. Le bord de l'aîle eſt dans toute ſa longueur d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de rouſſâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps ſont rouſſes : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un fauve clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes, qui ſont d'un gris clair en-deſſous ; mais en-deſſus la premiere eſt d'un fauve très-clair du côté extérieur, & d'un gris-brun du côté intérieur : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la ſeconde juſqu'à la ſixiéme incluſivement, ſont d'un gris-brun du côté intérieur & à leur bout, & fauves du côté extérieur : les treize qui ſuivent, ſçavoir depuis la ſeptiéme juſqu'à la dix-neuviéme incluſivement, ſont entiérement fauves :

inferius & pectus diluto tinguntur cinereo, pennarum pectus cooperientium marginibus nonnihil ad rufeſcentem colorem inclinantibus. Venter albet cum læviſſima rufeſcentis mixtura. Latera ſunt rufa, albo tranſverſim ſtriata. Crurum pars ſuprema rufeſcit. Inferiores caudæ tectrices in medio rufæ, latâ margine albâ præditæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes penitùs rufæ. Alarum margines per totam longitudinem albæ, læviſſimâ rufeſcentis mixturâ adumbratæ. Superiores ipſarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, rufæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore dilutè fulvæ, in interiore griſeo-fuſcæ. Alam componunt viginti tres remiges ſubtus dilutè griſeæ ; ſuperne verò prior eſt in latere exteriore dilutiſſimè fulva, in latere interiore griſeo-fuſca : quinque proximè ſequentes, à ſecunda ſcilicet ad ſextam uſque incluſivè, in latere interiore & apice griſeo-fuſcæ, in latere exteriore fulvæ : tredecim quæ ſequuntur, à ſeptima ſcilicet ad decimam nonam uſque incluſivè, penitus fulvæ : quatuor corpori

finitimæ pennis scapularibus concolores. Sex remiges corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus. Mandibula superior griseo-fusca, inferior grisea. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter grisei; ungues verò colore saturatiore imbuti sive griseo-fusci. Inter Ericas humi nidificat; & sexdecim aut octodecim ova ponit. Pullos recenter exclusos vestit penitùs nigra lanugo. *Ex museo Realmuriano.*

les quatre plus proches du corps sont de la même couleur que les plumes scapulaires. Les six plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Le demi-bec supérieur est d'un gris-brun, l'inférieur est gris. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de cette derniere couleur; & les ongles sont d'une couleur plus foncée, ou gris-bruns. Il fait son nid par terre dans les Bruyeres; & pond jusqu'à seize ou dix-huit œufs. Ses petits en naissant sont couverts d'un duvet entiérement noir. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 4. Le Rasle des Philippines.

Voyez Pl. XIV. Fig. 1.

Rallus pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestitus, infernè fusco & griseo transversim striatus; tæniâ supra oculos albidâ, per oculos castaneo-fuscâ; collo inferiore griseo-rufescente, griseo-fusco transversim striato; rectricibus in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus, lateralibus interiùs spadiceo maculatis . . . . . Rallus Philippensis.

On l'appelle aux Isles Philippines Tiklin.

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; ſa queue deux pouces ſept lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, neuf lignes; ſon pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce ſept lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere ſix lignes & demie. Tous ſes doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Il a quatorze pouces huit lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-rouſſâtre ſur leurs bords. Les couvertures du deſſus de la queue & les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur; cependant quelques-unes de ces dernieres ſont marquées de quelques petites taches blanches, placées ſur leurs bords. De cha-

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices & ſeptem lineas; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes octodecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & ſeptem lineas, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; poſticus autem ſex cum ſemi lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quatuordecim pollicum & octo linearum; alæ verò complicatæ ad duas tertias longitudinis caudæ partes uſque pròtenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griſeo-rufeſcentes. Tectrices caudæ ſuperiores, ſcapulareſque pennæ concolores; attamen ex ſcapularibus aliquot minutis quibuſ-

dam maculis candidis, ad ipsarum margines collocatis, sunt notatæ. In utroque capitis latere tænia extat albida, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Infra tæniam hanc altera adest tænia majorem latitudinem obtinens, castaneo-fusca, ab oris angulis orta, per oculos ducta, & pariter versùs occipitium usque protensa. Guttur sordidè albicat. Pars colli inferior est ex griseo rufescens, minutisque tæniis transversis griseo-fuscis, minimè conspicuis striata. Pectus, venter & latera fusco & griseo transversim quoque striantur; qui color griseus in ventre ferè candicat. Crurum suprema pars ex griseo-rufescit. Inferiores caudæ tectrices sunt fusco-nigricantes, albo-rufescente transversim striatæ. Pennæ alas subtus obtegentes cinereo-fuscæ, & quælibet tæniâ insignitur transversâ candicante, eodemque colore terminatur. Tectrices alarum superiores minimæ sunt griseo-rufescentes: mediæ, sicut & majores corpori finitimæ, in exortu fuscæ, griseo-rufescente terminatæ, & per totam longitudinem maculis,

que côté de la tête est une bande blanchâtre, qui part de l'origine du bec, & s'étend jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. Au-dessous de cette bande en est une plus large, d'un marron rembruni, qui part des coins de la bouche, passe par les yeux, & s'étend jusque vers l'occiput. La gorge est d'un blanc sale. La partie inférieure du col est d'un gris-roussâtre, rayé de petites bandes transversales d'un gris-brun, fort peu apparentes. La poitrine, le ventre & les côtés sont rayés transversalement de brun & de gris; cette derniere couleur est presque blanchâtre sur le ventre. Le haut des jambes est d'un gris-roussâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanc-roussâtre. Celles du dessous des aîles sont d'un cendré-brun, marquées chacune d'une bande transversale blanchâtre, & terminées de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-roussâtre: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes à leur origine, terminées de gris-roussâtre, & marquées dans toute leur longueur de taches, les unes de

rouge-bai & les autres blanches : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & rayées tranſverſalement de rouge-bai. Les plumes de l'aîle bâtarde ſont brunes, marquées ſur leur côté extérieur de taches rouſſâtres, ſur leur côté intérieur de bandes tranſverſales blanches, & terminées de gris-rouſſâtre. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les deux premieres ſont brunes, & marquées des deux côtés de taches tranſverſales qui ſont d'un rouge-bai vers la tige de la plume & blanches en approchant vers ſes bords : les ſeize ſuivantes, ſçavoir depuis la troiſiéme juſqu'à la dix-huitiéme incluſivement, ſont brunes, & rayées de larges bandes tranſverſales d'un rouge-bai; dans quelques-unes de ces plumes les bandes tranſverſales blanchiſſent un peu en approchant vers le bord intérieur de la plume : les ſix plus proches du corps ſont noirâtres dans leur milieu, d'un gris-rouſſâtre ſur leurs bords, & marquées de taches à peu près rondes, dont celles qui ſont placées vers l'origine de la plume, ſont d'un rouge-bai, & celles qui ſont placées vers ſon extrémité, ſont blanches. Ces ſix plumes ont d'autant moins de ces taches,

aliis ſpadiceis, aliis candidis notatæ : majores à corpore remotiores fuſcæ, ſpadiceo tranſverſim ſtriatæ. Ala notha pennis conflatur fuſcis, maculis rufeſcentibus in latere exteriore inſignitis, in latere interiore tæniis tranſverſis albis notatis, & griſeo-rufeſcente terminatis. Alam componunt viginti quatuor remiges : binæ priores ſunt fuſcæ, in utroque latere maculis notatæ tranſverſis verſùs remigis ſcapum ſpadiceis, & verſùs margines procedendo candidis : ſexdecim proximè ſequentes, à tertia ſcilicet ad decimam octavam uſque incluſivè, fuſcæ, latis tæniis tranſverſis ſpadiceis ſtriatæ; in quibuſdam ex iſtis remigibus tæniæ tranſverſæ, verſùs marginem remigis interiorem procedendo, paululùm caneſcunt : ſex tandem corpori finitimæ in medio nigricantes, ad margines griſeo-rufeſcentes, ſubrotundis inſignitæ maculis, quarum quæ verſùs remigis exortum collocantur, ſunt ſpadiceæ, quæ verò remigis extremitatem variegant, candidæ. Quæ ſex remiges eò minori iſtarum macularum numero inſigniuntur, quò fiunt cor-

pori viciniores. Sex istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Remix prima secundæ octo linearum longitudine cedit; secunda verò reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes : lateralium insuper latus interius minutis quibusdam maculis spadiceis insignitur. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque grisei. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

qu'elles sont plus proches du corps. Ces six dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle est plus courte de huit lignes que la seconde, qui est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords : le côté intérieur des latérales est de plus marqué de quelques petites taches de rouge-bai. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet.*

** 5. Le Rasle rayé des Philippines.

Voyez Pl. XIV. Fig. 2.

Rallus superne fusco-nigricans, pennis maculis transversis albidis utrinque notatis, infernè cinereo-olivaceus; colli superioris parte supremâ castaneâ; gutture albo-rufescente; imo ventre, lateribus & rectricibus fusco-nigricantibus, albido transversim striatis . . . . Rallus Philippensis striatus.

On l'appelle aux Isles Philippines Tiklin.

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab

Il est beaucoup moins gros que le précédent. Sa longueur

depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pouces quatre lignes, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſeize lignes & demie de long; ſa queue un pouce ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes; ſon pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, ſeize lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes & demie, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere ſix lignes. Il a treize pouces quatre lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt variée de marron & de noirâtre. Le haut de la partie ſupérieure du col eſt d'un marron ſans mêlange d'autre couleur. Le bas de la partie ſupérieure du col, le dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un brun-noirâtre, chaque plume étant marquée des deux côtés de taches tranſverſales blanchâtres. Le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun plus clair, & chaque plume eſt marquée de même des deux côtés de taches tranſverſales blanchâtres. La gorge eſt d'un blanc-rouſſâtre.

apice roſtri ad caudam extremam octo pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſexdecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum ſex lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue ſexdecim cum ſemi lineas, extimus quatuordecim cum ſemi lineas, intimus tredecim lineas; & poſticus ſex lineas. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt tredecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput ſuperius caſtaneo & nigricante variegatur. Colli ſuperioris pars ſuprema caſtaneo imbuitur abſque ulla alterius coloris mixtura. Colli ſuperioris pars infima, dorſum & ſcapulares pennæ ſunt fuſco-nigricantes, unaquâque pennâ maculis tranſverſis albidis utrinque notatâ. Uropygium & ſuperiores caudæ tectrices tingit color dilutiùs fuſcus, & quælibet penna ſimiliter maculis tranſverſis albidis utrinque

utrinque insignitur. Guttur ex albo rufescit. Caput ad latera, pars colli inferior, pectus & venter supremus ex cinereo ad olivaceum vergunt. Venter imus, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco nigricant, & albido transversim striantur. Crurum suprema pars grisea, tæniis transversis albidis pariter striata. Superiores alarum tectrices minores sunt fusco-fulvæ, tæniis transversis candicantibus utrinque notatæ: majores à corpore remotiores fusco-fulvæ quidem, sed tæniis destitutæ: majores corpori finitimæ fusco-nigricantes, albido transversim striatæ. Remiges alarum primores sunt quoque fusco-fulvæ: proximè sequentes, istæ scilicet quæ medium locum occupant, fusco imbutæ nonnihil saturatiore: corpori finitimæ fusco-nigricantes: omnes autem strictioribus insigniuntur tæniis transversis, in latere exteriore albo-rufescentibus, in interiore candidis. Ex remigibus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè

Les côtés de la tête, la partie inférieure du col, la poitrine & le haut du ventre sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre. Le bas-ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont d'un brun-noirâtre, rayé transversalement de blanchâtre. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement de bandes transversales blanchâtres. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un brun-fauve, chacune étant marquée des deux côtés de bandes transversales blanchâtres: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-fauve & sans rayures; les grandes les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & rayées transversalement de blanchâtre. Les premieres plumes de l'aîle sont d'un brun-fauve: les suivantes, sçavoir celles qui occupent le milieu, sont d'un brun un peu plus foncé: & les plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre: toutes sont marquées d'étroites bandes transversales, qui sont d'un blanc-roussâtre du côté extérieur, & blanches du côté intérieur. De ces plumes les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle,

Les troiſiéme & quatriéme plumes de l'aîle ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un brun-noirâtre, & rayées d'étroites bandes tranſverſales blanchâtres. Le bec eſt de couleur de corne claire. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un gris-brun; & les ongles gris. On le trouve aux *Iſles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot* qui le conſerve dans ſon *cabinet*.

pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem antecellunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſconigricantibus, ſtrictis tæniis tranſverſis albidis ſtriatis. Roſtrum dilutè corneo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque griſeo-fuſci; ungues verò griſei. Habitat in *Philippenſibus Inſulis*, unde in *muſeum D. Turgot* miſſus eſt.

** 6. LE RASLE A COLLIER DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XV. Fig. 1.

Rallus ſuperne fuſcus, ad olivaceum obſcurum inclinans; infernè fuliginoſus, albo tranſverſim ſtriatus; tæniâ infra oculos candidâ; faſciâ ſupra pectus tranſversâ caſtaneâ; rectricibus fuſcis, oris exterioribus ad olivaceum obſcurum vergentibus . . . . RALLUS PHILIPPENSIS TORQUATUS.

On l'appelle aux Iſles Philippines TIKLIN.

Il eſt un peu plus gros que le *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied, & juſqu'à celui des ongles de quatorze pouces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; ſa queue un pouce neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt

Craſſitie *Rallum Geniſtarum* paululùm excedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem unum pedem explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos unum pollicem & octo lineas longum eſt; cauda unum pollicem & no-

vem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes unum pollicem cum decem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus octodecim lineas, intimus unum pollicem & quinque lineas; & posticus octo lineas. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis novem pollicum & trium linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex fusco ad olivaceum obscurum paululùm inclinant. Caput ad latera sive genæ, gutturque fuliginoso imbuuntur colore. In utroque capitis latere tænia extat candida, ab oris angulis orta, infra oculos ducta, ad collum usque protensa. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes fuliginei sunt coloris, strictisque tæniis transversis albis striantur. Crurum pars suprema grisea, strictis tæniis transversis candicantibus pa-

dégarnie de plumes, dix lignes; son pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce six lignes, l'intérieur un pouce cinq lignes; & celui de derriere huit lignes. Il a un pied neuf pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun tirant un peu sur un olivâtre sombre. Les côtés de la tête ou les joues, & la gorge sont de couleur de suye. De chaque côté de la tête est une bande blanche, qui part des coins de la bouche, passe par-dessous les yeux, & s'étend jusqu'au col. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont de couleur de suye, & rayés d'étroites bandes transversales blanches. Le haut des jambes est gris, & rayé pareillement d'étroites bandes transversales blanchâtres. Au-dessus de la poitrine est une bande transversale d'un beau marron, large de huit ou neuf lignes;

qui forment une eſpece de collier. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que le dos : les grandes, les plus éloignées du corps ſont tout-à-fait brunes, mais bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire. L'aîle eſt compoſée de vingt-deux plumes brunes, & bordées extérieurement d'une couleur un peu plus claire : les trois premieres de ces plumes ſont marquées ſur leur côté intérieur de bandes tranſverſales blanches : les ſix ſuivantes, ſçavoir depuis la quatriéme juſqu'à la neuviéme incluſivement, ſont de même marquées ſur leur côté intérieur de bandes tranſverſales d'un marron-rouſſâtre. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Les troiſiéme & quatriéme plumes de l'aîle ſont les plus longues de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, bordées extérieurement d'un brun tirant un peu ſur un olivâtre ſombre. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un gris-brun; & les ongles

riter ſtriata. Supra pectus faſcia extat tranſverſa eleganter caſtanea, octo aut novem lineas lata, torquem quodammodo efficiens. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, dorſo concolores : majores à corpore remotiores penitùs fuſcæ, colore tamen nonnihil dilutiore exteriùs fimbriatæ. Alam componunt viginti duo remiges fuſcæ, fuſco paululùm dilutiore in latere exteriore marginatæ : ex iſtis remigibus tres primores tæniis tranſverſis albis in latere interiore notantur : ſex proximè ſequentes, à quarta ſcilicet ad nonam uſque incluſivè, tæniis tranſverſis caſtaneo-rufeſcentibus interiùs ſimiliter inſigniuntur. Ex remigibus corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Ex remigibus tertia & quarta reliquarum omnium longitudinem ſuperant. Caudam componunt duodecim rectrices fuſcæ, oris exterioribus ex fuſco ad olivaceum obſcurum nonnihil vergentibus præditæ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedeſque

ſunt griſeo-fuſci; ungues verò griſei. Habitat in *Philippenſibus Inſulis*, unde in *muſeum D. Turgot* miſſus eſt.

gris. On le trouve aux *Iſles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. Turgot*, qui le conſerve dans ſon *cabinet*.

** 7. LE RASLE BRUN DES PHILIPPINES.

Voyez Pl. XV. Fig. 2.

Rallus ſuperne fuſcus, infernè fuſco-vinaceus, gutture dilutiore; imo ventre griſeo-fuſco; tectricibus caudæ inferioribus nigris, albo tranſverſim ſtriatis; rectricibus fuſcis... RALLUS PHILIPPENSIS FUSCUS.

On l'appelle aux Iſles Philippines TIKLIN.

Rallo aquatico minori ſive *Maruettæ* paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum novem lineis; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes duodecim cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum ſemi lineas, intimus undecim lineas; poſticus autem ſolummodo quinque lineas. Omnes digiti ſunt ad exortum

Il eſt un peu moins gros que le *petit Râle d'eau* ou *la Maroüette*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a neuf lignes de long; ſa queue un pouce neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere cinq lignes ſeulement. Tous ſes doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Il a dix pouces ſix lig-

nes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie poſtérieure de la tête, le deſſus du col, le dos & le croupion ſont bruns. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. La partie antérieure de la tête, les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre & les côtés ſont d'un joli brun-vineux ; cette couleur eſt beaucoup plus claire ſous la gorge qu'ailleurs. Le bas - ventre & le haut des jambes ſont d'un gris-brun. Les couvertures du deſſous de la queue ſont noires, & rayées tranſverſalement de blanc. Celles du deſſous des aîles ſont pareillement noires, & marquées ſeulement de quelques petits points blancs. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont brunes : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un gris-brun du côté extérieur, & brunes du côté intérieur. Les grandes plumes de l'aîle ſont de la même couleur que ces dernieres couvertures : les moyennes ſont entiérement brunes. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un fort beau

uſque à ſe invicem diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt decem pollicum & ſex linearum ; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Capitis poſterior pars, ſicut & colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt fuſcæ. Capitis partem anteriorem, genas, guttur, collum inferius, pectus, ventrem ſupremum & latera tingit color fuſco-vinaceus elegans, ſub gutture multò dilutior quàm in reliquis prædictis partibus. Ventrem infimum & crurum partem ſupremam veſtiunt pennæ griſeo-fuſcæ. Inferiores caudæ tectrices ſunt nigræ, albo tranſverſim ſtriatæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſimiliter nigræ, quibuſdam tantùm punctulis candidis notatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, fuſcæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore griſeo-fuſcæ, in interiore fuſcæ. Remiges majores noviſſimè dictis tectricibus concolores : minores penitùs fuſcæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus

elegantissimè fuscis. Rostrum quoque fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque flavi. Habitat in *Philippensibus Insulis*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

brun. Le bec est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont jaunes. On le trouve aux *Isles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

8. Le Rasle de Virginie.

Rallus superne fuscus, infernè fusco-rufescens; rectricibus fuscis . . . . Rallus Virginianus.

Rallus terrestris Americanus. *Klein. Avi. pag.* 103. *N°.* 4.
Râle de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag.* 70; *avec une figure exacte Pl.* 70.
Les Anglois l'appellent Soree. *Catesb.*

Rallo aquatico nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam septem pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda octodecim lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes sexdecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; & posticus septem lineas. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attin-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue dix-huit lignes; la partie de ses jambes, qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied seize lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere sept lignes. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jus-

qu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, & le croupion sont bruns. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun-roussâtre. Les plumes de l'aîle sont tout-à-fait brunes. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. Il devient très-gras en Automne, & est alors très-bon à manger. On le trouve en *Virginie*.

gunt. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices concolores. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes ex fusco rufescunt. Alarum remiges sunt penitùs fuscæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda constat. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusci. Per Autumnum maximè pingueſcit, & tunc in cibis delicatissimus. Habitat in *Virginia*.

SECTION V.

Ceux qui ont le bec menu.

CETTE Section contient trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la longueur du bec & par son extrémité ou lisse ou raboteuse. Les uns ont le bec de moyenne longueur, droit, & dont le bout est obtus &

SECTIO V.

Eæ quæ rostrum habent gracile.

IN illa sectione tria continentur Avium genera, longitudine rostri & ipsius apice sive levi sive rugoso à se invicem discrepantia. Aliæ enim rostro donantur mediæ longitudinis, recto; ipsius apice obtuso & levi,

ut

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Perdrix-de-mer.

2. Râle d'eau.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petit Râle d'eau ou Maroüette.

2. Râle de Genet ou Roi de Cailles.



Dessinée et Gravée par Martinet.

1. Râle des Philippines.

2. Râle rayé des Philippines.

Fig. 1.

Fig. 2.

Echelle de 6. Pouces pour la 1.re Figure.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Râle à collier des Philippines.

2. Râle brun des Philippines.

ut *Tringa* : aliæ rostro longissimo præditæ sunt. Inter quas aliæ rostrum habent subrectum, sursum modicè tendens ; ipsius apice obtuso & levi, ut *Limosa* : aliæ rostrum planè rectum ; ipsius apice obtuso & rugoso, ut *Scolopax*.

lisse, comme le *Beccasseau* ; les autres ont le bec très-long. De ces derniers les uns ont le bec plutôt recourbé en enhaut que droit, & dont le bout est obtus & lisse, comme la *Barge* : les autres ont le bec tout-à-fait droit, & dont le bout est obtus & raboteux, comme la *Beccasse*.

LXXV.

Genus Tringæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum gracile ; mediæ longitudinis, rectum ; ipsius apice obtuso & levi.

LXXV.

Le genre du Beccasseau.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec menu, de moyenne longueur, droit, & dont le bout est obtus & lisse.

** 1. Le Beccasseau, appellé vulgairement Cul-blanc.

Voyez Pl. XVI. Fig. 1.

Tringa superne splendidè fusca, maculis candicantibus varia, infernè alba ; tæniâ supra oculos candidâ ; collo inferiore cinereo-fusco maculato ; lateribus cinereo-fuscis, albo transversim striatis ; rectricibus binis intermediis in exortu albis, apice fusco-nigricantibus, albo transversim striatis, lateralibus candidis, ad apicem fusco-nigricante transversim striatis . . . . Tringa.

Tringa roſtri apice punctato ; pedibus livido-vireſcentibus, dorſo fuſco-viridi nitido. *Faun. Suec. Linn. N°.* 146.
Tringa roſtri apice punctato, pedibus vireſcentibus, dorſo fuſco-viridi nitido. Ochropus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 8.
Tringa nigra albo punctata, pectore maculato, abdomine ſubalbido, pedibus vireſcentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 152.
Tringa roſtro lævi, pedibus vireſcentibus, corpore albo punctato, pectore ſubalbido. Glareola. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 11.
Tryngas. *Geſn. Avi. pag.* 501.
Trynga. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minimè accurata pag.* 481.
Trynga alia, ſeu ſecunda. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minimè accurata pag.* 482.
Tringa Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 222. *hujus icon minùs accurata Tab. LV ; & inſuper altera icon minimè accurata Tab. LVI, ſub titulo*, Cinclus Bellonii.
Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 7.
Tringa prima. *Jonſt. Avi. pag.* 111. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *ſub titulo*, Trynga.
Tringa tertia. *Jonſt. Avi. pag.* 112.
Tringa alia, ſeu tertia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480. *hujus icon minùs accurata pag.* 483.
Trynga altera. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Tringa tertia Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 8.
Tringa tertia Aldrovandi, Giaroncello, & Pinirolo Italis dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 223.
Gallinula pedibus viridibus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 8.
Cinclus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 2.
Cinclus Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 480.
Cinclus tertius. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 492.
Cinclus tertius Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 227.
Raj. Syn. Avi. pag. 110. *N°.* 14.
Cincli congener altera. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53, *ſub titulo*, Cinclus.
Rhodopus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 106, *in qua hujus icon peſſima.*
Gallinulæ aquaticæ quintum genus, quod Rhodopodem appellamus; vulgus Germanicum Steingaellyl. *Geſn. Avi. pag.* 508, *in qua eadem icon.*
Gallinula Rhodopus. *Jonſt. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.
Gallinula Rhodopos, ſive phœnicopos. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 456. *hujus icon peſſima pag.* 457.

Gallinula Rhodopus, sive phœnicopus Gesneri. *Willugh. Ornith. pag.* 223.
Gallinæ aquaticæ species secunda de novo adjecta. *Gesn. Avi. pag.* 516, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Glareola octava. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 283.
Glareola octava Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 7.
Glareola quarta. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 282.
Glareola quarta Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 4.
Ochropus medius. *Gesn. icon. Avi. pag.* 107, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 461. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 463.
Gallinulæ aquaticæ octavum genus, vulgò dictum Mattknillis: nobis Ochropus medius. *Gesn. Avi. pag.* 511, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinula aquatica octava Gesneri: Ochropus medius ejusdem. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 380.
Gallinula Ochropus. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 3.
Gallinula Ochropus medius. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Gallinula Ochra. *Charlet. Onomazt. pag.* 107. *N°.* 3.
Porphyrio nigricans, pedibus & rostro roseis. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 5.
Steingallell Leonardi Baltneri. *Willugh.*
Autre Beccassine. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 216.
Les Grecs l'appellent Τρύγλας. *Gens.* Κιγκλος. *Bel.*
Les Boulonnois, Giarolo. *Aldrov. Jonst.* Giaroncello; Pinirolo. *Aldrov. Jonst. Willugh. Raj.* Sgainolo. *Aldrov.*
Les Allemands, Steingaellyl. *Gesn. Aldrov. Willugh.* Bundt Wasser Heunlin; Geschreckt Mott Heunle. *Schwenck.* Greun-Feussel. *Schwenck. Rzac.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, Mattknillis. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Suédois, Horsgjoek. *Linn.*

Pluviali aureæ paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum polli-

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes

de long; ſa queue deux pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes & demie; ſon pied quinze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes & demie, l'intérieur dix lignes & demie; & celui de derriere quatre lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a quinze pouces neuf lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un cendré-brun. Les joues & la partie ſupérieure du col ſont couvertes de plumes d'un cendré-brun dans leur milieu, & blanchâtres ſur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont d'un brun brillant, & variées ſur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres. Le croupion eſt couvert de plumes brunes, variées de même ſur chacun de leurs bords de très-petites taches blanchâtres, & de plus bordées de la

cem & quinque lineas longum eſt; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo cum ſemi lineas; pes quindecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim cum ſemi lineas, intimus decem cum ſemi lineas; poſticus autem quatuor ſolummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum & novem linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput ſuperius ex cinereo fuſceſcit. Genas & partem colli ſuperiorem veſtiunt pennæ in medio cinereo-fuſcæ, ad margines candicantes. Quæ dorſum cooperiunt, ſicut & ſcapulares, ſunt ſplendidè fuſcæ, in utraque margine minutis maculis candicantibus variæ. Uropygium pennis veſtitur fuſcis, in utraque pariter margine minutiſſimis maculis albidis variegatis,

eodemque colore insuper in apice fimbriatis. In utroque capitis latere latiuscula extat tænia candida, ab exortu mandibulæ superioris orta, & supra oculos protensa. Infra quam tæniam altera adest fascia cinereo-fusca, ab exortu quoque mandibulæ superioris orta, & ad oculum usque producta. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtegunt pennæ candidæ, maculis cinereo-fuscis in medio insignitæ. Pectus, venter & crurum suprema pars albent. Tectrices caudæ superiores & inferiores concolores. Pennæ alas subtus & latera cooperientes sunt cinereo-fuscæ, albo transversim striatæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fusco imbutæ nonnihil quàm in dorso saturatiore, & in utraque margine minutis maculis candicantibus variegatæ : majores à corpore remotiores fusco-nigricantes & immaculatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novemdecim primores ex fusco nigricant; quinque corpori viciniores eodem imbuuntur fusco ac dorsum ipsum tingitur, & in exteriore margine maculis

même couleur par le bout. De chaque côté de la tête est une assez large bande blanche, qui part de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. Au-dessous de cette bande en est une autre d'un cendré-brun, qui part de même de l'origine du demi-bec supérieur, & s'étend jusqu'à l'œil. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes blanches, marquées dans leur milieu de taches d'un cendré-brun. La poitrine, le ventre & le haut des jambes sont blancs. Les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Celles du dessous des aîles & les côtés sont d'un cendré-brun, rayé transversalement de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un brun un peu plus foncé que celui du dos, & variées sur chacun de leurs bords de petites taches blanchâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre & sans taches. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix-neuf premieres sont d'un brun-noirâtre : les cinq plus proches du corps sont du même brun que le dos, & variées sur

leur bord extérieur de taches blanchâtres. Ces dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle; dont la premiere eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont blanches à leur origine; le reſte eſt d'un brun-noirâtre, & rayé des deux côtés de bandes tranſverſales blanches : toutes les latérales ſont blanches, & rayées vers leur extrémité ſeulement de larges bandes tranſverſales d'un brun-noirâtre : ces plumes ont d'autant moins de ces bandes, qu'elles ſont plus extérieures; de façon que la plus extérieure de chaque côté n'en a qu'une ſeule : celle qui la ſuit immédiatement en a deux du côté extérieur & une du côté intérieur : la troiſiéme en a deux de chaque côté : la quatriéme en a trois du côté extérieur & deux du côté intérieur : la cinquiéme enfin en a quatre du côté extérieur & deux du côté intérieur. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec eſt d'un verd obſcur, excepté ſon bout, qui eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont de couleur de plomb verdâtre; & candicantibus variegantur. Quæ noviſſimè dictæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt; remix autem prior omnium longiſſima. Caudam componunt duodecim rectrices : binæ intermediæ in exortu albæ, in reliqua longitudine fuſco-nigricantes, in utroque latere albo tranſverſim ſtriatæ : laterales omnes candidæ, latis quoque tæniis tranſverſis fuſco-nigricantibus versùs ipſarum apicem tantùm ſtriatæ : quæ rectrices eò minori inſigniuntur tæniarum numero, quò exteriores fiunt; ita ut utrinque extima unicâ tantùm ſit notata tæniâ : proximè ſequens binis in latere exteriore, unicâ in latere interiore : tertia in utroque latere duabus : quarta exteriùs tribus, binis interiùs : quinta tandem in latere exteriore quatuor, in interiore binis tæniis ſit inſignita. Oculorum irides avellaneæ. Roſtrum obſcurè viride, attamen apice nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque plumbeo-virideſcentes; ungues verò nigri. Solitaria eſt; attamen pariendi tempore binæ volant, mas & fœmina. Piſci-

narum, lacum, fluviorumque ripas frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

Exquisito sapore gaudet hæc Avis; ideoque illam venantur aucupes: quam ob causam ad ripas aquarum, quas frequentat, virgulas apponunt glutine imbutas, quibus ope capitur.

les ongles noirs. Il est solitaire, excepté dans le temps de l'amour, où il s'associe avec sa femelle. On le trouve sur les bords des étangs, des lacs & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Cet Oiseau est très-bon à manger; c'est pourquoi on en fait la chasse: elle consiste à tendre aux bords des eaux, qu'il fréquente, des gluaux dans lesquels il vient se prendre.

** 2. La Guignette.

Voyez Pl. XVI. Fig. 2.

Tringa superne splendidè griseo-fusca, lineis longitudinalibus & transversis undatisque fusco-nigricantibus varia, infernè albâ; gutture, collo inferiore & pectore supremo cinereo-albis, pennis lineâ longitudinali fuscâ in medio notatis; rectricibus decem intermediis griseo-fuscis, virideſcente adumbratis, fusco-nigricante transversim & undatim striatis, utrinque extimâ candidâ, interiùs griseo-fusco transversim striatâ, binis extimæ proximis apice albis . . . . Guinetta.

Tringa rostro lævi, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 147.

Tringa rostro lævi, pedibus lividis, corpore cinereo lituris nigris, subtus albo. Hypoleucos. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 9.

Tringa minor. *Willugh. Ornith. pag.* 223. *hujus icon non satis accurata Tab. LV.*

Raj. Syn. Avi. pag. 108. *N°. A.* 6.

Charlet. Exer. pag. 112. *N°. IX.*

Tringa quinta. *Jonst. Avi. pag.* 112.

Motacillæ genus. *Gesn. Avi. pag.* 119, *in qua hujus icon pessima.*

Gesn. icon. Avi. pag. 123, *in qua eadem icon.*

Motacillæ, ſeu Cincli genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 485. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 486.

Hypoleucos. *Geſn. icon. Avi. pag.* 106, *in qua hujus icon peſſima. Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *ſp.* 3.

Gallinulæ aquaticæ ſextum genus, quod Hypoleucon cognomino; vulgus Germanicum appellat Fyſterlin. *Geſn. Avi. pag.* 509, *in qua hujus icon peſſima.*

Gallinula Hypoleucos. *Jonſt. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.

Gallinula Hypoleucos, quam vulgus Germanicum Fyſterlin appellat. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 469, *in qua hujus icon minùs accurata.*

An Pluvialis fuſco-cinerea, rarior ſpecies? *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 62. *hujus icon minùs accurata Tab.* 29.

Pfiſterlein Leonardi Baltneri. *Willugh.*

Les Génevois l'appellent Beccassine. *Willugh.*

Les Allemands, Fysterlin. *Geſn. Aldrov. Jonſt.*

Les Miſniens, Pilwenckgen; Pilwegichen. *Geſn. Aldrov. Jonſt.* Pilente. *Geſn. Aldrov.*

Les Suédois, Snaeppa. *Linn.*

Les Habitans de la Province d'Yorck, Sand-piper. *Raj. Charlet.*

Elle eſt un peu plus groſſe que l'*Alouette-de-mer*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces ſept lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue deux pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre lignes & demie; ſon pied dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere trois lignes ſeulement. Celui du

Craſſitie *Cinclum* nonnihil ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor cum ſemi lineas; pes decem cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; poſticus autem tres ſolummodo

solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duodecim pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput & partem colli superiorem vestiunt pennæ griseo-fuscæ, lineâ fusco saturatiore imbutâ, secundùm scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ dorsum & uropygium obtegunt, sicut & scapulares, superioresque caudæ tectrices, sunt splendidè griseo-fuscæ, lineâ fusco-nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, pluribusque aliis lineis transversis & undatis concoloribus insignitæ. Guttur, partem colli inferiorem, supremumque pectus cooperiunt pennæ cinereo-albæ, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, & versùs ipsarum extremitatem paululùm ampliatâ, notatæ. Pectus infimum, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant.

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a douze pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont couvertes de plumes d'un gris-brun, marquées chacune d'une ligne d'un brun plus foncé, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent le dos & le croupion, ainsi que les scapulaires & les couvertures du dessus de la queue, sont d'un gris-brun fort brillant, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & de plusieurs autres lignes transversales & en zigzags de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col & le haut de la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige, & qui s'élargit un peu vers le bout de la plume. Le bas de la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, le haut des jambes & les côtés sont blancs. Les couvertures

du deſſous des aîles les plus proches du corps ſont de la même couleur : les plus éloignées du corps ſont d'un cendré-brun & terminées de blanc. Les petites & les grandes couvertures du deſſus des aîles les plus proches du corps ſont de la même couleur que les plumes du dos; cependant quelques-unes des grandes ſont terminées de blanc : les petites les plus éloignées du corps, ſçavoir celles qui couvrent le pli de l'aîle qui répond à celui du poignet, ſont d'un gris-brun, & bordées de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & bordées obliquement de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle ſont brunes, excepté une partie de leur côté intérieur, qui eſt blanche, & cela depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, le blanc occupant d'autant plus de largeur, que la plume eſt plus proche du corps : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) ſont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une tache brune, qui eſt d'autant plus grande que la plume eſt plus éloignée du corps ; elles ont auſſi leur côté extérieur brun, mais à leur origine ſeulement : les quatre plus proches du corps ſont blanches, & marquées vers leur extrémité d'une tache brune, qui eſt d'autant plus grande que la plume eſt plus éloignée du corps ; elles ont auſſi leur côté extérieur brun, mais à leur origine ſeulement : les qua-

Tectrices alarum inferiores corpori viciniores concolores : à corpore remotiores ſunt cinereo-fuſcæ, apicibus albis præditæ. Superiores alarum tectrices, minores ſcilicet & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac pennæ dorſum veſtientes ; ex majoribus tamen quædam albo terminantur : minores à corpore remotiores, iſtæ ſcilicet quæ alæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, griſeo-fuſcæ, candicante fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuſcæ, albo in apice obliquè marginatæ. Remiges alarum majores ſunt quoque fuſcæ, attamen in latere interiore partim candidæ, ab ipſarum exortu ſcilicet ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque, albedine eò majorem latitudinem obtinente, quò remix fit corpori vicinior : minores (exceptis tamen quatuor corpori finitimis) candidæ, versùs ipſarum extremitatem fuſcâ inſignitæ maculâ, eò majus ſpatium occupante, quò remix fit à corpore remotior ; ſunt quoque in latere exteriore fuſcæ, ſed in ipſarum exortu tantùm : quatuor cor-

pori viciniores eodem imbuuntur griseo-fusco ac dorsum ipsum tingitur, tæniisque transversis & undatis fusco-nigricantibus striantur. Quæ quatuor nuper descriptæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : quatuor intermediæ sunt splendidè griseo-fuscæ, paululùm virideſcente adumbratæ, fusco-nigricante transversim & undatim striatæ : binæ utrinque proximè sequentes eodem imbutæ colore, sed apice albæ : quinta novissimis istis concolor, maculis insuper candidis, ad ipsius margines positis, insignita : utrinque tandem extima candida, in latere interiore latiusculis tæniis transversis splendidè griseo-fuscis notata ; quædam autem tæniæ griseo-fuscæ supra latus exterius nonnihil protenduntur. Rectrices quatuor intermediæ lateralium longitudinem excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum fuscum. Pars crurum

tre plus proches du corps sont du même gris-brun que celui du dos, & rayées de bandes transversales & en zigzags d'un brun-noirâtre. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les quatre du milieu sont d'un gris-brun brillant, un peu ombré de verdâtre, & rayé transversalement & en zigzags de brun-noirâtre : les deux qui les suivent immédiatement de chaque côté, sont de la même couleur, mais terminées de blanc : la cinquiéme est colorée comme ces dernieres, & est de plus marquée de taches blanches, placées sur chacun de ses bords : enfin la plus extérieure de chaque côté est blanche, & marquée sur son côté intérieur de larges bandes transversales d'un gris-brun brillant, dont quelques-unes s'étendent un peu sur le côté extérieur. Les quatre plumes du milieu de la queue sont plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est brun. La partie des

jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un brun-verdâtre. On la trouve ſur les bords des étangs, des lacs & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

plumis denudata, pedes, ungueſque fuſco-virideſcentes. Juxta ſtagnorum, lacuum & fluviorum ripas verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 3. Le Chevalier.

Voyez Pl. XVII. Fig. 1.

Tringa pennis in medio fuſcis, ad margines griſeis ſuperne veſtita, infernè alba; collo inferiore griſeo, marginibus pennarum albidis; rectricibus griſeo-fuſcis, albido in apice marginatis, quatuor intermediis & binis utrinque extimis nigricante tranſverſim ſtriatis; pedibus dilutè rubris .... Totanus.

Tringa roſtro nigro, baſi rubrâ : pedibus coccineis. *Faun. Suec. Linn.* N°. 149.

Erythropus major. *Geſn. icon. Avi. pag.* 101, *in qua hujus icon minimè accurata.*

Gallinulæ aquaticæ primum genus, quod vulgò germanicè vocant Rotbein, id eſt, Erythropodem. *Geſn. Avi. pag.* 504, *in qua eadem icon.*

Gallinula Erythropos major Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 453, *in qua hujus icon peſſima.*

Gallinula Erythropus. *Charlet. Exer. pag.* 112. N°. 2.
Charlet. Onomazt. pag. 107. N°. 2.

Gallinula Erythropus major. *Jonſt. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31, *ſub titulo*, Erythropus.

Gallinula Erythropus major Geſneri. *Raj. Syn. Avi. pag.* 107. N°. *A.* 1.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 19.
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 50. *hujus icon peſſima Tab.* 23.

Gallinula Erythropus major Geſneri Aldrovando. *Willugh. Ornith. pag.* 221.

Scolopax roſtro recto baſi rubro, pedibus coccineis, remigibus ſecundariis albis. Totanus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 4.

Calidris Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 431. *hujus icon minimè accurata pag.* 433.
Jonſt. Avi. pag. 108.

Chalidris Bellonii, Fedoa. *Charlet. Exer. pag.* 112. N°. *V.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. N°. *V.*

Totanus. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. IV.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. IV.*
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 60. *ſp.* 5.
Totanus Geſneri. *Raj. Syn. Avi. pag.* 107. *N°. A.* 1.
Glareola prima. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Glareola prima Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 1.
Glareola prima Schwenckfeldii ; Erythropus primus Geſneri ; Red-shanca Turneri. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 383.
Chevalier rouge. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 207 ; *avec une figure paſſable pag.* 208.
Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 46 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.*
Becaſſine d'étang. *Alb. Tom. III. pag.* 37 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 87.
Les Grecs l'appellent Καλίδρις. *Bel.*
Les Allemands, Rot-bein. *Geſn. Aldrov. Rzac.* Rott-bein ; Wasser-Heunlin mit Roten beinen. *Schwenck.* Rot-feussel. *Schwenck. Rzac.*
Les Anglois, Red-shank. *Aldrov. Willugh. Raj. Sibbald.* Pool-Snipe. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Cum *Pluviali aurea* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & undecim lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & quinque lineas longum eſt ; cauda duos pollices cum novem lineis ; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas ; pes unum pollicem & novem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque cum ſemi lineas, extimus quatuordecim cum ſemi lineas, intimus trede-

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Pluvier doré*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de douze pouces onze lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long ; ſa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatorze lignes ; ſon pied un pouce neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes & demie, l'extérieur quatorze lignes & demie, l'intérieur treize lignes ; & celui de derriere quatre lignes & de-

mie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied ſept pouces trois lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & griſes ſur leurs bords. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur; cependant quelques-unes des plus grandes de ces dernieres ſont blanches, & s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue; & les bords de quelques-unes des plumes du dos tirent un peu ſur le fauve. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col eſt couverte de plumes griſes, & bordées de blanchâtre : celles qui ſont les plus proches de la gorge, ſont de plus marquées dans leur milieu d'une petite tache brune. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un beau blanc. Les cô-

cim lineas; poſticus autem quatuor tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis ſeptem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli ſuperior, dorſum & uropygium pennis veſtiuntur in medio fuſcis, ad margines griſeis. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores; attamen ex tectricibus caudæ ſuperioribus majores quædam candidæ, & caudæ extremitatem ferè pertingentes; & ex pennis dorſum veſtientibus quædam quoque ad margines nonnihil ad fulvum inclinant. Guttur albicat. Partem colli inferiorem veſtiunt pennæ griſeæ, marginibus albidis præditæ; quæ gutturi magis appropinquant, minutâ maculâ fuſcâ inſuper in medio notatæ. Pectus, venter, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes ele-

ganter albent. Latera cooperiunt pennæ dilutè griseæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt griseo-fuscæ, colore dilutiore marginatæ : majores corpori viciniores concolores, sed candicante in apice fimbriatæ; ex istis quædam insuper maculis quibusdam nigricantibus variegantur : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice marginatæ. Remiges majores subtus cinereæ, superne nigricantes, pauco candicante in extremitate fimbriatæ, & scapo albido præditæ : minores in latere exteriore fusco-nigricantes, in latere interiore versùs ipsarum exortum candidæ, versùs extremitatem griseæ, in tota circumferentia albo marginatæ : ex istis tamen excipiendæ sunt quinque corpori finitimæ griseo-fuscæ, maculis quibusdam nigricantibus variæ, & versùs apicem albido fimbriatæ. Quæ novissimè dictæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices griseo-fuscæ, albido in apice marginatæ : quatuor intermediæ & binæ

tés sont couverts de plumes d'un gris clair, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun, & bordées d'une couleur plus claire : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, & bordées de blanchâtre par le bout, quelques-unes sont de plus variées de quelques taches noirâtres : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont cendrées en-dessous, noirâtres en-dessus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette derniere couleur : les moyennes sont d'un brun-noirâtre du côté extérieur; mais leur côté intérieur est blanc vers leur origine & gris vers leur extrémité; & tout le tour de la plume est bordé de blanc : il faut cependant excepter les cinq plus proches du corps, qui sont d'un gris-brun, variées de quelques taches noirâtres & bordées de blanchâtre vers leur extrémité. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun, & bor-

dées de blanchâtre par le bout : les quatre du milieu & les deux plus extérieures de chaque côté ſont marquées de taches tranſverſales noirâtres, ſçavoir trois placées ſur le côté extérieur, & une ſeulement placée ſur le côté intérieur ; tandis que les deux intermédiaires de chaque côté n'ont aucunes de ces taches. Les quatre plumes du milieu de la queue ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec eſt d'un rouge clair, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont auſſi d'un rouge clair ; & les ongles noirâtres. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

utrinque extimæ maculis inſigniuntur tranſverſis nigricantibus, tribus ſcilicet in latere exteriore poſitis, unicâ verò in latere interiore collocatâ ; binæ autem utrinque medium locum obtinentes maculis penitùs deſtituuntur. Rectrices quatuor intermediæ lateralium longitudinem paululùm ſuperant ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Oculorum irides avellaneæ. Roſtrum dilutè rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedeſque pariter dilutè rubri ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 4. Le Chevalier rouge.

Tringa pennis in medio fuſcis, ad margines griſeis ſuperne veſtita, infernè alba, maculis griſeo-fuſcis varia ; uropygio candido ; rectricibus griſeo-fuſcis, nigricante tranſverſim ſtriatis, albo in apice marginatis ; pedibus rubris . . . . Totanus ruber.

Tringa luteo cinereoque maculata ſubtus alba, roſtro pedibuſque rubris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 153.

Tringa

Tringa rostro pedibusque rubris, corpore luteo cinereoque variegato, subtus albo. Gambetta. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 3.
Calidris nigra, quæ Gambetta. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434, *hujus icon minimè accurata pag.* 432.
Gambetta Italis dicta. *Jonst. Avi. pag.* 109.
Gambetta Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 222.
Raj. Syn. Avi. pag. 117. *N°.* 2.
Totanus alter. *Willugh. Ornith. pag.* 221.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 11.
Gallinula pedibus nigris. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 9.
Glareola alia primæ similis, pedibus ex luteo rubentibus. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 1.
An Yacatopil, seu Rostrum Sudis? *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 29. *Cap. LXIX.*
Raj. Syn. Avi. pag. 164.
Chevalier. *Gesn. Avi. pag.* 795.
Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag.* 43; *avec une figure mal coloriée Pl.* 68.
Les Boulonnois l'appellent GAMBETTA. *Aldrov.*
Les Anglois, RED LEGGED HORSEMAN. *Alb.*
Les Mexiquains, YACATOPIL. *Fern.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & novem lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata, quatuordecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus undecim li-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce neuf lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatorze lignes; son pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere quatre lig-

nes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied sept pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, & le dos sont couverts de plumes brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Les plumes scapulaires sont de la même couleur. Le croupion est blanc. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & les côtés sont d'un blanc varié de taches de gris-brun, qui occupent le milieu de chaque plume. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes dans leur milieu, & grises sur leurs bords: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre, quelques-unes étant bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes: les neuf premieres sont

neas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & septem pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, partem colli superiorem, dorsumque vestiunt pennæ in medio fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares concolores. Uropygium est candidum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectricesque caudæ superiores & inferiores albent, maculisque variegantur griseofuscis, cujuslibet pennæ medium occupantibus. Pennæ alas subtus obtegentes albore nitent. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt in medio fuscæ, ad margines griseæ: majores à corpore remotiores fusconigricantes, quibusdam albo in apice marginatis. Viginti quinque remigibus ala conflatur: novem primores sunt

ſubtus cinereæ, ſuperne nigricantes, pauco albido in apice marginatæ, ſcapis quoque albidis præditæ : undecim quæ proximè ſequuntur, à decima ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, in latere exteriore fuſco-nigricantes, in interiore fuſcæ, inque tota circumferentia albo fimbriatæ : quinque corpori viciniores in medio fuſcæ, latè griſeo-marginatæ. Quæ quinque noviſſimæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices griſeo-fuſcæ, nigricante tranſverſim ſtriatæ, albo in apice marginatæ. Quatuor intermediæ lateralium longitudinem nonnihil ſuperant ; laterales autem ſenſim atque ſenſim longitudine minuunturad utrinque extimam uſque breviorem. Oculorum irides ſunt flavo-virideſcentes, eaſque ambit circulus niger. Roſtrum ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque rubrum, à medietate ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri ; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora degit. *Ex mu-*

cendrées en-deſſous, noirâtres en-deſſus, bordées à leur extrémité d'un peu de blanchâtre, & ont leur tige de cette derniere couleur : les onze ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont d'un brun-noirâtre du côté extérieur, brunes du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps ſont brunes dans leur milieu, avec une large bordure griſe. Ces cinq dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-brun, rayées tranſverſalement de noirâtre, & bordées de blanc par le bout. Les quatre du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. L'iris des yeux eſt d'un jaune-verdâtre, entouré d'un cercle noir. Le bec eſt rouge depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur, & noir de là juſqu'à ſon extrémité. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges ; & les

ongles noirs. On le trouve ſur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ſeo Realmuriano.

** 5. LE CHEVALIER RAYÉ.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 1.

Tringa pennis griſeo-fuſcis, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis ſuperne veſtita, infernè alba, tæniis aliis tranſverſis, aliis longitudinalibus fuſcis varia; collo fuſco, marginibus pennarum in collo ſuperiore albo-rufeſcentibus, in collo inferiore albis; uropygio candido; rectricibus albis, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatis, binis intermediis in albo colore griſeo-fuſco maculatis; pedibus pallidè rubris . . . . TOTANUS STRIATUS.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix-huit lignes de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, treize lignes; ſon pied un pouce ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere quatre lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octodecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem & ſex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum ſemi lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; poſticus autem quatuor lineas tantùm. Trium digitorum

anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & sex pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis superiorem cooperiunt pennæ fusco-nigricantes, in utroque latere rufescente marginatæ. Quæ collum superius obtegunt, sunt in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, griseo-fuscæ, tæniis transversis fusco-nigricantibus notatæ: scapo quoque fusco-nigricante præditæ. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur & pars colli inferior pennis vestiuntur in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscis, ad margines albis. Quæ pectus, ventrem & latera obtegunt, albæ, tæniis variegatæ fuscis, aliis transversis, aliis quibusdam longitudinalibus. Cru-

avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de roussâtre. Celles qui couvrent le dessus du col, sont brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & d'un blanc-roussâtre sur leurs bords. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un gris-brun, & marquées de rayes transversales d'un brun-noirâtre : leur tige est de cette derniere couleur. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge & la partie inférieure du col sont couvertes de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & blanches sur leurs bords. Celles qui couvrent la poitrine, le ventre, & les côtés, sont blanches & variées de bandes brunes, les unes transversales & quelques autres longitudinales. Le haut des jambes est blanc. Les couvertures du dessus & du des-

ſous de la queue ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de brun-noirâtre. Celles du deſſous des aîles ſont entiérement blanches, ſi l'on en excepte les plus grandes, qui ſont rayées de bandes tranſverſales d'un gris-blanc. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun : les moyennes ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de brun-noirâtre : les grandes les plus proches du corps ſont brunes, & terminées d'un blanc ſur lequel eſt une bande brune tranſverſale & en zig-zags : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-noirâtre. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſix plumes : les ſept premieres ſont en-deſſous d'un gris-blanc, & en-deſſus d'un brun-noirâtre, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; de plus la tige de la premiere eſt blanche : les treize qui ſuivent celles-ci, ſçavoir depuis la huitiéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont brunes à leur origine, & blanches dans le reſte de leur longueur, cette der-

rum ſuprema pars albicat. Tectrices caudæ ſuperiores & inferiores ſunt quoque candidæ, fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatæ. Inferiores alarum tectrices penitùs albicantes, ex illis tamen majores tæniis tranſverſis cinereo-albis ſtriatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, obtegunt plumulæ fuſcæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ ſunt griſeo-fuſcæ : mediæ concolores, ſed fuſco-nigricante tranſverſim ſtriatæ : majores corpori viciniores fuſcæ, apice albo, tæniâ tranſversâ & undatâ fuſcâ inſignito : majores tandem à corpore remotiores ex fuſco nigricant. Alam componunt viginti ſex remiges, quarum ſeptem primores ſunt ſubtus cinereo-albæ, ſuperne verò fuſco-nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte cinereo-albæ ; prioris inſuper ſcapus albicat : tredecim proximè ſequentes, ab octava ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, in exortu fuſcæ, in reliqua longitudine candidæ, candore ſcilicet eò majus ſpatium occupante, quò remix fit

corpori vicinior; ita ut octava sit ferè in toto fusca, vigesima verò ferè penitùs candida : in quatuor ex istis remigibus, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, albor lineolis quibusdam transversis fuscis insignitur : vigesima prima pauco in exortu fusco notatur, inde ad apicem alba est, lineis quibùsdam transversis fuscis striata : vigesima secunda griseo-fusca, in utraque margine alba, griseo-fusco transversim striata : quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, tæniis notatæ transversis fusco-nigricantibus; quæ tæniæ eò minùs sunt conspicuæ, quò remix fit corpori vicinior. Sex remiges corpori finitimæ longæ sunt, strictiores & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, fusco-nigricante transversim striatæ : duarum insuper intermediarum alba intervalla sunt griseo-fusco maculata. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque rubescens, à mediete ad apicem nigrum. Pars crurum plumis denudata,

niere couleur occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps; de sorte que la huitiéme est presqu'entiérement brune, & la vingtiéme presqu'entiérement blanche : dans quatre de ces plumes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à l'onziéme inclusivement, le blanc est marqué de quelques petites lignes transversales brunes : la vingt-uniéme a un peu de brun à son origine; tout le reste est blanc & rayé de quelques lignes transversales brunes : la vingt-deuxiéme est d'un gris-brun, & bordée des deux côtés d'un blanc rayé transversalement de gris-brun : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun rayé transversalement de brun-noirâtre; cette rayure est d'autant moins apparente, que la plume est plus proche du corps. Les six plumes les plus proches du corps sont longues, étroites & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de brun-noirâtre : de plus dans les deux du milieu les intervales blancs sont tachés de gris-brun. Le bec est rougeâtre depuis son origine

jusque vers la moitié de sa longueur, & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville, & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

pedesque pallidè rubri ; ungues verò nigricantes. Circa maris littora versatur. *Ex museis D. de Bandeville & D. Aubry.*

** 6. Le Chevalier tacheté.

Voyez Pl. XVIII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines griseo-rufescentibus superne vestita, infernè alba, maculis nigricantibus varia ; uropygio & imo ventre candidis ; lateribus, rectricibusque albo & nigricante transversim striatis ; pedibus rubris . . . . Totanus nævius.

An Pluvialis flavo-cinerea ? *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 64. *hujus icon minimè accurata Tab.* 30.

Il est un peu moins gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long ; sa queue deux pouces quatre lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes & demie ; son pied un pouce sept lignes & demie ; celui du milieu des trois doigts

A præcedente paululùm crassitie superatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem novem pollices æquat, & ad extremos ungues decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est ; cauda duos pollices cum quatuor lineis ; pars crurum plumis denudata decem cum semi lineas ; pes unum pollicem & septem cum semi lineas ;

lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim cum semi lineas, extimus unum pollicem, intimus undecim lineas; posticus autem tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Caput, partem colli superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines griseo-rufescentes. Scapulares sunt quoque in medio nigricantes, sed ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striantur. Dorsum infimum & uropygium sunt candida. Guttur, collum inferius & pectus supremum nigricante & albido varia, nigricante scilicet uniuscujusque pennæ medium occupante, & albido circa margines posito; qui color albidus ad colli

antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes & demie, l'extérieur un pouce, l'intérieur onze lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied cinq pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête & les parties supérieures du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-roussâtre sur leurs bords. Les scapulaires sont pareillement noirâtres dans leur milieu, mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-roussâtre. La partie inférieure du dos & le croupion sont blancs. La gorge, la partie inférieure du col & la partie supérieure de la poitrine sont variées de noirâtre & de blanchâtre, le noirâtre occupant le milieu de chaque plume, & le blanchâtre en occupant les bords; cette derniere couleur tire un peu sur le roussâtre sur les côtés du col. Le bas de la poitrine & le haut du

ventre ſont blancs, & variés de quelques petites taches noirâtres. Le bas ventre eſt blanc & ſans taches. Les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, ainſi que les plumes qui couvrent les côtés, ſont rayées tranſverſalement de blanc & de noirâtre. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches, & variées d'un peu de noirâtre. Les petites du deſſus ſont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur à leur origine, rayées tranſverſalement de noirâtre & de gris-rouſſâtre à leur extrémité : les grandes les plus éloignées du corps ſont tout-à-fait noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur, ayant cependant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-blanc ; la premiere de ces plumes a ſa tige blanche ; & les dernieres ſont variées vers leur extrémité ſeulement de quelques lignes noirâtres, placées du côté intérieur ſur le gris-blanc : les moyennes (excepté les quatre plus proches du corps) ſont d'un gris-brun depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur, & de-là juſqu'à leur extrémité elles ſont blanches & rayées tranſverſalement de brun : les qua-

latera nonnihil ad rufeſcentem vergit colorem. Pectus infimum & venter ſupremus albent, & minutis quibuſdam maculis nigricantibus variegantur. Venter imus candidus eſt & immaculatus. Tectrices caudæ ſuperiores & inferiores, & pennæ latera cooperientes albo & nigricante tranſverſim ſtriantur. Tectrices alarum inferiores ſunt candidæ, pauco nigricante variæ. Superiores minores griſeo-fuſcæ : majores corpori viciniores in exortu concolores, in extremitate nigricante & griſeo-rufeſcente tranſverſim ſtriatæ : majores à corpore remotiores penitùs nigricantes. Remiges alarum majores ſimiliter nigricant, attamen in latere interiore maximâ parte ex cinereo albent ; ex iſtis prior inſuper ſcapo donatur candido ; & ultimæ versùs ipſarum extremitatem tantùm lineis quibuſdam variegantur nigricantibus, in latere interiore ſupra cinereo-album colorem poſitis : minores (quatuor corpori viciniori-bus exceptis) ſunt ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque griſeo-fuſcæ, à medietate ad api-

cem candidæ, fusco transversim striatæ : quatuor corpori finitimæ in medio griseo-fuscæ, ad latera nigricante & griseo-rufescente transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim constat rectricibus albo & nigricante transversim striatis. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque similiter rubri ; ungues verò nigricantes. Juxta maris littora degit. *Ex musæis D. de Bandeville & D. Aubry.*

tre plus proches du corps sont d'un gris-brun dans leur milieu, mais leurs côtés sont rayés transversalement de noirâtre & de gris-roussâtre. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes rayées transversalement de blanc & de noirâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges ; & les ongles noirâtres. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville & de celui de M. l'Abbé Aubry.*

** 7. Le Chevalier cendré.

Voyez Pl. XVII. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè albo-rufescens ; vertice nigricante ; collo inferiore & pectore griseo-rufescentibus ; uropygio cinereo-fusco, maculis nigricantibus vario ; rectricibus splendidè griseo-fuscis, versùs apicem tæniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatis, in apice rufescente marginatis, octo intermediis versùs apicem exteriùs rufescente maculatis ; pedibus saturatè cinereis . . . . Totanus cinereus.

Tringa remigibus fuscis, primâ rachi niveâ. *Faun. Suec. Linn. N°.* 151.
Tringa rostro lævi, pedibus fuscis, remigibus fuscis : rachi primæ niveâ. Tringa littorea. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *sp.* 12.

Gallinula pedibus nigricantibus. *Linn. Syſth. Nat. ed. 6. Gen. 60. ſp. 7.*
Chalidris nigra. *Jonſt. Avi. pag.* 109.
Charlet. Exer. pag. 112. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 107. *N°.* 2.
Chalidris nigra Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 432.
Charadrius nigricans. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. X. ſp.* 3.
Chevalier noir. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 208.
Héron blanc de M. Oldham. *Alb. Tom. III. pag.* 37 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 89.

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Chevalier rouge*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces dix lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a ſeize lignes de long; ſa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied un pouce dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, ſeize lignes & demie, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere quatre lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Il a un pied neuf pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées,

Cum *Totano rubro* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudam extremam decem pollices & totidem lineas explet, & ad extremos ungues tredecim pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſexdecim lineas longum eſt; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue ſexdecim cum ſemi lineas; extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum ſemi lineas; poſticus autem ſolummodo quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ, & cum intimo digito rudimento membranæ connectitur. Alis expanſis, extremitates majorum remi-

gum unius pedis & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad trium usque linearum distantiam ultra caudæ extremitatem protenduntur. Capitis vertex nigricat. Reliquum caput superius pennis vestitur in medio fuscis, in tota circumferentia grisеis. Pars colli superior penitùs grisea. Dorsum cooperiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores; in scapularibus tamen majoribus color nigricans ad virideſcentem splendidum colorem vergit. Uropygium & superiores caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ; quælibet tamen pennæ versùs extremitatem nigricante insignitur maculâ; color insuper cinereo-fuscus in pennarum marginibus paululùm ad rufeſcentem colorem inclinat. Guttur ex albo rufeſcit. Collum inferius & pectus sunt grisеo-rufeſcentia. Venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices ex albo nonnihil ad rufeſcentem inclinant colorem. Pennæ alas subtus obtegentes candidæ, minoribus, illis scilicet quæ versùs alarum margines locum

s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Le sommet de la tête est noirâtre. Tout le reste du dessus de la tête est couvert de plumes brunes dans leur milieu, & grises dans leur circonférence. La partie supérieure du col est entiérement de cette derniere couleur. Le dos est couvert de plumes noirâtres dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur; cependant sur les plus grandes de ces dernieres le noirâtre tire sur le verdâtre brillant. Le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun, & chaque plume est marquée vers son bout d'une tache noirâtre; de plus le cendré-brun tire un peu sur le roussâtre sur les bords des plumes. La gorge est d'un blanc-roussâtre. La partie inférieure du col & la poitrine sont d'un gris-roussâtre. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, les petites, sçavoir celles qui sont vers le bord de l'aîle, étant variées d'un peu de cendré-brun. Les petites couvertures

du deſſus des aîles ſont noirâtres dans leur milieu, & d'un gris-brun ſur leurs bords : les grandes les plus proches du corps ſont noirâtres & bordées de roux : les grandes les plus éloignées du corps ſont pareillement noirâtres, & bordées de blanchâtre par le bout ſeulement. L'aîle eſt compoſée de vingt-deux plumes : les neuf premieres ſont d'un brun-noirâtre, cette couleur étant plus claire ſur le côté intérieur, & bordées de blanchâtre par le bout ſeulement : les neuf ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la dix-huitiéme incluſivement, ſont d'un cendré-brun, & bordées de blanc ; ces dix-huit plumes ont la tige blanche : les quatre plus proches du corps ſont noirâtres, & bordées de rouſſâtre. Ces quatre dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-brun brillant, marquées vers leur extrémité d'une bande noirâtre parallele à ſa circonférence, & bordées de rouſſâtre par le bout : les huit du milieu ſont de plus tachées d'un peu de rouſſâtre ſur leur côté extérieur vers le bout. Le bec

tenent, pauco cinereo-fuſco variegatis. Superiores alarum tectrices minores ſunt in medio nigricantes, ad margines griſeo-fuſcæ : majores corpori finitimæ nigricantes, rufo fimbriatæ : majores à corpore remotiores ſimiliter nigricant, ſed in apice tantùm albido marginantur. Alam componunt viginti duo remiges, quarum novem primores ſunt fuſco-nigricantes, attamen in latere interiore nonnihil dilutiores, & in apice tantùm albido marginatæ : novem proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad decimam octavam uſque incluſivè, cinereo-fuſcæ, albo fimbriatæ ; quæ octodecim remiges ſcapis albis præditæ ſunt : quatuor corpori finitimæ nigricantes, rufeſcente marginatæ. Quatuor nuper deſcriptæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices ſplendidè griſeo-fuſcæ, versùs apicem tæniâ nigricante ipſius circumferentiæ parallelâ notatæ, rufeſcente in apice marginatæ : octo intermediæ pauco inſuper rufeſcente in

latere exteriore versùs apicem maculantur. Roſtrum, ungueſque plumbeo-nigricante colore imbuti. Pars crurum plumis denudata & pedes ſaturatè cinerei. Circa maris littora verſatur. *Ex muſeo D. de Bandeville.*

& les ongles ſont de couleur de plomb noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un cendré foncé. On le trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

8. Le Chevalier blanc.

Tringa candida, maculis tranſverſis griſeo-rufeſcentibus ſuperne variegata; remigibus majoribus griſeis; rectricibus candidis, griſeo-rufeſcente tranſverſim ſtriatis; pedibus aurantiis . . . . Totanus candidus.

Beccaſſine blanche. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl.* 139. (*fig. antérieure*).

Les Anglois l'appellent White Red-Shank, *ou* Pool-Snipe. *Edwards.*

Craſſitie præcedentem paulùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos ferè pollices longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim lineas, extimus undecim lineas, intimus decem lineas; poſticus autem

Il eſt un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a près de deux pouces de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatorze lignes, l'extérieur onze lignes, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes & de-

mie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un blanc varié de petites taches tranſverſales d'un gris-rouſſâtre. La partie antérieure de la tête, la gorge, le deſſous du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, les côtés & le croupion ſont blancs & ſans taches. Les couvertures du deſſous des aîles ſont pareillement blanches, mais variées de quelques petites taches griſes peu apparentes. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les ſcapulaires : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un blanc ſale. Les grandes plumes de l'aîle ſont griſes : les moyennes ſont blanches, & variées de taches tranſverſales

tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad tres uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſumque veſtiunt pennæ candidæ, minutis maculis tranſverſis griſeo-rufeſcentibus variegatæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Caput anterius, guttur, colli inferior pars, pectus, venter, crurum pars ſuprema, inferiores caudæ tectrices, latera & uropygium albicant, maculiſque deſtituuntur. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt ſimiliter candidæ, quibuſdam tamen minutis maculis griſeis non multùm conſpicuis variegatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac ſcapulares ipſæ tinguntur : majores à corpore remotiores ſordidè albæ. Remiges alarum majores griſeæ : minores candidæ, maculis tranſverſis griſeo-rufeſcentibus variæ. Ex minoribus

minoribus corpori viciniores longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus candidis, griseo-rufescente transversim striatis. Rostrum aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque aurantii; ungues verò nigricantes. Habitat in *Freto Hudsonis*.

d'un gris-roussâtre. De ces dernieres les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes blanches, rayées transversalement de gris-roussâtre. Le bec est orangé, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes & les pieds sont orangés; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudson*.

9. Le Chevalier de Bengale.

Tringa superne viridis, infernè alba; capite ad latera, gutture & collo saturatè fuscis; vertice, oculorum ambitu & uropygio candidis; rectricibus purpureis, maculis aurantiis variegatis; pedibus luteo-virideſcentibus . . . . . Totanus Bengalensis.

Rallus corpore vertice oculisque albis, capite colloque nigris, alis dorsoque viridibus, remigibus primariis rubro maculatis. Rallus Benghalensis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 4.

Rallus aquaticus Bengalensis. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 5.

Râle d'eau de Bengale. *Alb. Tom. III. pag.* 38; *avec une figure mal coloriée Pl.* 90.

Les Anglois l'appellent Bengall Water Rail. *Alb.*

Tringam crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues decem

Il est à peu près de la grosseur du *Beccasseau*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de dix

pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce huit lignes de long; ſa queue un pouce ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes; ſon pied dix-huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes & demie; & celui de derriere environ cinq lignes. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Le ſommet de la tête eſt blanc. Le tour des yeux eſt de la même couleur: cette blancheur forme de chaque côté de la tête une petite bande, qui s'étend juſque vers l'occiput, en ſe terminant en pointe. Les côtés de la tête, la gorge & le col ſont d'un brun-foncé. La partie ſupérieure du dos, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus des aîles ſont vertes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & les côtés ſont blancs. Les grandes plumes de l'aîle ſont pourpres, & variées chacune de cinq grandes taches orangées, placées ſur leur côté extérieur: les

pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & octo lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum ſex lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes octodecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus novem cum ſemi lineas; poſticus autem quinque circiter lineas. Alæ complicatæ ad caudam ferè extremam pertingunt. Capitis vertex albicat. Oculorum ambitus ſimiliter candidus: qui candor in utroque capitis latere exiguam efformat tæniam versùs occipitium uſque productam, & in acumen deſinentem. Caput ad latera, guttur & collum ſunt ſaturatè fuſca. Dorſi ſuprema pars, pennæ ſcapulares & ſuperiores alarum tectrices virides. Dorſum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores albi ſunt coloris. Remiges alarum majores purpureæ; quælibet autem quinque variegatur majuſculis maculis aurantiis, in latere exteriore poſitis: minores

ſunt virides ; corpori tamen finitima candida. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices purpureæ, majuſculis maculis aurantiis variegatæ. Oculorum irides luteæ. Roſtrum quoque luteum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque luteo-virideſcentes ; ungues verò nigri. Habitat in *Bengalenſi* Regno.

moyennes ſont vertes ; cependant la plus proche du corps eſt blanche. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes. La queue eſt compoſée de douze plumes pourpres, & variées de grandes taches orangées. L'iris des yeux eſt jaune. Le bec eſt de la même couleur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune-verdâtre ; & les ongles noirs. On le trouve dans le Royaume de *Bengale*.

** 10. L'ALOUETTE-DE-MER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 1.

Tringa pennis in medio ſecundùm ſcapum fuſcis, ad margines griſeis ſuperne veſtita, infernè alba ; tæniâ utrinque à roſtro ad oculos candicante ; gutture & collo inferiore albidis, maculis fuſcis variegatis ; rectricibus griſeis, binis intermediis exteriùs ſaturatè fuſcis . . . . CINCLUS.

Tringa pulla maculis minoribus rotundis albis variegata, ventre albicante. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 477.

Trynga quarta. *Jonſt. Avi. pag.* 112.

Cinclus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 122, *in qua hujus icon minimè accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon minùs accurata pag.* 491. *Jonſt. Avi. pag.* 112.

Cinclus, ſeu Motacilla maritima. *Geſn. Avi. pag.* 616. *hujus icon minimè accurata pag.* 617.

Cinclus Ornithologi & Turneri. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 493.

Cinclus prior Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 110. *N°. A.* 13.

Gallinago minima ex fuſco & albo varia. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 320. *N°. XIV. hujus icon minimè accurata Tab.* 265. *fig.* 4.

Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 11.
Schœniclus. *Moehr. Avi. Gen.* 94.
Schœniclos, ſive Junco Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 487. *hujus duæ icones minùs accuratæ pag.* 489.
Junco. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°. X.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. X.*
Junco Bellonii. *Jonſt. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Avis The Stint dicta. *Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag.* 19.
The Stint. *Willugh. Ornith. pag.* 226.
Alouette de mer. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 217; *dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 50 *a, dans laquelle eſt la même figure.*
Bergeronette. *Kolbe. Deſcrip. du C. de B. Eſp. Tom. III. pag.* 160.
Sanderling d'Arbres. *Alb. Tom. III. pag.* 37; *avec une figure mal coloriée Pl.* 88.
Les Grecs l'appellent Κιγκλος. *Geſn. Aldrov. Jonſt.* Σχοινικλος. *Bel. Aldrov.*
Les Boulonnois, GIAROLO; GIARONCELLO. *Aldrov.*
Les Allemands, STEIN-BICKER; STEIN-BEYSSER. *Geſn.*
Les Allemands aux environs de Straſbourg, LYSSKLICKER. *Geſn.*
Les Hollandois, STRAND-LOOPER. *Kolbe.*
Les Anglois, STINT. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald.* WATER-SWALLOW. *Geſn.* SPAR *ou* PERR. *Charlet.* TREE WIDDLE. *Alb.*
Les Anglois qui habitent la Province de Suſſex, OX-EYE. *Raj.*
Les Anglois de la Jamaïque, LEAST-SNIPE. *Sloane. Raj.* SNIPE. *Browne.*

Elle eſt beaucoup plus groſſe que l'*Alouette huppée*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces ſix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long; ſa queue un pouce onze lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes; ſon pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes

Alaudam criſtatam nonnihil craſſitie ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues ſeptem pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuordecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum undecim lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue

novem cum semi lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem lineas tantummodo binas. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsum & uropygium vestiunt pennæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem fuscæ, ad margines griseæ. Scapulares eodem imbutæ colore. Superiores caudæ tectrices fusconigricantes. In utroque capitis latere exigua extat tænia candicans, ab exortu rostri ad oculos usque producta. Guttur & collum inferius candicant, minutisque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundùm ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, venter, latera, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albicant. Crurum suprema pars exteriùs grisea, interiùs alba. Alarum margi-

& demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derriere deux lignes seulement. Tous ses doigts sont séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & grises sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun-noirâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande blanchâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusqu'aux yeux. La gorge & la partie inférieure du col sont blanchâtres, & variées de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume selon la longueur de sa tige. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le haut des jambes est gris du côté extérieur, & blanc du côté intérieur. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de

petites plumes griſes, bordées de blanc. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun, bordées de gris clair, le milieu de chaque plume étant d'une couleur plus foncée : les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun foncé, & terminées pareillement de blanc; mais dans les trois premieres cette derniere couleur eſt peu apparente. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les neuf premieres ſont d'un brun aſſez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur; leur tige eſt blanchâtre vers leur extrémité ſeulement; de plus cinq de celles-là, ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la neuviéme incluſivement, ſont bordées de blanc du côté extérieur, mais ſeulement vers le milieu de leur longueur : les onze ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont d'un gris-brun, bordées de blanc; elles ont auſſi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus proche du corps : ces vingt plumes ſont d'un gris-blanc en-deſſous : les

nes, infra articulum carpo humano reſpondentem, veſtiunt plumulæ griſeæ, albo fimbriatæ. Tectrices alarum ſuperiores minores ſunt griſeo-fuſcæ, griſeo diluto marginatæ, attamen in medio colore ſaturatiore tinctæ : majores corpori finitimæ griſeo-fuſcæ, apicibus albis præditæ : majores à corpore remotiores ſaturatè fuſcæ, albo ſimiliter terminatæ; in tribus autem primoribus albedo non multùm eſt conſpicua. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : novem primores ſunt in latere exteriore ſaturatè, in interiore dilutiùs fuſcæ, ſcapo versùs ipſarum extremitatem tantùm albido præditæ; ex iſtis quinque, à quinta ſcilicet ad nonam uſque incluſivè, in latere exteriore albo inſuper marginantur, ſed tantùm versùs ipſarum mediam longitudinem : undecim proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, griſeo-fuſcæ, albo fimbriatæ, attamen in latere interiore maximâ parte candidæ, candore ſcilicet eò majus ſpatium occupante, quò remix fit corpori vicinior : quæ viginti remiges ſunt ſubtus cinereo-albæ :

quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, fusco obscuriore in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor noviſſimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ sunt in latere exteriore saturatè fuscæ, in latere interiore griseæ: laterales omnes in utroque latere simili griseo imbutæ. Binæ intermediæ in acumen desinunt, & laterales trium ferè linearum longitudine antecellunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusco-nigricantes. Maris, fluviorumque littora frequentat. Gregatim volat hæc species. *Ex museo Realmuriano.*

quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un brun foncé du côté extérieur, & grises du côté intérieur : toutes les latérales sont des deux côtés de cette derniere couleur. Les deux du milieu se terminent en pointe, & sont plus longues que les latérales de près de trois lignes. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-noirâtre. On la trouve sur le bords de la mer & des rivieres. Cette espece vole par troupe. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

A. *La petite Alouette-de-mer.*

Cinclus minor.

Cinclus minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 490. *hujus icon minùs accurata pag.* 492.
Cincli congener prior. *Jonst. Avi. pag.* 112.
Les Boulonnois l'appellent Giarolo ; Giaroncello. *Aldrov.*

Coloribus & corporis figurâ præcedenti omnino

Elle ressemble tout-à-fait à la précédente soit pour la for-

me du corps, ſoit pour les couleurs; elle en différe ſeulement en ce qu'elle eſt un peu moins grande. On la trouve dans les mêmes endroits.

reſpondet; ab illo tantùm differt magnitudine, quâ ei cedit. Iiſdem in locis habitat.

** 11. L'ALOUETTE-DE-MER A COLLIER.

Voyez Pl. XIX. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis ſuperne veſtita, infernè alba; uropygio griſeo-fuſco, pennis in medio obſcurioribus; gutture & collo inferiore maculis fuſcis variegatis; pectore fuſco, marginibus pennarum candidis; rectricibus griſeis, binis intermediis interiùs ſaturatè fuſcis, lateralibus interiùs albo marginatis, ſcapo albo præditis . . . . CINCLUS TORQUATUS.

Elle n'eſt pas ſi groſſe que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſix pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſept pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue un pouce dix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes; ſon pied neuf lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes; l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere deux lignes ſeulement. Elle a douze pouces quatre lignes de vol; & ſes aî-

Præcedenti craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſex pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues ſeptem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda unum pollicem cum decem lineis; pars crurum plumis denudata ſex lineas; pes novem cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; poſticus autem lineas tantummodo binas. Alis expanſis, extremitates majorum remigum

gum duodecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares concolores. Quæ partem colli superiorem obtegunt, sunt in medio fuscæ, ad margines albo-rufescentes. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, griseo-fuscæ, attamen in medio colore nonnihil obscuriore imbutæ. Ex superioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, fuscæ sunt, quibusdam ex istis rufo variegatis: quæ ad latera positæ sunt, partim fuscæ, partim candidæ. Guttur & collum inferius albicant, minutisque variegantur maculis fuscis, cujuslibet pennæ medium secundùm ipsarum scapi longitudinem occupantibus. Pectus, laterumque partem supremam vestiunt pennæ fuscæ, candido marginatæ. Venter, crurum suprema pars, laterum pars infima, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Alarum margines, infra articules, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête & celle du dos sont couvertes de plumes noirâtres dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie supérieure du col, sont brunes dans leur milieu, & d'un blanc-roussâtre sur leurs bords. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un gris-brun, le milieu de chacune étant d'une couleur un peu plus obscure. Parmi les couvertures du dessus de la queue, celles qui occupent le milieu, sont brunes, & quelques-unes d'entr'elles sont variées de roux: celles qui occupent les deux côtés, sont en partie brunes & en partie blanches. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de petites taches brunes, qui occupent le milieu de chaque plume, selon la longueur de sa tige. La poitrine & le haut des côtés sont couverts de plumes brunes, bordées de blanc. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & le bas des côtés sont blancs. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

couvert de petites plumes grises, bordées de blanc. Les petites & les moyennes couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun un peu plus foncé dans leur milieu, ſelon la longueur de leur tige, qu'ailleurs, & bordées de blanchâtre; les grandes les plus proches du corps ſont d'un gris-brun, & terminées de blanc: les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun foncé; de ces dernieres les plus intérieures ſont terminées de blanc. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes: les neuf premieres ſont d'un brun aſſez foncé du côté extérieur & plus clair du côté intérieur; leur tige eſt blanchâtre vers leur extrémité ſeulement; de plus cinq de celles-là ſçavoir depuis la cinquiéme juſqu'à la neuviéme incluſivement, ſont bordées de blanc du côté extérieur, mais ſeulement vers le milieu de leur longueur: les onze ſuivantes, ſçavoir depuis la dixiéme juſqu'à la vingtiéme incluſivement, ſont d'un gris-brun, bordées de blanc; elles ont auſſi la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, le blanc occupant cependant d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus proche du corps: ces vingt plumes ſont d'un

lum carpo humano reſpondentem, cooperiunt plumulæ griſeæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices, minimæ ſcilicet & mediæ, griſeo-fuſcæ, in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem colore paulò ſaturatiore tinctæ, albido marginatæ: majores corpori viciniores griſeo-fuſcæ, ad apicem candidæ: majores à corpore remotiores ſaturatè fuſcæ; ex iſtis autem noviſſimis, intimæ albo terminantur. Alam componunt viginti quatuor remiges, quarum novem primores ſunt in latere exteriore ſaturatè, in interiore dilutiùs fuſcæ, ſcapo versùs ipſarum extremitatem tantùm albo præditæ; ex iſtis quinque, à quinta ſcilicet ad nonam uſque incluſivè, in latere exteriore albo inſuper marginantur, ſed tantùm versùs ipſarum mediam longitudinem: undecim proximè ſequentes, à decima ſcilicet ad vigeſimam uſque incluſivè, griſeo-fuſcæ, albo fimbriatæ, attamen in latere interiore maximâ parte candidæ, candore ſcilicet eò majus ſpatium occupante, quò remix fit corpori vicinior: quæ viginti remiges ſunt ſubtus

cinereo-albæ : quatuor corpori finitimæ griseo-fuscæ, fusco obscuriore in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem imbutæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ in latere exteriore griseæ, in interiore saturatè fuscæ : laterales omnes in utroque latere griseæ, interiùs albo marginatæ, scapo albo præditæ. Binæ intermediæ duarum linearum longitudine laterales excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigricantes. Juxta maris & fluviorum littora versatur. *Ex museo D. Aubry.*

gris-blanc en-dessous : les quatre plus proches du corps sont d'un gris-brun, cette couleur étant plus obscure dans leur milieu selon la longueur de leur tige. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont grises du côté extérieur, & d'un brun foncé du côté intérieur : toutes les latérales sont grises des deux côtés, bordées intérieurement de blanc, & ont leur tige blanche. Les deux du milieu sont plus longues de deux lignes que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirâtres. On la trouve sur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

** 12. L'Alouette-de-mer de S. Domingue.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 1.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufis superne vestita, infernè albo-rufescens ; uropygio griseo-fusco, pennis in medio obscurioribus ; genis, gutture & collo inferiore maculis fuscis variegatis ; rectricibus binis intermediis nigricantibus, rufo fimbriatis, lateralibus griseis, albo-rufescente marginatis.... Cinclus Dominicensis.

Elle eſt un peu plus groſſe que la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes de long; ſa queue deux pouces une ligne; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, neuf lignes; ſon pied un pouce; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a auſſi un pouce de long, l'extérieur dix lignes & demie, l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes ſeulement. Tous ſes doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a quinze pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col, & le dos ſont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & rouſſes ſur leurs bords. Les ſcapulaires ſont de la même couleur. Celles qui couvrent le croupion, ſont d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant d'une couleur un peu plus obſcure. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun-noirâtre. Les

Craſſitie *Cinclum noſtratem* paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo pollices explet, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim lineas longum eſt; cauda duos pollices cum linea una; pars crurum plumis denudata novem lineas; pes unum pollicem; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus decem cum ſemi lineas longus eſt; intimus decem lineas; poſticus autem tres ſolummodo lineas. Omnes digiti ſunt ad exortum uſque à ſe invicem diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quindecim pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ ad duas uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſumque veſtiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufæ. Scapulares eodem colore imbutæ. Quæ uropygium cooperiunt, ſunt griſeo-fuſcæ, unaquâque pennâ in medio colore nonnihil obſcuriore tinctâ. Su-

periores caudæ tectrices ex fusco nigricant. Caput ad latera, idque infra oculos, sive genæ, guttur & collum inferius ex albo rufescunt, & minutis maculis fuscis variegantur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt quidem albo-rufescentes, sed maculis destituuntur. Tectrices alarum inferiores minores griseo-fuscæ, albo-rufescente fimbriatæ : majores corpori finitimæ albo-rufescentes : majores à corpore remotiores dilutè cinereæ, strictissimis marginibus albo-rufescentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori viciniores, fuscæ, albo-rufescente marginatæ : majores à corpore remotiores penitùs fuscæ. Alam componunt viginti tres remiges subtus dilutè cinereæ, & scapo albo præditæ ; superne verò novem primores fuscæ sunt, attamen in latere interiore maximâ parte griseo-fuscæ ; ex istis autem prior scapo donatur candido : decem proximè sequentes, à decima scilicet ad decimam nonam usque inclusivè, sunt griseo-fuscæ, in latere exteriore albo-

côtés de la tête au-dessous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de petites taches brunes. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc-roussâtre & sans taches. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-brun, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus proches du corps sont de cette derniere couleur : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-roussâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes, & bordées de blanc-roussâtre : les grandes les plus éloignées du corps sont entiérement brunes. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, qui sont en-dessous d'un cendré clair, & ont leur tige blanche ; mais en-dessus les neuf premieres sont brunes, ayant une grande partie de leur côté intérieur d'un gris-brun ; la premiere de celles-ci a aussi sa tige blanche : les dix suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la dix-neuviéme inclusivement, sont d'un gris-brun, & bor-

dées extérieurement de blanc-rouſſâtre : les quatre plus proches du corps ſont noirâtres, & bordées de roux. Ces quatre dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſque juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont noirâtres, & bordées de roux : toutes les latérales ſont griſes, & bordées de blanc-rouſſâtre. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, & ſe terminent en pointe. Le bec eſt brun, excepté ſon extrémité, qui eſt noire. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont bruns ; & les ongles noirâtres. On la trouve à *S. Domingue*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Chervain*.

rufeſcente ſimbriatæ : quatuor corpori finitimæ nigricantes, rufo marginatæ. Quæ quatuor noviſſimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad duas ferè tertias longitudinis caudæ partes pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem antecellit. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ nigricantes, rufo ſimbriatæ : laterales omnes griſeæ, albo-rufeſcente marginatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt, & in acumen deſinunt. Roſtrum fuſcum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque fuſci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Dominicenſi Inſula*, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Chervain*.

** 13. La petite Alouette-de-mer de S. Domingue.

Voyez Pl. XXV. Fig. 2.

Tringa pennis in medio nigricantibus, ad margines rufeſcentibus ſuperne veſtita, infernè albo-rufeſcens ; uropygio griſeo-fuſco, pennis in medio obſcurioribus ; rectricibus binis intermediis exteriùs griſeo-fuſcis, interiùs nigricantibus, lateralibus griſeis, tribus utrinque extimis ſcapo albido præditis, binis proximis albo-rufeſcente in apice marginatis . . . . Cinclus Dominicensis minor.

Crassitie *Passerem domesticum* non excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quinque pollices & octo lineas æquat, & ad extremos ungues sex pollices cum linea unica. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque novem cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & octo lineas; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes novem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, intimus septem cum semi lineas; posticus autem binas tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum decem pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas usque lineas ultra caudæ extremitatem protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsumque vestiunt pennæ in medio nigricantes, ad margines rufescentes. Scapulares

Elle n'est pas plus grosse qu'un *Moineau franc*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de cinq pouces huit lignes, & jusqu'à celui des ongles de six pouces une ligne. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a neuf lignes & demie de long; sa queue un pouce huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied neuf lignes & demie; celui du milieu de trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, l'intérieur sept lignes & demie; & celui de derriere deux lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a dix pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à deux lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col, & le dos sont couverts de plumes noirâtres dans leur milieu, & roussâtres sur leurs bords. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent

le croupion, ſont d'un gris-brun, le milieu de chaque plume étant d'une couleur un peu plus obſcure. Parmi les couvertures du deſſus de la queue, celles qui occupent le milieu, ſont noirâtres; & celles qui occupent les deux côtés, ſont en partie noirâtres & en partie blanchâtres. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont d'un blanc-rouſſâtre. Les petites couvertures du deſſous des aîles ſont d'un gris-brun, & bordées de blanc-rouſſâtre : les grandes les plus proches du corps ſont de cette derniere couleur; les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un cendré clair, fort étroitement bordées d'un blanc-rouſſâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont brunes, & bordées de blanc-rouſſâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres; & de ces dernieres, les plus intérieures ſont bordées de blanc-rouſſâtre par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les dix premieres ſont noirâtres, ayant cependant la

concolores. Quæ uropygium obtegunt, ſunt griſeo-fuſcæ, attamen in medio colore nonnihil obſcuriore imbutæ. Ex ſuperioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, nigricant; quæ verò ad latera collocantur, ſunt partim nigricantes, partim albidæ. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices ex albo-rufeſcunt. Tectrices alarum inferiores minores ſunt griſeo-fuſcæ, albo-rufeſcente fimbriatæ: majores corpori viciniores albo-rufeſcentes: majores à corpore remotiores dilutè cinereæ, ſtrictiſſimis marginibus albo-rufeſcentibus præditæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, fuſcæ, albo-rufeſcente marginatæ: majores à corpore remotiores nigricantes; ex iſtis autem noviſſimis, intimæ albo-rufeſcente in extremitate marginantur. Viginti quatuor remigibus ala conflatur : decem primores nigricant, ſunt tamen in latere interiore maximâ parte griſeæ : decem quæ proximè ſequuntur, ab undecima

undecima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candicantes, versùs extremitatem fuscæ, interiùs & apice griseo marginatæ : quæ viginti remiges subtus sunt dilutè cinereæ, & scapo candicante donantur : quatuor corpori vicinio-res nigricantes, rufescente marginatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Remix prima reliquas omnes longitudine superat. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ in latere exteriore griseo-fuscæ, in interiore nigricantes : laterales omnes griseæ ; ex istis autem binæ duabus intermediis utrinque finitimæ albo-rufescente in apice marginantur ; & tres utrinque extimæ scapo albido præditæ sunt. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt, & in acumen desinunt. Rostrum fuscum, exceptâ tamen extremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigri.

plus grande partie de leur côté intérieur grise : les dix suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanchâtres à leur origine, brunes vers leur extrémité, & bordées de gris intérieurement & par le bout ; le dessous de ces vingt plumes est d'un cendré clair, & leur tige est blanchâtre : les quatre plus proches du corps sont noirâtres, & bordées de roussâtre. Ces quatre dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La premiere des plumes de l'aîle est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-brun du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : toutes les latérales sont grises ; mais les deux plus proches de chaque côté de celles du milieu sont bordées par le bout de blanc-roussâtre ; & les trois plus extérieures de chaque côté ont leur tige blanchâtre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, & se terminent en pointe. Le bec est brun, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirs.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que ſes couleurs ſont un peu plus claires.

On les trouve à *S. Domingue*, d'où elles ont été envoyées à *M. de Reaumur* par *M. Chervain.*

Fœmina à *mare* diſcrepat coloribus nonnihil dilutioribus.

Habitat in *Dominicenſi Inſula*, unde in *muſeum Realmurianum* miſſi ſunt à *D. Chervain.*

** 14. La Maubéche.

Voyez Pl. XX. Fig. 1.

Tringa ſuperne fuſco-nigricans, marginibus pennarum dilutè caſtaneis, infernè caſtanea; uropygio cinereo-fuſco, nigricante tranſverſim ſtriato, marginibus pennarum albidis; lateribus in parte infima fuſco-nigricante, albo & dilutè caſtaneo tranſverſim ſtriatis; rectricibus griſeo-fuſcis, lateralibus exteriùs albo marginatis . . . . Calidris.

Ruſticula ſylvatica. *Geſn. Avi. pag.* 505. *hujus icon minùs accurata pag.* 504.
Geſn. icon. Avi. pag. 111, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 476. *hujus icon minùs accurata pag.* 477.
Jonſt. Avi. pag. 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31.
Les Allemands l'appellent Wald-Schnepff; Holtz-Schnepff. *Geſn. Aldrov.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur du *Chevalier.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de neuf pouces dix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; ſa queue deux pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſept lignes;

Cum *Totano* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quindecim lineas longum eſt; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata ſeptem lineas; pes

unum pollicem ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet ; extimus decem lineas longus, intimus novem cum semi lineas ; posticus autem tres solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis quinque pollicum & novem linearum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli superiores, dorsique partem supremam vestiunt pennæ fusco-nigricantes, castaneo diluto marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorsum infimum & uropygium obtegunt, sunt cinereo-fuscæ, albido marginatæ, & tæniâ transversâ nigricante terminatæ. Superiores caudæ tectrices sunt transverlim striatæ, aliæ scilicet fusco-nigricante & castaneo diluto, aliæ albo & fusco-nigricante, aliæ tandem tribus simul suprà dictis coloribus. Basim mandibulæ superioris ambiunt plumulæ griseæ. Syn-

son pied un pouce ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce de longueur, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes & demie ; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied cinq pouces neuf lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre, bordées de marron clair. Les scapulaires sont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un cendré-brun, bordées de blanchâtre, & terminées par une bande transversale noirâtre. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement, les unes de brun-noirâtre & de marron clair, d'autres de brun-noirâtre & de blanc, & d'autres de ces trois couleurs. La bâse du demi-bec supérieur est entourée de petites plumes grises. Le synciput, les joues, la gorge, la partie inférieure du

col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & le haut des côtés ſont d'un marron clair. Le bas des côtés eſt couvert de plumes rayées tranſverſalement des mêmes couleurs que les couvertures du deſſus de la queue. Les plus petites couvertures du deſſous des aîles ſont brunes, & bordées de blanc : toutes les autres ſont blanches; cependant les grandes les plus proches du corps ſont variées de taches tranſverſales brunes. Les petites & les moyennes couvertures du deſſus des aîles ſont d'un gris-brun; les petites ſont de plus bordées d'une couleur plus claire, & les moyennes ſont variées de quelques taches, les unes d'un marron clair, & les autres d'un noirâtre-violet : les grandes les plus proches du corps ſont pareillement d'un gris-brun, & terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun foncé; & de ces dernieres les deux plus intérieures ſont terminées de blanc. L'aîle eſt compoſée de vingt-cinq plumes : les vingt-une premieres ſont blanchâtres en-deſſous; mais en-deſſus les neuf premieres ſont d'un brun foncé, ayant cependant la plus grande

ciput, genas, guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, crurum partem ſupremam, tectrices caudæ inferiores & latera in ſuprema parte tingit dilutus caſtaneus color. Latera in parte infima cooperiunt pennæ iiſdem coloribus tranſverſim ſtriatæ ac ſuperiores caudæ tectrices ipſæ ſtriantur. Inferiores alarum tectrices minimæ fuſcæ ſunt, alboque fimbriatæ : reliquæ omnes candidæ; majores tamen corpori viciniores maculis tranſverſis fuſcis variegantur. Tectrices alarum ſuperiores minimæ & mediæ ſunt griſeo-fuſcæ, minimis inſuper colore dilutiore fimbriatis, dum mediæ quibuſdam variegantur maculis, aliis dilutè caſtaneis, aliis nigricante-violaceis : majores corpori finitimæ ſimili griſeo-fuſco imbutæ, ſed apicibus albis præditæ : majores à corpore remotiores ſaturatè fuſcæ; ex iſtis autem noviſſimis, binæ intimæ albo terminatæ. Viginti quinque remigibus ala conflatur : viginti & una primores ſubtus candicant; ſuperne verò novem primores ſunt ſaturatè fuſcæ, attamen in latere interiore maximâ parte griſeæ;

ex istis insuper quinque, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, in latere exteriore mediam versùs longitudinem pauco marginantur candido: duodecim proximè sequentes, à decima scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, strictissimâ margine albâ donatæ: quatuor tandem corpori viciniores fuscæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, mediam circiter caudæ longitudinem attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ griseo-fuscæ: laterales omnes concolores, exteriùs albo marginatæ. Rostrum, ungueſque nigricant. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci sunt. Digiti autem lati sunt & crassi. Juxta maris littora degit. *Ex. musæo Realmuriano.*

partie de leur côté intérieur grise; de plus cinq de celles-là, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont bordées d'un peu de blanc du côté extérieur vers le milieu de leur longueur: les douze suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont d'un gris-brun, & bordées fort étroitement de blanc: enfin les quatre plus proches du corps sont brunes. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'à la moitié de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont d'un gris-brun: toutes les latérales sont de la même couleur, & bordées extérieurement de blanc. Le bec & les ongles sont noirâtres. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns. Ses doigts sont larges & gros. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 15. La Maubéche tachetée.

Voyez Pl. XXI. Fig. 1.

Tringa superne cinereo-fusca, maculis nigricante-violaceis rufisque varia, infernè dilutè castanea; collo inferiore

albo-rufescente, maculis fuscis castaneisque variegato; uropygio cinereo-fusco, nigricante transversim striato, marginibus pennarum candidis; lateribus nigricante maculatis; rectricibus binis intermediis cinereis, albo marginatis, lateralibus cinereo-fuscis, scapo albo præditis; utrinque extima lineâ longitudinali candidâ exteriùs notata . . . . CALIDRIS NÆVIA.

An Glareola castanea? *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 5.

Elle est un peu moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de huit pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quinze lignes de long; sa queue deux pouces deux lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, huit lignes; son pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur dix lignes, l'intérieur neuf lignes; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied cinq pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont d'un

Præcedenti paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octo pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues novem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quindecim lineas longum est; cauda duos pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes duodecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus decem lineas, intimus novem lineas; posticus autem tres tantùm lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis & quinque pollicum; alæ verò complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partes ca-

pitis & colli superiores sunt cinereo-fuscæ, minutissimis maculis nigricantibus variæ. Dorsum & scapulares pennæ eodem imbuuntur cinereo-fusco, sed majusculis variegantur maculis, aliis rufis, aliis ex nigricante ad violaceum vergentibus. Uropygium vestiunt pennæ cinereo-fuscæ, albo marginatæ, & versùs ipsarum extremitatem tæniâ nigricante circumferentiæ parallelâ notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque cinereæ, in reliqua longitudine nigricante & cinereo-albo transversim striatæ. Synciput, caput ad latera, idque infra oculos, guttur & collum inferius sunt albo-rufescentia, minutis quibusdam maculis fuscis varia; pars colli inferior quibusdam insuper aliis majoribus maculis dilutè castaneis variegatur. Pectus, ventrem & latera tingit color castaneus dilutus; quædam tamen ex pennis latera cooperientibus versùs ipsarum apicem maculâ nigricante notantur. Crurum pars suprema griseo imbuitur colore. Inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus cendré-brun varié de très-petites taches noirâtres. Le dos & les plumes scapulaires sont pareillement d'un cendré-brun, mais varié d'assez grandes taches, les unes rousses, & les autres d'un noirâtre tirant sur le violet. Le croupion est couvert de plumes d'un cendré-brun, bordées de blanc, & marquées vers leur bout d'une bande noirâtre parallele à sa circonférence. Les couvertures du dessus de la queue sont cendrées depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur; le reste est rayé transversalement de noirâtre & de gris-blanc. Le synciput, les côtés de la tête au-dessous des yeux, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc-roussâtre, varié de quelques petites taches brunes; la partie inférieure du col est de plus variée de quelques autres taches plus grandes & d'un marron clair. La poitrine, le ventre & les côtés sont de cette derniere couleur; mais quelques-unes des plumes des côtés sont marquées vers leur bout d'une tache noirâtre. Le haut des jambes est gris. Les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont blanches. Les petites du dessus des aîles sont d'un gris-brun : les gran-

des les plus proches du corps ſont d'un cendré-brun, bordées de blanc, & variées de quelques taches, les unes d'un noirâtre tirant ſur le violet, & les autres de couleur de marron : les ſuivantes, ſçavoir celles qui occupent le milieu, ſont d'un gris-brun : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont d'un brun-noirâtre, ayant la plus grande partie de leur côté intérieur cendrée : les moyennes ſont d'un cendré-brun très-clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & bordées extérieurement de blanc; il faut cependant excepter les quatre plus proches du corps, qui ſont du même cendré que celui du dos : toutes les autres plumes de l'aîle ont leur tige blanche. Ces quatre dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont cendrées & bordées de blanc : toutes les latérales ſont d'un cendré-brun aſſez clair du côté intérieur, un peu plus foncé du côté extérieur, & ont la tige blanche : la plus extérieure de chaque côté eſt

obtegentes albent. Tectrices alarum ſuperiores minores ſunt griſeo-fuſcæ : majores corpori viciniores cinereo-fuſcæ, albo fimbriatæ, quibuſdam variegatæ maculis, aliis ex nigricante ad violaceum inclinantibus, aliis caſtaneis : proximè ſequentes, iſtæ ſcilicet quæ medium obtinent locum, griſeo-fuſcæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores ex fuſco nigricant, ſunt tamen in latere interiore maximâ parte cinereæ : minores cinereo-fuſcæ, idque in latere interiore dilutiſſimè, in exteriore nonnihil ſaturatiùs, exteriùs inſuper albo marginatæ; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt quatuor corpori finitimæ, quæ eodem imbuuntur cinereo ac dorſum ipſum tingitur : reliquæ omnes remiges ſcapo candido præditæ ſunt. Quatuor nuper deſcriptæ remiges longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ cinereæ, albo marginatæ : laterales omnes cinereo-fuſcæ, dilutè quidem in latere interiore, in exteriore verò nonnihil

nonnihil saturatiùs, scapo albo præditæ : utrinque extima lineâ insuper candidâ, per totam ipsius longitudinem ductâ, exteriùs notatur. Rostrum nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque virideſcentes ; ungues verò nigri. Maris littora frequentat. *Ex museo D. de Bandeville.*

de plus marquée sur son côté extérieur d'une ligne blanche, qui s'étend dans toute sa longueur. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont verdâtres ; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

** 16. La Maubéche grise.

Voyez Pl. XXI. Fig. 2.

Tringa superne grisea, infernè alba, pennis in collo inferiore, pectore & lateribus tæniâ fuscâ undatâ circumferentiæ parallelâ notatis, in ventre lineolâ longitudinali fuscâ versùs apicem insignitis ; uropygio dilutè griseo, pennis duplici tæniâ fuscâ circumferentiæ parallelâ notatis, albo marginatis ; rectricibus griseis, tæniâ saturatiùs griseâ margini parallelâ insignitis, margine candidâ . . . . . Calidris grisea.

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam novem pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues novem pollices & totidem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quatuordecim cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices ; pars crurum plumis denudata sex lineas ; pes tredecim lineas ; trium digito-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de neuf pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a quatorze lignes & demie de long ; sa queue deux pouces ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes ; son pied treize lignes ; celui du milieu

des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes & demie, l'intérieur huit lignes & demie; & celui de derriere trois lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a un pied ſix pouces quatre lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes griſes, bordées d'un gris-blanchâtre. Celles qui couvrent le deſſus du col, ſont griſes dans leur milieu, & blanches ſur leurs bords. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont entiérement griſes. La partie inférieure du dos & le croupion ſont couverts de plumes d'un gris clair, marquées de deux bandes brunes paralleles à leur circonférence, & bordées de blanc. Les couvertures du deſſus de la queue ſont blanches, & marquées de bandes brunes, les unes longitudinales, & les autres tranſverſales. La gorge eſt entiérement blanche. La partie inférieure du col, la poitrine & les côtés ſont blancs; chaque plume

rum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem cum ſemi lineas, intimus octo cum ſemi lineas; poſticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis ſex pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ ad tres uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partem capitis ſuperiorem obtegunt pennæ griſeæ, griſeocandicante fimbriatæ. Quæ collum ſuperius cooperiunt, ſunt in medio griſeæ, ad margines candidæ. Quæ partem dorſi ſupremam veſtiunt, ſicut & ſcapulares, penitùs griſeæ. Dorſum infimum & uropygium pennis obteguntur dilutè griſeis, duplici tæniâ fuſcâ circumferentiæ parallelâ notatis, albo marginatis. Superiores caudæ tectrices ſunt candidæ, tæniis inſignitæ fuſcis, aliis longitudinalibus, alteris tranſverſis. Guttur penitùs albicat. Pars colli inferior, pectus & latera albent; quælibet autem penna tæniâ fuſ-

câ undatâ, circumferentiæ parallelâ notatur. Ventrem cooperiunt pennæ pariter albæ, lineolâ fuscâ, versùs ipsarum apicem positâ, & secundùm scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Crurum pars suprema & pennæ caudam subtus obtegentes eleganter albicant. Tectrices alarum inferiores minores sunt candicantes, maculis griseo-fuscis variæ : majores candicantes & immaculatæ. Alarum margines ab articulo carpo humano respondente ad alæ extremitatem usque vestiunt plumulæ griseo-fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores concolores : majores corpori viciniores dilutè griseæ, tæniâ fuscâ undatâ, circumferentiæ parallelâ notatæ, albo marginatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quatuor remiges : decem primores sunt in latere exteriore saturatè, in interiore dilutiùs fuscæ, & scapo donantur candido ; ex istis septem, à quarta scilicet ad decimam usque inclusivè, albo insuper exteriùs marginantur : novem proximè sequen-

étant marquée d'une bande brune en zigzags, parallele à sa circonférence. Le ventre est pareillement couvert de plumes blanches, marquées chacune d'une petite ligne brune, placée vers leur extrémité, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le haut des jambes, & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Les petites du dessous des aîles sont blanchâtres, & variées de taches de gris-brun : les grandes sont blanchâtres & sans taches. Le bord de l'aîle depuis le pli qui répond à celui du poignet, jusqu'à l'extrémité de l'aîle est couvert de petites plumes d'un gris-brun, & bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont d'un gris clair, marquées chacune d'une bande brune en zigzags, parallele à leur circonférence, & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont d'un brun foncé du côté extérieur, d'un brun plus clair du côté intérieur, & ont leur tige blanche ; sept de celles-ci, sçavoir de-

puis la quatriéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont de plus bordées extérieurement de blanc : les neuf ſuivantes, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la dix-neuviéme incluſivement, ſont griſes, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les cinq plus proches du corps ſont griſes, marquées chacune vers leur extrémité d'une bande brune parallele à ſa circonférence, & bordées de blanc vers le bout. Ces cinq dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſque vers la moitié de la longueur de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes griſes, bordées de blanc, & marquées chacune d'une bande d'un gris plus foncé parallele à la bordure. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. On la trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tes, ab undecima ſcilicet ad decimam nonam uſque incluſivè, ſunt griſeæ, in tota circumferentia albo fimbriatæ : quinque corpori viciniores griſeæ, versùs ipſarum extremitatem tæniâ fuſcâ ipſius circumferentiæ parallelâ notatæ, & versùs apicem albo marginatæ. Quæ noviſſimæ quinque remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, mediam versùs caudæ longitudinem extenduntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus griſeis, margine candidâ præditis, & tæniâ ſaturatiùs griſeâ margini parallelâ inſignitis. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 17. LA PETITE MAUBÉCHE GRISE.

Voyez Pl. XX. Fig. 2.

Tringa ſuperne griſea, ſcapis pennarum nigris, infernè nivea ; capite anteriore albo ; tæniâ utrinque à roſtro ad oculos griſeâ ; uropygio dilutè griſeo ; tectricibus alarum ſuperioribus minimis nigricantibus ; rectricibus binis intermediis fuſcis, lateralibus griſeis, omnibus candicante marginatis . . . . CALIDRIS GRISEA MINOR.

Arenaria, i. e. Sanderling aliàs etiam Curwilet Pensantiæ in Cornubia dicta. *Willugh. Ornith. pag.* 225.

Arenaria nostra, id est, Sanderling, aliis Curwillet. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°. A.* 11.

Sanderling de Cornouaille. *Alb. Tom. II. pag.* 48; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 74.

Les Habitans de la Province de Cornouaille l'appellent SANDERLING; CURWILET. *Willugh.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem septem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues septem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata tres lineas; pes undecim cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue novem lineas, extimus octo lineas, & intimus septem cum semi lineas: digito postico caret; quod maximè singulare. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & octo linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres usque lineas ultra caudam

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de sept pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles de sept pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois lignes; son pied onze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes, l'extérieur huit lignes, & l'intérieur sept lignes & demie: elle n'a point de doigt derriere; ce qui est très-singulier. Celui du milieu des trois doigt antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a treize pouces huit lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à trois lignes au-delà du bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col

ſont d'un gris varié de petites taches noires, qui occupent le milieu de chaque plume. Le dos eſt couvert de plumes griſes, dont la tige eſt noire. Les ſcapulaires ſont de la même couleur, & ſont de plus bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, ſont d'un gris clair. Parmi les couvertures du deſſus de la queue, celles qui occupent le milieu, ſont griſes; & celles des côtés ſont blanches. La partie antérieure de la tête, ainſi que ſes côtés au-deſſous des yeux, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un blanc de neige. De chaque côté de la tête eſt une petite bande griſe, qui s'étend depuis l'origine du bec juſqu'aux yeux. Le bord de l'aîle, un peu au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes noirâtres, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont noirâtres: les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur dans leur milieu, & blanches

extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores ſunt griſeæ, minutis variegatæ maculis nigris, uniuſcujuſque pennæ medium occupantibus. Dorſum obtegunt pennæ griſeæ, ſcapo nigro præditæ. Scapulares concolores, ſed albo inſuper marginatæ. Quæ uropygium veſtiunt, ſunt dilutè griſeæ. Ex ſuperioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, griſeæ ſunt; quæ ad latera ſunt poſitæ, candidæ. Caput anteriùs, ſicut & ad latera, idque infra oculos, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes niveo candore nitent. In utroque capitis latere exigua extat tænia griſea, ab exortu roſtri orta, & ad oculos uſque producta. Alarum margines, paulò infra articulum carpo humano reſpondentem, veſtiunt plumulæ nigricantes, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ, iſtæ ſcilicet quæ alæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, nigricant: mediæ, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt in

medio similiter nigricantes, ad margines verò candidæ : majores à corpore remotiores quoque nigricantes, albo marginatæ. Viginti tribus remigibus ala conflatur : quatuor primores nigricant, & scapo donantur candido : sexdecim proximè sequentes, à quinta scilicet ad vigesimam usque inclusivè, sunt in exortu candidæ, versùs extremitatem nigricantes, candore scilicet eò majus spatium occupante, quò remix fit corpori vicinior ; ex istis autem quinque primores, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt insuper albo in apice fimbriatæ ; undecim reliquæ, à decima scilicet ad vigesimam usque inclusivè, albo terminatæ : tres corpori finitimæ fuscæ, albo marginatæ. Tres istæ nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ fuscæ, candicante marginatæ : laterales omnes griseæ, candicante similiter fimbriatæ. Rostrum, pars crurum plumis denu-

sur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & bordées de blanc. L'aîle est composée de vingt-trois plumes : les quatre premieres sont noirâtres, & ont leur tige blanche : les seize suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont blanches à leur origine, & noirâtres vers leur extrémité, le blanc occupant d'autant plus d'espace, que la plume est plus proche du corps ; les cinq premieres de celles-ci, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont de plus bordées de blanc par le bout ; & les onze autres, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont terminées de blanc : les trois plus proches du corps sont brunes, & bordées de blanc. Ces trois dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont brunes, & bordées de blanchâtre : toutes les latérales sont grises, & bordées pareillement de blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles

ſont noirs.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que les plus petites couvertures du deſſus de ſes aîles, & les grandes plumes de l'aîle ſont brunes, tandis que dans le *mâle* elles ſont noirâtres.

Elles ſe tiennent ſur les ſables des bords de la mer; & volent par troupe. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

data, pedes, ungueſque nigri.

Fœmina à *mare* diſcrepat ſuperioribus alarum tectricibus minimis, & remigibus majoribus fuſcis, dum iſtæ pennæ in *mare* nigricant.

In arenoſis locis circa maris littora verſantur; & gregatim volant. *Ex muſeo D. Mauduyt.*

** 18. Le Combattant ou Paon-de-mer.

Voyez Pl. XXII. le mâle Fig. 1, & la femelle Fig. 2.

Tringa verſicolor; (capite anteriore papilloſo; pennis in collo inferiore longiſſimis *mas*); rectricibus lateralibus griſeo-fuſcis . . . . Pugnax.

Tringa facie papillis granulatis minimis carneis; roſtro pedibuſque rubris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 145.

Tringa pedibus rubris, rectricibus tribus lateralibus immaculatis, facie papillis granulatis carneis. Pugnax. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *ſp.* 1.

Avis quædam, quam in Belgio Kemperken, id eſt, Pugnacem vocant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 413. *icones ſatis accuratæ, maris pag.* 414, 415, 417, 418, 419 & 420; *& fœminæ pag.* 416.

Avis pugnax. *Jonſt. Avi. pag.* 105, *maris & fœminæ icones Tab.* 51; *& inſuper quatuor maris icones Tab.* 52, *omnes ab Aldrovando mutuatæ.*

Charlet. Exer. pag. 110. *N°. V.*

Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. V.*

Marſil. Danub. Tom. V. pag. 52. *maris icon ſatis accurata Tab.* 24.

Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 60. *ſp.* 1.

Avis pugnax Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 224. *maris & fœminæ icones ſatis accuratæ Tab. LVI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 107. *N°. A.* 3.

Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 367.

Glareola pugnax. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 10.

Philomachus

Philomachus. *Moehr. Avi. Gen.* 93.

An Ardea Americana, subcastanea, cucullata? *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 18.

Héron étoilé ou blanc. *Alb. Tom. I. pag.* 64; *avec des figures mal coloriées, du mâle Pl.* 72, *& de la femelle Pl.* 73.

Les Allemands l'appellent HAUS-TEUFFEL. *Rzac.*

Les Flamands, KEMPERKEN. *Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Polonois, PTAK BITNY. *Rzac.*

Les Suédois, BRUSHANE. *Linn.* BRAUSZ-HAHN. *Rzac.*

Les Anglois, le mâle, RUFFE. *Willugh. Raj.* RUFF. *Charlet. Alb. & la femelle*, REEVE. *Willugh. Raj. Charlet. Alb.*

Totanum crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem decem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues duodecim pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & quinque lineas longum est; cauda duos pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes unum pollicem & novem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quatuordecim lineas, intimus tredecim lineas; posticus autem quatuor solummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius

Il est à peu près de la grosseur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; sa queue deux pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied un pouce neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au

vout de la queue. La partie antérieure de la tête eſt couverte de petits mammelons charnus & de couleur de chair : la quantité de ces mammelons varie dans les différens individus ; les uns en ont beaucoup, & d'autres en ont fort peu. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont d'un violet foncé très-brillant. La partie ſupérieure du dos eſt couverte de plumes noirâtres, bordées de gris, & variées de grandes taches du même violet foncé que le deſſus du col. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur que celles de la partie ſupérieure du dos. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur plus claire : de plus les plus grandes des couvertures du deſſus de la queue ſont tachées de noirâtre vers leur extrémité. La bâſe du bec eſt entourée de petites plumes d'un blanc ſale & rouſſâtre. La partie inférieure du col eſt couverte de longues plumes d'un violet foncé & brillant, rayées tranſverſalement de roux. La poitrine eſt variée de blanc & de noir mêlé de ce même violet. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de

pedis decem pollicum & ſex linearum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Caput anterius exiguis obſitum eſt papillis carnoſis, carneo colore imbutis : quæ papillæ in variis individuis multùm numero variant ; alia enim magnâ iſtarum papillarum copiâ, alia parvâ donantur. Partes capitis & colli ſuperiores ſunt ſplendidiſſimè ſaturatè violaceæ. Partem dorſi ſupremam veſtiunt pennæ nigricantes, griſeo fimbriatæ, quaſque variegant majuſculæ maculæ eodem imbutæ violaceo ſaturato ac collum ſuperius ipſum tingitur. Scapulares pennis dorſum ſupremum veſtientibus concolores. Dorſum infimum, uropygium, ſuperioreſque caudæ tectrices griſeo-fuſcæ, marginibus pennarum dilutioribus : majores inſuper caudæ tectrices ſuperiores versùs ipſarum extremitatem nigricante maculantur. Baſim roſtri circumdant plumulæ ſordidè albo-rufeſcentes. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ longæ, ſaturatè violaceæ, ſplendentes, rufo tranſverſim ſtriatæ. Pectus albo & nigro

variegatur, cum aliqua in nigro violacei suprà dicti mixtura. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent. Tectrices alarum superiores minores, sicut & majores corpori finitimæ, sunt griseo-fusco imbutæ, colore nonnihil dilutiore fimbriatæ : majores à corpore remotiores fuscæ. Remiges majores similiter fuscescunt : minores, exceptis tamen quatuor corpori finitimis, sunt griseo-fusco colore tinctæ, qui color eò dilutior fit, quò remix fit corpori vicinior : quatuor tandem corpori finitimæ fuscæ, maculis transversis nigricantibus versùs apicem insignitæ. Quæ quatuor novissimè dictæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, nonnihil ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Cauda duodecim conflatur rectricibus griseo-fuscis : binas intermedias variegant maculæ quædam nigricantes. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque grisei ; ungues verò nigricantes. *Ex musæo D. de Bandeville.*

la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, chaque plume étant bordée d'une couleur un peu plus claire : les grandes les plus éloignées du corps sont brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes, excepté les quatre plus proche du corps, sont d'un gris-brun, qui s'éclaircit d'autant plus, que la plume est plus proche du corps : enfin les quatre plus proches du corps sont brunes, & marquées vers leur bout de taches transversales noirâtres. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un gris-brun : les deux du milieu sont variées de quelques taches noirâtres. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont gris ; & les ongles noirâtres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

La *femelle* différe du *mâle* en ce qu'elle n'a point de mammelons charnus à la partie antérieure de la tête, & que les plumes du deſſous de ſon col ne ſont pas plus longues que celles du deſſus. Elle en différe encore par ſes couleurs. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. La partie ſupérieure du dos eſt couverte de plumes dont les unes ſont blanches & les autres brunes; quelques-unes de ces dernieres ſont bordées de rouſſâtre. Les ſcapulaires ſont de même les unes blanches & les autres brunes, dont quelques-unes ſont bordées de rouſſâtre. La partie inférieure du dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes, bordées de rouſſâtre. Parmi les couvertures du deſſus de la queue, celles qui occupent le milieu, ſont brunes; & celles des côtés ſont blanches. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont mêlées de plumes blanches & de plumes brunes: les grandes les plus éloignées du corps ſont toutes brunes. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette

Fœmina à *mare* differt parte capitis anteriore papillis carnoſis nequaquam obſitâ, & pennis collum inferius veſtientibus pennarum collum ſuperius obtegentium longitudinem non excedentibus. Ab illo quoque coloribus diſcrepat. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes albi ſunt coloris. Partem dorſi ſupremam veſtiunt pennæ, quarum aliæ ſunt candidæ, aliæ fuſcæ, quibuſdam ex fuſcis rufeſcente marginatis. Ex ſcapularibus quoque aliæ albicant, aliæ fuſceſcunt; & quædam ex fuſcis rufeſcente fimbriantur. Dorſum infimum & uropygium obtegunt pennæ fuſcæ, marginibus rufeſcentibus prædítæ. Ex ſuperioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum tenent, fuſcæ ſunt; quæ ad latera collocantur, candidæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis conſtant aliis albis, aliis fuſcis: majores à corpore remotiores omnes fuſceſcunt. Remiges alarum majores ſunt eodem fuſco imbutæ: mi-

nores grisèo-fuscæ, albo fimbriatæ; ex istis tamen excipiendæ sunt binæ corpori viciniores penitùs candidæ, & duæ proximè sequentes fuscæ, oris exterioribus rufescentibus præditæ. Caudæ rectrices rectricibus *maris* concolores. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò nigri. *Ex museo Realmuriano.*

Aves istæ multùm colore variant: rarò occurrunt binæ perfectè inter se similes. Plures in *museo Realmuriano* servabantur, mares scilicet & fœminæ, quarum descriptiones hîc subjacent.

Una, quæ *mas*, cujusque descriptionem & iconem dedit *Albinus*, sic coloribus imbuitur. Caput anterius & guttur albicant. Capitis posterior pars & colli superior rufi sunt coloris. Partem colli inferiorem vestiunt pennæ longæ, nigro-violaceæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ rufo & fusco variegantur, majusculis maculis nigro-violaceis admix-

derniere couleur: les moyennes sont d'un gris-brun, & bordées de blanc; il faut cependant en excepter les deux plus proches du corps, qui sont entiérement blanches, & les deux qui les suivent immédiatement, qui sont brunes & bordées extérieurement de roussâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du *mâle*. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

Ces Oiseaux varient beaucoup en couleur: il est difficile d'en trouver deux qui se ressemblent parfaitement. *M. de Reaumur* en conservoit dans son *cabinet* plusieurs mâles & femelles, dont voici les descriptions.

Un *mâle*, qui est celui qu'*Albin* a décrit & figuré, est ainsi coloré. La partie antérieure de la tête & la gorge sont blanchâtres. Le derriere de la tête & le dessus du col sont roux. La partie inférieure du col est couverte de longues plumes d'un noir violet. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de roux & de brun, avec d'assez grandes taches d'un noir-violet. La par-

tie inférieure du dos & le croupion ſont bruns. Les petites couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur : les grandes ſont variées de brun & de roux, terminées par une grande tache de noir-violet, & bordées de roux par le bout ; cependant parmi ces couvertures, les latérales ſont blanches & variées de noir. La poitrine, le haut du ventre & les côtés ſont couverts de plumes noirâtres, bordées de noir-violet. Le bas-ventre eſt blanc, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles. Les couvertures du deſſus des aîles ſont brunes, excepté quelques-unes des plus grandes proche le corps, qui ſont rouſſes, variées de petits points bruns, & terminées par une tache d'un noir-violet. Quelques-unes des plumes de l'aîle, ſçavoir les plus proches du corps, ſont colorées comme ces dernieres couvertures : toutes les autres, ainſi que les plumes de la queue, ſont de la même couleur que dans le *mâle* que j'ai décrit ci-deſſus. Le bec eſt rouge, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges ; & les ongles noirs.

tis. Dorſum infimum & uropygium fuſca ſunt. Superiores caudæ tectrices minores concolores : majores fuſco & rufo variæ, majuſculâ maculâ nigro-violaceâ terminatæ, & rufo in apice fimbriatæ ; ex iſtis tamen tectricibus, quæ ad latera poſitæ ſunt, albent, nigroque variegantur. Pectus, ventrem ſupremum & latera obtegunt pennæ nigricantes, marginibus nigro-violaceis prædítæ. Venter imus, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus cooperientes albicant. Tectrices alarum ſuperiores ſunt fuſcæ ; ex illis tamen majores quædam corpori finitimæ rufæ, punctulis fuſcis variegatæ, & maculâ nigro-violaceâ terminatæ. Ex remigibus quædam, corpori ſcilicet viciniores, noviſſimis iſtis tectricibus concolores : reliquæ omnes, ſicut & caudæ rectrices, eodem imbuuntur colore ac in *mare* à me ſuprà deſcripto. Roſtrum rubrum, excepto apice nigricante. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri ; ungues verò nigri.

Alia, quæ *mas*, quæque ab Aldrovando quarto loco delineatur, cum priori, cujus descriptionem dedi, convenit, cum sequentibus tamen differentiis. Pennæ longæ collum inferius obtegentes rufescunt. Dorsum multò magis variegat color niger, qui color nonnihil ad violaceum inclinat. In superioribus alarum tectricibus quædam extant maculæ nigricantes. Quatuor remiges corpori viciniores, sicut & binæ rectrices intermediæ, maculis transversis griseo-rufescentibus insigniuntur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri; ungues verò nigri.

Autre *mâle*, qui est le quatriéme d'*Aldrovande*. Il ressemble au premier que j'ai décrit, cependant avec ces différences. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont roussâtres. Le dos est varié de beaucoup plus de noir, cette couleur tirant un peu sur le violet. Sur les couvertures du dessus des aîles sont quelques taches noirâtres. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, ainsi que les deux plumes du milieu de la queue, sont marquées de taches transversales d'un gris-roussâtre. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges; & les ongles noirs.

Altera, quæ *mas*, priori à me descripto adhuc respondet, sequentibus differentiis exceptis. Partes capitis & colli superiores sunt rufæ. Pennæ longæ collum inferius vestientes candidæ. Pars dorsi suprema & scapulares pennæ multo variegantur rufo. Remiges quatuor corpori finitimæ & binæ rectrices intermediæ maculis transversis rufis notantur. Rostrum rubrum, exceptâ extremitate nigricante. Pars

Autre *mâle*, qui ressemble encore au premier que j'ai décrit, avec ces différences. Les parties supérieures de la tête & du col sont rousses. Les longues plumes de la partie inférieure du col sont blanches. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de beaucoup de roux. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, & les deux plumes du milieu de la queue sont marquées de taches transversales rousses. Le bec est rouge, ex-

cepté ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges; & les ongles noirs.

Autre *femelle*. La tête, la gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs: le deſſus de la tête eſt cependant varié d'un peu de brun; de plus le ventre, les côtés & le haut des jambes ſont variés d'un fauve ſur lequel ſont de petites taches noirâtres. La partie ſupérieure du dos eſt couverte de plumes, les unes brunes, & les autres fauves, ces dernieres étant variées de taches noirâtres, dont les unes ſont tranſverſales & les autres irrégulieres. La partie inférieure du dos & le croupion ſont couverts de plumes fauves, rayées tranſverſalement de noir. Parmi les couvertures du deſſus de la queue, celles qui occupent le milieu, ſont variées de brun, de gris & de fauve, cette derniere couleur étant elle-même variée de taches noires; celles des côtés de la queue ſont d'un blanc mêlé d'un peu de fauve: celles du deſſous ſont d'un fauve clair, & marquées chacune vers leur extrémité d'une petite ligne longitudinale brucrurum plumis denudata, pedeſque rubri coloris; ungues verò nigri.

Altera, quæ *fœmina*. Caput, guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, alarumque tectrices inferiores candore nitent: caput tamen ſuperius pauco variegatur fuſco; venter inſuper, latera & crurum pars ſuprema fulvo variegantur; qui color fulvus minutis maculis nigricantibus aſpergitur. Dorſum ſupremum veſtiunt pennæ aliæ fuſcæ, alteræ fulvæ; quæ noviſſimæ maculis variegantur nigricantibus, aliis ſcilicet tranſverſis, aliis irregularibus. Pennæ dorſum infimum & uropygium obtegentes ſunt fulvæ, nigro tranſverſim ſtriatæ. Ex ſuperioribus caudæ tectricibus, quæ medium locum obtinent, ſunt fuſco, griſeo & fulvo variegatæ, fulvo ipſo colore maculis nigris vario: quæ ad caudæ latera poſitæ ſunt, albicant, cum aliqua fulvi mixtura. Pennæ caudam ſubtus obtegentes dilutè fulvæ, lineolâ longitudinali fuſcâ versùs ipſarum extremitatem inſignitæ. Tectrices

trices alarum superiores minores, sicut & majores corpori viciniores, pennis scapularibus concolores : majores à corpore remotiores penitùs fuscæ. Remiges majores pariter fusceſcunt : minores sunt griseæ, fusco in latere interiore, fulvo & nigricante in exteriore variæ, & exteriùs insuper fulvo fimbriatæ : ex remigibus autem corpori vicinioribus, quæ majorem obtinet longitudinem, ab exortu ad apicem fulva est & nigricante maculata. Caudæ rectrices eodem imbuuntur colore ac rectrices prioris *maris* à me descripti ipsæ tinguntur, cum aliqua tamen differentia ; tres enim utrinque extimæ nigricante in latere exteriore maculantur. Rostrum rubrum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque similis rubri sunt coloris ; ungues verò nigri.

Præter suprà dictas, *Aldrovandus* sex alias descripsit & delineavit, *mares* scilicet quinque & *fœminam* unam.

Prioris, quæ *mas*, caput, pars colli superior, dorsum, venter supremus & crurum pars suprema ex rufescente

ne. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que les plumes scapulaires : les grandes les plus éloignées du corps sont entiérement brunes. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes sont grises, variées intérieurement de brun, extérieurement de fauve & de noirâtre, & bordées aussi extérieurement de fauve : de plus parmi les plus proches du corps la plus longue est entiérement fauve & tachetée de noirâtre. Les plumes de la queue sont de la même couleur que celles de la queue du premier *mâle* que j'ai décrit, avec cette différence cependant que les trois plus extérieures de chaque côté sont tachées de noirâtre sur leur côté extérieur. Le bec est rouge, excepté son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont pareillement rouges ; & les ongles noirs.

Outre ceux-ci, *Aldrovande* en a encore décrit & figuré six autres, sçavoir cinq *mâles* & une *femelle*.

Le premier qui est un *mâle*, a la tête, la partie supérieure du col, le dos, le haut du ventre & le haut des jambes d'un

roussâtre tirant sur le marron, & varié de taches transversales noires. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le bas-ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanchâtre tirant sur le cendré, & varié de taches noires oblongues, & tendant vers le bas. Les couvertures du dessus des aîles & les plumes de l'aîle sont d'un roussâtre tirant sur le marron, & varié de même de taches noires, qui sont rondes sur les couvertures, & transversales sur les plumes de l'aîle. La tête est ornée d'une espece de hupe. Le bec est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirs.

Le second, qui est encore un *mâle*, est hupé, comme le précédent. Le synciput & l'occiput sont blancs, ainsi que les longues plumes de la partie inférieure du col. Sous la gorge est une tache noirâtre. Le ventre est de cette derniere couleur. Tout le reste de son corps est d'un blanc sale ou rembruni. Le bec est noir, excepté à son origine, où il est blanc. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns.

Le troisiéme, qui est une *femelle*, est presque par tout le

ad castaneum vergunt, & maculis transversis nigris variegantur. Guttur, collum inferius, pectus, venter imus & inferiores caudæ tectrices ex candicante ad cinereum inclinant, & maculis variegantur nigris, oblongis, deorsum tendentibus. Superiores alarum tectrices, sicut & remiges, sunt ex rufescente ad castaneum vergentes, maculis pariter variegatæ nigris, supra tectrices rotundis, supra remiges verò transversis. Caput quodammodo cristâ ornatur. Rostrum nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò nigri.

Secunda, quæ quidem *mas*, cristam gestat, ut præcedens. Synciput & occiput, longæque pennæ collum inferius obtegentes albicant. Sub gutture macula extat nigricans. Venter similiter nigricat. Totum reliquum corpus sordidè albet aut ex albo fuscescit. Rostrum nigrum, attamen in exortu candidum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusci.

Tertio loco depicta, quæ *fœmina*, in universo ferè

corpore est rufa, maculis nigris lunulatis aspersa, attamen in capitis vertice immaculata. Crurum suprema pars & venter imus ad castaneum inclinant. Remiges alarum majores sunt nigræ, colore croceo fimbriatæ & terminatæ. Oculorum irides simili croceo imbutæ; ipsorum verò pupilla nigra.

Quinta, quæ *mas*, coloribus multùm convenit cum *mari* tertio à me descripto, quique quarto loco ab *Aldrovando* delineatur; ab illo tamen discrepat in eo quod longæ pennæ collum inferius vestientes sint candidæ, nigro terminatæ.

Sexta, quæ pariter *mas* est, præcedentis instar, in collo inferiore longis donatur pennis candidis, nigro terminatis; sed ab illo discrepat coloribus quibus reliquum corpus imbuitur. Caput ex cinereo-flavicat; attamen in vertice pennis vestitur nigris. Guttur candidum. Totum reliquum corpus fuscum, exceptis tamen crurum parte suprema, caudâque ex rufo ad castaneum vergentibus. Oculorum irides croceo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata,

corps d'un roux parsemé de taches noires, en forme de croissant, excepté sur le sommet de la tête, qui est sans taches. Le haut des jambes & le bas-ventre tirent sur le marron. Les grandes plumes de l'aîle sont noires, bordées & terminées de couleur de safran. L'iris des yeux est de cette derniere couleur; leur prunelle est noire.

Le cinquiéme qui est un *mâle*, ressemble beaucoup par ses couleurs au troisiéme *mâle* que j'ai décrit, & qui est le quatriéme d'*Aldrovande*; il en différe cependant en ce que les longues plumes du dessous de son col sont blanches & terminées de noir.

Le sixiéme qui est pareillement un *mâle*, a comme le précédent, les longues plumes du dessous du col blanches & terminées de noir; mais il en différe par les couleurs du reste de son corps. Sa tête est d'un cendré-jaunâtre, excepté son sommet, qui est couvert de plumes noires. Sa gorge est blanche. Tout le reste de son corps est brun, si l'on en excepte le haut des jambes & la queue, qui sont d'un roux tirant sur le marron. L'iris des yeux est de couleur de safran. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les

pieds & les ongles ſont bruns.

Le ſeptiéme enfin qui eſt encore un *mâle*, a la tête jaune. Tout le reſte de ſon corps eſt couvert de plumes dont les unes ſont vertes, d'autres ſont blanches, d'autres rouges, d'autres d'un violet d'Amethyſte, & d'autres jaunes : & ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt qu'aucune de ces plumes n'eſt mêlée de deux couleurs. La partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunes.

On les trouve aux bords de la mer.

pedes, ungueſque fuſci.

Septima tandem, quæ ſimiliter *mas*, caput habet luteum. In toto reliquo corpore pennis veſtitur aliis viridibus, aliis candidis, aliis rubris, aliis violaceo-Amethyſtinis, aliis luteis : quodque maximè ſingulare, nulla penna binis coloribus immiſcetur. Pars crurum plumis denudata, pedeſque lutei ſunt.

Juxta maris littora verſantur.

** 19. Le Merle-d'eau.

Tringa ſuperne fuſco-nigricans; genis, gutture, collo inferiore & pectore niveis ; ventre ſupremo fuſco-rufeſcente; imo ventre, rectricibuſque nigricantibus . . . . Merula aquatica.

Trynga. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. IX.*
Merula aquatica. *Geſn. Avi. pag.* 608. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 609.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 302.
Jonſt. Avi. pag. 112. *hujus icon à Geſnero mutuata Tab.* 53.
Willugh. Ornith. pag. 104. *hujus icon minùs accurata Tab. XXIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 66. *N°. A.* 7.
Charlet. Exer. pag. 113. *N°. XII.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. XII.*
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 82. *ſp.* 3.
Merula aquatica, vel rivalis. *Geſn. icon. Avi. pag.* 123, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Merula aquatica Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 485. *hujus icon minùs accurata pag.* 486.
Turdus aquaticus. *Geſn. Avi. pag.* 501.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 487.

Klein. Avi. pag. 68. *N°.* 18.

An Gallinulæ aquaticæ ſpecies ? *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 559, *in qua hujus icon minùs accurata.*

Cornix aquatica. *Geſn. Avi. pag.* 333.

Sturnus niger, pectore albo. Cinclus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 94. *ſp.* 4.

Motacilla pectore albo, corpore nigro. *Faun. Suec. Linn. N°.* 216.

Merle d'eau. *Alb. Tom. II. pag.* 26 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 39.

Les Grecs l'appellent Κότυφος ἔνυδρος. *Schwenck.*

Les Italiens aux environs de Belinzone, Lerlichirollo. *Geſn. Aldrov.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, Folot *ou* Falunt d'acqua. *Geſn. Aldrov.*

Les Allemands Wasser-Amsel. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Willugh.* Bach-Amsel. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Jonſt.* See-Amsel. *Schwenck.*

Les Suiſſes, Wasser-Trostle. *Geſn.*

Les Suédois, Watn-Stare. *Linn.*

Les Anglois, Water-Ouzel. *Willugh. Raj.* Water-Crake. *Raj.*

Merulæ vulgari paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam ſeptem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque decem lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue decem lineas, extimus octo cum ſemi lineas, intimus ſeptem lineas ; & poſticus quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ferè ad primum uſque articulum ex-

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros qu'un *Merle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de ſept pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a dix lignes de long ; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre lignes; ſon pied un pouce ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, dix lignes, l'extérieur huit lignes & demie, l'intérieur ſept lignes; & celui de derriere quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend preſque

juſqu'à la premiere articulation. Il a onze pouces neuf lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'à la moitié de la longueur de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont d'un brun foncé. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un brun-noirâtre. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont d'un blanc de neige. Le haut du ventre eſt d'un brun tirant ſur le roux. Le bas-ventre, les couvertures du deſſous de la queue, le haut des jambes & les côtés ſont noirâtres. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un brun foncé. L'aîle eſt compoſée de dix-huit plumes d'un brun-noirâtre. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres, à peu près d'égale longueur. Les paupieres ſont blanches. L'iris des yeux eſt de couleur de noiſette. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirâtres.

tenſâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt undecim pollicum & novem linearum ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem pertingunt. Partes capitis & colli ſuperiores tingit color fuſcus ſaturatus. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes, & ſuperiores caudæ tectrices ex fuſco nigricant. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ, guttur, pars colli inferior & pectus niveo candore nitent. Venter ſupremus ex fuſco ad rufum inclinat. Venter imus, inferiores caudæ tectrices, crurum ſuprema pars & latera nigricant. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt ſaturatè fuſcæ. Alam componunt octodecim remiges fuſco-nigricantes. Corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus, nigricantibus, æqualem circiter longitudinem obtinentibus. Palpebræ ſunt candidæ. Oculorum irides avellaneæ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri.

Juxta fluviorum ripas versatur, ibique *Piscículis* & *Insectis aquaticis* victitat. Sub aquis quandoque mergit. Solitaria est, & pariendi tantùm tempore cum fœmina volat. *Ex musæo Realmuriano.*

gles sont noirs. On le trouve sur le bord des rivieres, où il se nourrit de petits *Poissons* & d'*Insectes aquatiques*. Il plonge quelquefois sous l'eau. Il est solitaire, & ne s'associe qu'avec sa femelle, & cela dans le temps de l'amour. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

20. La Grive-d'eau.

Tringa supernè rufescente-olivacea, infernè alba, supernè & infernè maculis nigricantibus varia; tæniâ supra oculos candidâ; fasciâ duplici in alis transversâ albâ; rectricibus binis intermediis rufescente-olivaceis, tæniâ transversâ fuscâ in apice notatis, lateralibus albis, nigricante transversim striatis . . . . TURDUS AQUATICUS.

Tringa tacheté. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 139. *Chap. LXVII; avec une figure exacte Pl.* 277. (*fig. inférieure*).
Les Anglois l'appellent SPOTTED TRINGA. *Edwards.*

Cum *Turdo minori* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem septem pollices & novem circiter lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duodecim cum semi lineas longum est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes undecim cum semi lineas; trium

Elle est à peu près de la grosseur de la *petite Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ sept pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de huit pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; sa queue un pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre lignes; son pied onze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts anté-

rieurs, joint avec l'ongle, neuf lignes & demie, l'extérieur huit lignes, l'intérieur ſept lignes; & celui de derriere trois lignes & demie ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La tête, le deſſus du col & le dos ſont couverts de plumes d'un rouſſâtre tirant ſur l'olivâtre, marquées chacune dans leur milieu d'une tache noirâtre : ces taches ſont fort petites ſur la tête, & vont enſuite en augmentant de grandeur juſque ſur le dos, où ſont les plus grandes. Les plumes ſcapulaires ſont auſſi d'un rouſſâtre tirant ſur l'olivâtre, & variées de taches tranſverſales noirâtres. Celles qui couvrent le croupion, ainſi que les couvertures du deſſus de la queue, ſont du même rouſſâtre & ſans taches. De chaque côté de la tête eſt une petite bande blanche, qui s'étend au-deſſus des yeux. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont

digitorum anticorum medius cum ungue novem cum ſemi lineas, extimus octo lineas, intimus ſeptem lineas; poſticus autem tres tantùm cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alæ complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Caput, partem colli ſuperiorem, dorſumque veſtiunt pennæ ex rufeſcente ad olivaceum inclinantes, maculâ nigricante in medio inſignitæ : quæ maculæ in capite valdè ſunt exiguæ, deinde versùs dorſum procedendo, ſenſim atque ſenſim majorem obtinent magnitudinem, & in dorſo majores fiunt. Scapulares pennæ ex rufeſcente quoque ad olivaceum vergunt, maculiſque tranſverſis nigricantibus variegantur. Quæ uropygium obtegunt, ſicut & ſuperiores caudæ tectrices, ſunt eodem rufeſcente tinctæ & immaculatæ. In utroque capitis latere exigua extat tænia candida, ſupra oculos protenſa. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema

pars,

pars, inferioresque caudæ tectrices albent, & maculis nigricantibus variegantur : quæ maculæ in pectore majores sunt quàm in aliis prædictis partibus, & paululùm cordatim emarginatæ. Pennæ alas subtus cooperientes albæ, tæniâ transversâ nigricante notatæ. Alarum margines albicant. Superiores alarum tectrices minores sunt ex rufescente ad olivaceum vergentes, maculis transversis nigricantibus variæ : majores corpori finitimæ concolores, sed albo terminatæ : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges majores nigricant; ex istis autem intimæ albo in apice marginantur : mediæ sunt nigricantes, albo terminatæ; quæ albedo cum tectricum albore in utraque ala duplicem tæniam transversam concolorem efficit : attamen excipiendæ sunt tres quatuorve remiges corpori viciniores ex rufescente ad olivaceum inclinantes, in utroque latere tæniis obliquis nigricantibus insignitæ. Quæ noviſſimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum re-

blancs, & variées de taches noirâtres : ces taches sont plus grandes sur la poitrine que partout ailleurs, & sont un peu taillées en cœur. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & marquées d'une bande transversale noirâtre. Le bord de l'aîle est blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un roussâtre tirant sur l'olivâtre, & variées de taches transversales noirâtres : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur, mais elles sont terminées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres, & de celles-là les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout : les moyennes sont noirâtres & terminées de blanc; ce qui avec le blanc des couvertures forme sur chaque aîle deux bandes transversales de cette couleur : il faut cependant excepter les trois ou quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps, qui sont d'un roussâtre tirant sur l'olivâtre, & marquées des deux côtés de rayes obliques noirâtres. Ces dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est

pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un rouſſâtre tirant ſur l'olivâtre, & marquées vers leur extrémité d'une bande tranſverſale brune : les latérales ſont blanches, & rayées tranſverſalement de noirâtre. Les deux plumes du milieu de la queue ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt de couleur de chair depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur, & de là juſqu'à ſon extrémité il eſt brun. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un couleur de chair obſcur ; & les ongles noirs. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'*Europe* & de l'*Amérique*.

migum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat : binæ intermediæ rufeſcente-olivaceæ, tæniâ tranſversâ fuſcâ versùs apicem notatæ : laterales albæ, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Binæ rectrices intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales autem gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Roſtrum ab ipſius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque carneo colore imbutum, inde ad extremitatem fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque obſcurè carneo colore tincti ; ungues verò nigri. Habitat in *Europæ* & *Americæ* Septentrionali regione.

21. LE CANUT.

Tringa ſuperne cinereo-fuſca, marginibus pennarum dilutioribus, infernè alba, maculis nigricantibus varia ; tæniâ ſupra oculos candidâ ; faſciâ in alis tranſversâ albâ ; uropygio albo & cinereo-fuſco lunulatim variegato ; rectricibus decem intermediis cinereo-fuſcis, utrinque extimâ candidâ . . . . CANUTUS.

Tringa cinerea, remigibus ſecundariis baſi totaliter albis, rectricibus quatuor mediis immaculatis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 150.

Tringa roſtro lævi, pedibus cineraſcentibus, remigibus primoribus ſerratis. Canutus. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 78. *Sp.* 10.

Chalidris cinerea. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°.* 1.
Calidris cinerea. *Charlet. Onomazt. pag.* 107. *N°.* 1.
Canuti Avis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 60. *sp.* 6.
Canuti Avis, id est, Knot Lincolnienſibus. *Raj. Syn. Avi. pag.* 108. *N°. A.* 5.
Knot agri Lincolnienſis. *Willugh. Ornith. pag.* 224. *hujus icon minimè accurata Tab. LVI, ſub titulo*, Callydris nigra.
Canut. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 137. *Chap. LXVI; avec une figure exacte Pl.* 276.
Les Anglois, & ſur-tout ceux qui habitent la Province de Lincoln, l'appellent KNOT. *Willugh. Raj. Charlet.*

Calidrim cineream craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam novem pollices & ſex circiter lineas explet, & ad extremos ungues decem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duodecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata ſex cum ſemi lineas; pes duodecim cum ſemi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue undecim lineas, extimus novem lineas, intimus octo lineas; poſticus autem binas tantùm cum ſemi lineas. Digiti omnes ſunt ad exortum uſque à ſe invicem diſcreti. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ ferè pertingunt. Partes capitis & colli ſuperiores, ſicut & dorſi ſupremam, veſtiunt pennæ cinereo-fuſcæ, colore nonnihil dilu-

Il eſt à peu près de la groſſeur de la *Maubéche griſe*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ neuf pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a douze lignes & demie de long; ſa queue deux pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſix lignes & demie; ſon pied douze lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, onze lignes, l'extérieur neuf lignes, l'intérieur huit lignes; & celui de derriere deux lignes & demie ſeulement. Tous les doigts ſont ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête, du col & du dos ſont couvertes de plumes d'un cendré-brun, bordées

d'une couleur un peu plus claire. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ainſi que les couvertures du deſſus de la queue, ſont variées de blanc & de cendré-brun par taches tranſverſales, & qui ont la forme d'un croiſſant. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend par-deſſus les yeux : au-deſſous de celle-là en eſt une autre d'un brun foncé, qui part de même d'auprès de l'origine du bec, & s'étend juſqu'à l'œil. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont blanches, & variées de petites taches brunes. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont du même blanc, & marqués de taches tranſverſales noirâtres. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches & ſans taches. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les plumes du dos ; mais les grandes ſont terminées de blanc ; ce qui forme ſur chaque aile une bande tranſverſale de cette couleur : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées

tiore marginatæ. Scapulares concolores. Quæ dorſi partem infimam & uropygium obtegunt, ſuperioreſque caudæ tectrices albo & cinereo-fuſco variegatæ, duobus iſtis coloribus maculas tranſverſas lunulatas efficientibus. In utroque capitis latere tænia extat candida, prope roſtri exortum orta, & ſupra oculos protenſa : infra quam tæniam altera adeſt faſcia ſaturatè fuſca, prope roſtri exortum pariter orta, & ad oculum uſque producta. Guttur, collum inferius & pectus albicant, eaque variegant minutæ maculæ fuſcæ. Venter, latera, crurum ſuprema pars & tectrices caudæ inferiores eodem albore nitent, & maculis tranſverſis nigricantibus variegantur. Pennæ alas ſubtus obtegentes albæ ſunt & immaculatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis dorſum veſtientibus concolores ; majores verò albo terminantur ; quæ albedo in utraque ala tæniam tranſverſam concolorem efficit : majores à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges quatuor pri-

Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Beccaßeau ou Cul-blanc.

2. Guignette.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Chevalier. 2. Chevalier cendré.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6

Echelle de 6. Pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Chevalier rayé.

2. Chevalier tacheté.

Dessine et Grave par Martinet.

1. Alouette-de-mer.

2. Alouette-de-mer à collier.

Fig. 2.

Fig. 1.

Dessinée et Gravée par Martinet.

1. Maubéche.

2. Petite Maubéche grise.

Fig. 1.

Fig. 2.

1" 2 3

Echelle de 3. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Maubéche tacheteé.

2. Maubéche grise.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Combattant ou Paon-de-mer, mâle.

2. Combattant ou Paon-de-mer, femelle.

mores nigricant, & scapo donantur candido : quinque proximè sequentes, à quinta scilicet ad nonam usque inclusivè, sunt nigricantes, exteriùs albo marginatæ : quatuor quæ sequuntur, à decima scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, cinereo-fuscæ, albo in apice tantùm marginatæ : reliquæ omnes similiter cinereo-fuscæ, sed griseo fimbriatæ. Cauda duodecim conflatur rectricibus, quarum decem intermediæ sunt cinereo-fuscæ : utrinque extima candida. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum saturatissimo fusco imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusco-virideſcentes. Facilè pingueſcit hæc Avis, & in cibis est delicatissima. Habitat in *Angliæ* Septentrionalibus Provinciis.

de blanc par le bout. Les quatre premieres plumes de l'aîle sont noirâtres, & ont leur tige blanche : les cinq suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont noirâtres, & bordées extérieurement de blanc : les quatre qui suivent, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la treiziéme inclusivement, sont d'un cendré-brun, & bordées de blanc seulement par le bout : toutes les autres sont pareillement d'un cendré-brun, mais elles sont bordées de gris. La queue est composée de douze plumes : les dix du milieu sont d'un cendré-brun : & la plus extérieure de chaque côté est blanche. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est d'un cendré très-foncé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un brun-verdâtre. Cet Oiseau s'engraisse aisément, & est très-bon à manger. On le trouve dans les Provinces Septentrionales d'*Angleterre.*

LXXVI.

Genus Limosæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti ; tres scilicet antici, posticus unus :

LXXVI.

Le genre de la Barge.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec menu, très-long, plutôt recourbé en en-haut que droit, & dont le bout eſt obtus & liſſe.

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Roſtrum gracile, longiſſimum, ſubrectum, ſurſum modicè tendens ; ipſius apice obtuſo & levi.

** 1. La Barge.

Limoſa ſuperne griſeo-fuſca, pennis nigricantibus, ad margines maculis rufis variegatis, interſertis, infernè alba ; gutture albo-rufeſcente ; collo griſeo & rufeſcente vario, lineolis longitudinalibus fuſcis in ima parte notato ; pectore griſeo-candicante, tæniis tranſverſis fuſcis variegato ; uropygio fuſco ; rectricibus in exortu albis, in extremitate nigris, octo intermediis apice griſeis, tribus utrinque lateralibus albo in apice marginatis . . . . Limosa.

Numenius uropygio albo ; rectricibus nigris baſi albis ; remigibus tranſversâ albâ maculâ, exceptis quatuor primis. *Faun. Suec. Linn.* N°. 144.

Numenius medius. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *ſp.* 3.

Scolopax roſtro recto lævi, pedibus fuſcis, remigibus maculâ albâ : quatuor primis immaculatis. Limoſa. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 10.

Scolopax, Ruſticola Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 100. N°. 5.

An Elaphis? *Geſn. Avi. pag.* 383.

Totanus cinereus, roſtro prælongo. *Barr Ornith. Claſſ. IV. Gen. IV. ſp.* 1.

Totanus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 431. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 430.

Jonſt. Avi. pag. 108. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 52.

Moehr. Avi. Gen. 88.

Fedoa ſecunda, quæ eadem eſſe videtur cum Totano Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 216. *hujus icon non ſatis accurata Tab. LIII, ſub titulo*, Fedoa altera ; *& inſuper altera icon ab Aldrovando mutuata eâdem Tab. ſub titulo*, Totanus.

Fedoa noſtra ſecunda, ſeu Totanus Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. N°. *A.* 5.

Gallinago cinerea major. *Marſil. Danub. Tom. V. Mas pag.* 30 ; *cum hujus icone non ſatis accurata Tab.* 13, *& fœmina pag.* 32 ; *cum hujus icone non ſatis accurata Tab.* 14.

Barge Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434. *hujus icon pessima pag.* 436.

Barge Gallorum, quam Ægocephalum facit Bellonius. *Jonst. Avi. pag.* 106.

Charlet. Exer. pag. 111. *N°. X.*

Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. X.*

Barge. *Bel. Hist. nat. des Ois. pag.* 205; *avec une mauvaise figure pag.* 206.

Bel. Portr. d'Ois. pag. 48 *a*, *dans laquelle est la même figure.*

Les Grecs l'appellent Αἰγοκέφαλος. *Bel. Aldrov.*

Les Catalans, BEC-LLARG. *Barr.*

Les Italiens, CHARLOT. *Gesn. Aldrov.*

Les Vénitiens, VETOLA. *Willugh.*

Les Payſans Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*

Les Anglois, GOAT-HEAD. *Charlet.* GODWIT *ou* STONE-PLOVER. *Raj.*

Craſſitie *Totanum* multùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quindecim pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem & ſeptem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & ſex lineas longum eſt; cauda duos pollices & quinque lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem & novem lineas; pes duos pollices cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus ſexdecim lineas, intimus quindecim lineas; poſticus autem quinque tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranulâ ad pri-

Elle eſt beaucoup plus groſſe que le *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied ſept pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces ſix lignes de long; ſa queue deux pouces cinq lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce neuf lignes; ſon pied deux pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur ſeize lignes, l'intérieur quinze lignes; & celui de derriere cinq lignes ſeulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds de

vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. La bâſe du bec eſt entourée de petites plumes d'un blanc ſale & rouſſâtre. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de petites plumes qui ſont d'un brun foncé dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige, & rouſſes ſur leurs bords. Les côtés de la tête, au-deſſous des yeux, ou les joues ſont rouſſâtres. La gorge eſt d'un blanc mêlé d'une très-légere teinte de rouſſâtre. Le col eſt varié de gris & de rouſſâtre, & marqué vers le bas de ſa partie inférieure de petites lignes longitudinales brunes. La partie ſupérieure du dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un gris-brun, le tout étant mêlé de quelques plumes noirâtres, variées ſur leurs bords de grandes taches rouſſes. La partie inférieure du dos & le croupion ſont bruns. Les couvertures du deſſus de la queue ſont blanches ; les plus grandes cependant ſont terminées de noirâtre. La poitrine eſt d'un gris-blanchâtre, varié de bandes tranſverſales brunes. Le haut des côtés eſt d'un gris clair. Le bas des côtés, le ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſ-

mum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Baſim roſtri ambiunt plumulæ ſordidè albo-rufeſcentes. Capitis ſuperior pars plumulis veſtitur in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ſaturatè fuſcis, ad margines rufis. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ rufeſcunt. Guttur abicat, & aliquid rufeſcentis admixtum habet. Collum griſeo & rufeſcente varium, lineolis longitudinalibus fuſcis versùs colli inferioris imam partem inſignitum. Dorſi ſuprema pars & ſcapulares pennæ ſunt griſeo-fuſcæ, pennis quibuſdam nigricantibus ; ad margines majuſculis maculis rufis variegatis, interſertis. Dorſum infimum & uropygium fuſca ſunt. Superiores caudæ tectrices candidæ ; ex iſtis tamen majores nigricante terminantur. Pectus eſt griſeo-candicans, tæniis tranſverſis fuſcis varium. Laterum ſuprema pars dilutè griſea. Laterum pars infima, venter & crurum pars

ſuprema

suprema albicant. Tectrices caudæ inferiores concolores, maculis quibusdam nigricantibus variæ. Pennæ alas subtus obtegentes pariter candidæ, exceptis tamen minimis, illis scilicet quæ secundùm alarum marginum longitudinem positæ sunt, fuscis, albo fimbriatis. Superiores alarum tectrices minimæ, illæ scilicet quæ alæ articulum carpo humano respondentem obtegunt, fuscæ: mediæ, sicut & majores corpori viciniores, griseo-fuscæ, majoribus inter noviſſimas istas albido marginatis: majores à corpore remotiores nigricantes, apicibus albis præditæ. Alam componunt viginti septem remiges, quarum primores quatuor nigricantes, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque in latere interiore maximâ parte candidæ, & scapo versùs ipsarum extremitatem usque albo præditæ: novem proximè sequentes, à quinta scilicet ad decimam tertiam usque inclusivè, ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albæ, à medietate ad apicem nigricantes: tres quæ proximè sequun-

sous de la queue sont de la même couleur, & variées de quelques taches noirâtres. Celles du dessous des aîles sont pareillement blanches, si l'on en excepte les plus petites, sçavoir celles qui sont tout le long du bord de l'aîle, qui sont brunes & bordées de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des aîles, sçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, sont brunes: les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont d'un gris-brun, les plus grandes de ces dernieres étant bordées de blanchâtre: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & terminées de blanc. L'aîle est composée de vingt-sept plumes: les quatre premieres sont noirâtres, & ont la plus grande partie de leur côté intérieur blanche, & cela depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur; elles ont aussi leur tige blanche jusque vers leur extrémité: les neuf suivantes, sçavoir depuis la cinquiéme jusqu'à la treiziéme inclusivement, sont blanches depuis leur origine jusque vers la moitié de leur longueur, & de-là jusqu'à leur extrémité elles sont noirâtres: les trois qui suivent immédiatement ces dernieres,

ſçavoir depuis la quatorziéme juſqu'à la ſeiziéme incluſivement, ſont blanches depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur, le reſte eſt d'un brun-noirâtre & bordé de blanc : la dix-ſeptiéme & la dix-huitiéme ſont blanches, excepté leur bout, qui eſt d'un brun-noirâtre, bordé & terminé de blanc : les trois ſuivantes, ſçavoir depuis la dix-neuviéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont blanches, & marquées chacune d'une grande tache brune, placée à leur extrémité ſur le côté intérieur : enfin les ſix plus proches du corps ſont d'un gris-brun. Ces ſix dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La premiere des plumes de l'aîle eſt la plus longue de toutes. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches à leur origine, & noires vers leur extrémité : le blanc occupe d'autant plus d'eſpace, que la plume eſt plus extérieure ; de ſorte que les deux du milieu n'ont que fort peu de blanc ; dans les autres plumes cette couleur s'étend de plus en plus loin, de façon que la plus extérieure de chaque côté eſt blanche juſque vers les trois

tur, à decima quarta ſcilicet ad decimam ſextam uſque incluſivè, ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque candidæ, in reliqua longitudine fuſco-nigricantes, albo fimbriatæ : decima ſeptima & decima octava albæ, excepto apice fuſco-nigricante, albo marginato & terminato : tres ſequentes, à decima nona ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, candidæ, majuſculâ maculâ fuſcâ, ad extremitatem in latere interiore poſitâ, notatæ : ſex tandem corpori viciniores griſeo-fuſcæ. Sex iſtæ noviſſimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Remix prima reliquarum omnium longitudinem ſuperat. Cauda duodecim conſtat rectricibus in exortu albis, in extremitate nigris : albus autem color eò majus ſpatium occupat, quò rectrix exterior fit ; ita ut in binis intermediis non multùm ſit alboris ; in aliis verò rectricibus albor magìs magìſque protenditur, ita ut utrinque extima versùs tres quartas longitudinis partes

usque sit candida : binæ intermediæ sunt insuper grisco terminatæ ; tres utrinque proximè sequentes apice dilutiùs grisco, albo marginato, præditæ. Binæ rectrices intermediæ lateralibus paululùm longitudine cedunt ; unde fit cauda nonnihil bifurca. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides candicantes. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque rubro-flavicans, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

quarts de sa longueur : de plus les deux du milieu sont terminées de gris ; & les trois suivantes de chaque côté sont terminées d'un gris plus clair, lequel est bordé de blanc. Les deux plumes du milieu de la queue sont un peu plus courtes que les latérales, ce qui rend la queue un peu fourchue. La prunelle des yeux est noire : leur iris est blanchâtre. Le bec est d'un rouge-jaunâtre depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Barge grise.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 1.

Limosa superne grisco-fusca, maculis nigricantibus varia, infernè alba ; capite & collo superioribus fusco-nigricantibus, marginibus pennarum albidis ; collo inferiore & pectore lineis longitudinalibus fusco-nigricantibus variegatis ; tæniâ supra oculos & uropygio candidis ; rectricibus albis, fusco transversim striatis, lateralibus interiùs versùs exortum penitùs candidis . . . . Limosa grisea.

Totanus. *Gesn. Avi. pag.* 518, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Totanus Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 429. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 557.

Gallinulæ maritimæ genus aliud, Venetis Totanus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 115, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Glareola, Barker, Albini. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 12.
Crex. *Bell. Obſ. pag.* 103.
Jonſt. Avi. pag. 108.
Crex Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 428.
Willugh. Ornith. pag. 220.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°.* 10.
Charlet. Exer. pag. 111. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. III.*
Oiſeau nommé Crex. *Bel. Hiſt. Nat. des Oiſ. pag.* 207.
Petit Corlieu ou Aboyeur des Anglois. *Alb. Tom. II. pag.* 45; *avec une figure mal coloriée Pl.* 71.
Les Vénitiens l'appellent TOTANO. *Geſn. Aldrov.*
Les Allemands, MEER-HOUN. *Geſn.*
Les Allemands qui habitent les côtes de la mer, POL-SCHNEP *ou* PEUL-SCHNEPFF. *Geſn.*
Les Anglois, BARKER. *Alb.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur du *Chevalier*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces dix lignes, & juſqu'à celui des ongles de quatorze pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; ſa queue deux pouces huit lignes; la partie de ſes jambes, qui eſt dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; ſon pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere trois lignes & demie

Cum *Totano* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & tres lineas longum eſt; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum quinque lineis; pes duos pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus quatuordecim lineas, intimus duodecim cum

semi lineas; posticus autem tres tantùm cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis octo pollicum & sex linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores vestiunt pennæ fusco-nigricantes, in utroque latere albido marginatæ. Dorsi suprema pars est griseo-fusca, majusculis maculis nigricantibus notata. Pennæ scapulares concolores, sed in utroque latere albido marginatæ; qui albidus color griseo-fusco quasi dentatim admiscetur. Guttur albicat. In utroque capitis latere tænia extat similiter candida, prope rostri exortum orta, & supra oculos producta. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ albæ, lineâ fusco-nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices, seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied huit pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du col sont couvertes de plumes d'un brun-noirâtre, bordées des deux côtés de blanchâtre. La partie supérieure du dos est d'un gris-brun, marqué d'assez grandes taches noirâtres. Les plumes scapulaires sont de la même couleur, mais elles sont bordées des deux côtés de blanchâtre, qui est comme dentelé & engrené dans le gris-brun. La gorge est blanche. De chaque côté de la tête est une bande de la même couleur, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'au-dessus des yeux. La partie inférieure du col & la poitrine sont couvertes de plumes blanches, marquées chacune d'une ligne d'un brun-noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, la partie inférieure

du dos & le croupion ſont blancs. Les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de brun. Celles du deſſous des aîles ſont pareillement blanches, & rayées de bandes brunes, placées obliquement ſur chacun des côtés, & formant enſemble des angles, dont les ſommets ſont ſur la tige de la plume. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont brunes; & de celles-ci, celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont bordées de blanchâtre : les moyennes ſont d'un gris-brun : les grandes les plus proches du corps ſont de cette derniere couleur, bordées extérieurement de gris clair, & intérieurement de blanc, ces deux couleurs étant comme dentelées & engrenées dans le gris-brun : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres; & de celles-là, les plus intérieures ſont bordées de blanc par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-ſix plumes : les ſept premieres ſont d'un gris-blanc en-deſſous, mais en-deſſus elles ſont noirâtres, ayant une grande

dorſum infimum & uropygium albent. Superiores caudæ tectrices concolores, ſed fuſco tranſverſim ſtriatæ. Pennæ alas ſubtus cooperientes pariter candidæ, tæniis ſtriatæ fuſcis, in utroque latere obliquè poſitis, & ſimul efficientibus angulos, quorum apices ſcapis pennarum incumbunt. Margines alarum, infra articulum carpo humano reſpondentem, obtegunt plumulæ fuſcæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuſcæ ſunt; ex iſtis autem, quæ alæ articulum carpo humano reſpondentem cooperiunt, albido marginantur : mediæ ſunt griſeo-fuſcæ : majores corpori finitimæ concolores, exteriùs griſeo dilutiore, interiùs albo ſimbriatæ, duobus iſtis coloribus griſeo-fuſco quaſi dentatim immixtis : majores tandem à corpore remotiores nigricantes; ex iſtis verò intimæ albo in apice marginatæ. Alam componunt viginti ſex remiges : ſeptem primores ſunt ſubtus cinereo-albæ, ſuperne verò nigricantes, attamen in latere interiore maximâ parte griſeæ, fuſco nonnihil maculatæ; prioris inſuper ſcapus

albicat: quatuordecim proximè sequentes, ab octava scilicet ad vigesimam primam usque inclusivè, griseo-fuscæ, albo exteriùs marginatæ, qui color albus griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; quatuordecim istæ remiges sunt insuper in latere interiore maximâ parte candidæ, tæniis transversis & undatis griseo-fuscis striatæ: quinque corpori viciniores similiter griseo-fuscæ, griseo diluto fimbriatæ, qui novissimus color griseo-fusco quasi dentatim immiscetur; vigesima quarta & vigesima quinta sunt insuper in utroque latere versùs ipsarum margines tæniis transversis fusco-nigricantibus striatæ. Quinque remiges corpori finitimæ longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur: binæ intermediæ sunt in utroque latere fusco transversim striatæ: laterales omnes similiter striatæ, sed tantùm in latere exteriore & paululùm insuper in latere interiore solummodo versùs extremitatem. Rostrum fuscum. Pars crurum

partie de leur côté intérieur grise & un peu tachetée de brun; de plus la tige de la premiere est blanche: les quatorze suivantes, sçavoir depuis la huitiéme jusqu'à la vingt-uniéme inclusivement, sont d'un gris-brun, bordées extérieurement d'un blanc qui est comme dentelé & engrené dans le gris-brun, & ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur blanche, & rayée de bandes transversales & en zigzags d'un gris-brun; les cinq plus proches du corps sont de cette derniere couleur, & bordées de gris clair, lequel est comme dentelé & engrené dans le gris-brun; la vingt-quatriéme & la vingt-cinquiéme sont de plus rayées des deux côtés vers leurs bords de bandes transversales d'un brun-noirâtre. Les cinq plumes de l'aîle les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches: les deux du milieu sont des deux côtés rayées transversalement de brun: toutes les latérales sont rayées de même, mais seulement du côté extérieur & un peu vers le bout du côté intérieur. Le bec est brun. La

partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

plumis denudata, pedeſque griſei; ungues verò nigricantes. Circa maris littora verſatur. *Ex muſeo D. Aubry.*

** 3. La grande Barge grise.

Voyez Pl. XXIV. Fig. 2.

Limoſa ſuperne ſaturatè fuſca, marginibus pennarum albidis, infernè alba; gutture albo-rufeſcente; collo albido, maculis longitudinalibus fuſcis vario; uropygio fuſco, marginibus pennarum candidis; rectricibus albis, nigricante tranſverſim ſtriatis . . . . Limosa grisea major.

Gallinulæ maritimæ genus, quod Venetis vulgò Limoſam vocant. *Geſn. icon. Avi. pag.* 114, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Limoſa. *Geſn. Avi. pag.* 519, *in qua eadem icon.*
Limoſa Venetorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 434. *hujus icon peſſima pag.* 435.
Jonſt. Avi. pag. 106.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°. IX.*
Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. IX.*
Glottis. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *ſp.* 5.
Glottis; Lingulaca Gazæ. *Geſn. Avi. pag.* 520.
Glottis, ſeu Pluvialis major Aldrovandi. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 317. *N°. IX. hujus icon minimè accurata Tab.* 268.
Pluvialis major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 535, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Pluvialis major Aldrovando. *Jonſt. Avi. pag.* 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Willugh. Ornith. pag. 220. *hujus icon minimè accurata Tab. LV, ſub titulo*, Glottis, ſeu Pluvialis major Ald.
Raj. Syn. Avi. pag. 106. *N°. A.* 8.
Raj. Syn. Avi. pag. 190. *N°.* 6.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 109. *N°.* 3.
Pluvialis major Aldrovandi; Limoſa Venetorum; Glottis Geſneri. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 415.

Pluvialis

Pluvialis major Aldrovando ; Glottis Baltnero , Venetis Totano. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 48. *hujus icon non satis accurata Tab.* 22.

Scolopax rostro recto basi inferiori rubro , pedibus virescentibus. Glottis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 9.

Numenius pedibus virescentibus , urrhopygio albo , remigibus lineis albis fuscisque undulatis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 142.

Femelle du Chevalier aux pieds rouges. *Alb. Tom. II. pag.* 43 ; *avec une figure peu exacte Pl.* 69.

Les Grecs l'appellent Γλωττὶς. *Gesn.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur , GIRARDEL. *Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Vénitiens , LIMOSA. *Gesn. Aldrov. Willugh. Rzac.* TOTANO. *Willugh. Marsil.*

Les Boulonnois , PLUIERO. *Aldrov.*

Les Napolitains , LEVERSINA. *Gesn. Aldrov. Jonst. Charlet.*

Les Allemands , MEER-HOUN. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Les Suédois , GLUTT. *Linn.*

Les Anglois, GREEN LEGGED HORSEMAN. *Alb.*

Les Anglois de la Jamaïque , CURLEW. *Sloane. Raj.*

Limosæ vulgari nonnihil crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tredecim pollices & tres lineas æquat , & ad extremos ungues quindecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est ; cauda duos pollices & quatuor lineas ; pars crurum plumis denudata tredecim lineas ; pes unum pollicem cum decem lineis ; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuordecim cum semi lineas , extimus tredecim lineas , intimus duodecim cum semi lineas ; posticus autem quinque lineas. Trium

Elle n'est pas tout-à-fait si grosse que la *Barge ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces trois lignes , & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long ; sa queue deux pouces quatre lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes , treize lignes ; son pied un pouce dix lignes ; celui du milieu des trois doigts autérieurs , joint avec l'ongle , quatorze lignes & demie ; l'extérieur treize lignes , l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derriere cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts anté-

rieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds un pouce de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête & du col ſont couvertes de plumes brunes dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige, & blanchâtres ſur les côtés. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ſont d'un brun foncé, bordées de blanchâtre. Les ſcapulaires ſont de la même couleur; mais le blanchâtre eſt comme dentelé & engrené dans le brun. La partie inférieure du dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes, marquées d'une large bordure blanche. Les couvertures du deſſus de la queue ſont de cette derniere couleur, & variées de grandes taches tranſverſales brunes. La gorge eſt d'un blanc très - légerement nuancé de rouſſâtre. Les côtés de la tête ou les joues ſont de la même couleur, mais chaque plume eſt marquée dans ſon milieu d'une petite tache longitudinale brune. Celles qui couvrent la partie inférieure du col, ſont blanchâtres, & marquées de même dans leur

digitorum anticorum medius digito intimo coadunatur membranulâ ad primum uſque articulum extensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & pollicis unius intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores pennis veſtiuntur in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem fuſcis, ad latera albidis. Quæ partem dorſi ſupremam obtegunt, ſunt ſaturatè fuſcæ, marginibus albidis prædítæ. Scapulares concolores; in illis tamen color albidus in fuſco quaſi dentatim includitur. Dorſum infimum & uropygium cooperiunt pennæ fuſcæ, latiuſculâ margine candidâ donatæ. Superiores caudæ tectrices candido quoque colore imbutæ, & majuſculis variegatæ maculis tranſverſis fuſcis. Guttur albicat, & rufeſcente paululùm adumbratur. Caput ad latera ſive genæ eodem imbuuntur colore; quælibet tamen penna minutâ maculâ longitudinali fuſcâ in medio inſignitur. Quæ partem colli inferiorem veſtiunt, ſunt albi-

dæ, minutâ maculâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, in medio similiter notatæ. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes penitùs albent; pennæ tamen laterum partem supremam cooperientes scapo fusco donantur. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, cooperiunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores sunt fuscæ, cinereo-albo marginatæ: majores corpori viciniores fuscæ, latâ margine candidâ præditæ: majores à corpore remotiores nigricantes, pauco albido in apice fimbriatæ. Remiges majores in latere exteriore & extremitate nigricantes, in latere interiore versùs scapum cinereo-fuscæ, maculis candidis aspersæ, & versùs margines penitùs candidæ; scapo similiter candido præditæ sunt; omnes istæ remiges, quinque primoribus exceptis, sunt insuper albo marginatæ: minores sunt dilutè cinereo-fuscæ, maculis quibusdam albis variæ, albo insuper in

milieu d'une petite tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont entiérement blancs; cependant les plumes qui couvrent le haut des côtés, ont leur tige brune. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du dessus des aîles sont brunes, & bordées de gris-blanc: les grandes les plus proches du corps sont brunes, & marquées d'une large bordure blanche: les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres, & bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres du côté extérieur & à leur bout; leur côté intérieur est, vers la tige, d'un cendré-brun parsemé de taches blanches, & vers les bords il est entiérement blanc; leur tige est de cette derniere couleur; toutes ces plumes, excepté les cinq premieres, sont de plus bordées de blanc: les moyennes sont d'un cendré-brun assez clair, variées de quelques taches blanches, & bordées de la même couleur dans

toute leur circonférence : il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, qui depuis la moitié de leur longueur juſqu'à leur extrémité ſont marquées de bandes tranſverſales, les unes noirâtres, & les autres griſes, & de quelques autres bandes blanchâtres, placées vers leur bout. Ces quatre dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches, rayées tranſverſalement de noirâtre. Le bec eſt brun à ſon origine ; cette couleur devient de plus en plus foncée en approchant de ſon bout, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un noir-verdâtre ; & les ongles noirs. On la trouve ſur les bords de la mer & des rivieres. *Du cabinet de Madame de Bandeville.*

tota circumferentia fimbriatæ : ex iſtis tamen excipiendæ ſunt quatuor corpori viciniores ab ipſarum media longitudine ad extremitatem uſque tæniis inſignitæ tranſverſis, aliis nigricantibus, aliis griſeis, & quibuſdam inſuper alteris tæniis albidis, versùs ipſarum apicem poſitis. Quæ quatuor noviſſimè dictæ remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices albæ, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Roſtrum in exortu fuſco imbuitur ; qui color, versùs apicem procedendo, ſenſim atque ſenſim fit ſaturatior ; apex autem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque nigro-virideſcentes ; ungues verò nigri. Juxta maris & fluviorum littora verſatur. *Ex muſeo D. de Bandeville.*

** 4. La Barge brune.

Voyez Pl. XXIII. Fig. 2.

Limoſa ſuperne fuſco-nigricans, marginibus pennarum albidis, infernè ſaturatè cinerea, albo variegata ; vertice cinereo-nigricante ; uropygio candido ; rectricibus binis intermediis

fusco-nigricantibus, candicante transversim striatis, lateralibus fuscis, albo transversim striatis..... LIMOSA FUSCA.

Crassitie *Limosam griseam* paululùm antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quatuor lineas longum est; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata octodecim cum semi lineas; pes duos pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum quinque lineis, extimus quindecim lineas, intimus quatuordecim lineas; posticus autem tres solummodo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum entensâ, & ad digitum intimum rudimento membranæ adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis septem pollicum & trium linearum; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Ca-

Elle est un peu plus grosse que la *Barge grise*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces quatre lignes de long; sa queue deux pouces huit lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes & demie; son pied deux pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quinze lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere trois lignes & demie seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Elle a un pied sept pouces trois lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le dessus de la tête est d'un cendré-noirâtre. La partie supérieure du col est couverte de plumes

d'un brun foncé, bordées d'un peu de blanchâtre par le bout. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre. Les ſcapulaires ſupérieures ſont auſſi d'un brun-noirâtre, marquées ſur les deux bords de taches blanchâtres, & bordées de la même couleur par le bout : les inférieures ſont d'un gris-brun, marquées de même ſur les deux bords de taches blanchâtres. La partie inférieure du dos & le croupion ſont blancs. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col ſont d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont du même cendré, lequel s'éclaircit de plus en plus en approchant du bas-ventre ; le tout eſt mêlé çà & là de quelques plumes blanches ; & celles du bas-ventre ſont bordées de blanc. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un brun foncé, rayées tranſverſalement de blanc. Celles du deſſous ſont blanches, & rayées tranſverſalement de brun. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les couvertures du deſſous des aîles

put ſuperius ex cinereo nigricat. Partem colli ſuperiorem veſtiunt pennæ ſaturatè fuſcæ, pauco albido in apice marginatæ. Quæ dorſi ſupremam partem obtegunt, ex fuſco nigricant, & albido marginantur. Scapulares ſuperiores ſunt quoque fuſco-nigricantes, maculis albidis in utraque margine inſignitæ, eodemque albido in apice fimbriatæ : inferiores griſeo-fuſcæ, maculis albidis in utraque margine ſimiliter notatæ. Dorſum infimum & uropygium albicant. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genæ, guttur & pars colli inferior ſaturatè cineraſcunt. Pectus, venter, latera, crurumque ſuprema pars eodem tinguntur cinereo ; qui color, versùs imum ventrem procedendo, ſenſim atque ſenſim fit dilutior ; omnes autem partes iſtas variegant albæ quædam pennæ ; quæ verò infimum ventrem cooperiunt, albo fimbriantur. Tectrices caudæ ſuperiores ſunt ſaturatè fuſcæ, albo tranſverſim ſtriatæ. Pennæ caudam ſubtus obtegentes candidæ, tæniis tranſverſis fuſcis variæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, coo-

periunt plumulæ fuscæ, albo fimbriatæ. Tectrices alarum inferiores candidæ. Superiores minimæ fuscæ : mediæ concolores, ad margines albo maculatæ : majores corpori finitimæ eodem fusco imbutæ, tæniis transversis saturatiùs fuscis in utroque latere notatæ, ad margines maculis albidis variegatæ, & albo in extremitate fimbriatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ ; ex istis autem binæ intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt viginti quinque remiges, quarum decem primores sunt subtus cinereo-albæ ; superne verò sex primores saturatè fuscæ, attamen in latere interiore maximâ parte candicantes, griseo-fusco maculatæ ; prioris insuper scapus albicat : quatuor reliquæ, à septima scilicet ad decimam usque inclusivè, fusco dilutiore tinctæ, & in latere interiore maximâ parte similiter candicantes, griseo-fusco maculatæ ; ad exteriorem marginem maculis insuper albis notantur, & albo in apice marginantur : quatuor proximè sequentes, ab undecima scilicet ad decimam quartam usque inclusivè, quatuor nu-

sont blanches. Les plus petites du dessus sont brunes : les moyennes sont de la même couleur, & tachetées de blanc sur les bords : les grandes les plus proches du corps sont pareillement brunes, marquées des deux côtés de bandes transversales d'un brun plus foncé, tachetées de blanchâtre sur les bords, & bordées de blanc par le bout : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé ; & de celles-là les deux plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-cinq plumes : les dix premieres sont d'un gris-blanc en-dessous ; mais en-dessus les six premieres sont d'un brun foncé, ayant une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; de plus la tige de la premiere est blanche : les quatre autres, sçavoir depuis la septiéme jusqu'à la dixiéme inclusivement, sont d'un brun plus clair, & ont de même une grande partie de leur côté intérieur blanchâtre, & tachetée de gris-brun ; elles sont de plus tachetées de blanc sur le bord extérieur, & bordées de blanc par le bout : les quatre suivantes, sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la quatorziéme inclusivement, sont de la même cou-

leur que les quatre dernieres, avec cette différence cependant que leur côté intérieur eſt rayé tranſverſalement de brun & de blanc : les ſept qui ſuivent immédiatement ces dernieres, ſçavoir depuis la quinziéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont des deux côtés rayées tranſverſalement de brun & de blanc : la vingt-deuxiéme eſt d'un gris-brun, & tachetée de blanchâtre ſur ſes bords : les trois plus proches du corps ſont d'un brun-noirâtre, & tachetées de même de blanchâtre ſur leurs bords. Les quatre plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont d'un brun-noirâtre, rayé tranſverſalement de blanchâtre : les latérales ſont brunes, & rayées tranſverſalement de blanc. Le bec eſt noir, excepté l'origine du demi-bec inférieur, qui eſt blanchâtre. Le bout du bec eſt un peu courbé en en-bas. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. On la trouve ſur les bords de la mer. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

per deſcriptis concolores, ab illis tamen diſcrepantes in eo quod ad latus interius fuſco & albo ſint tranſverſim ſtriatæ : ſeptem quæ noviſſimas iſtas proximè ſequuntur, à decima quinta ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, ſunt in utroque latere fuſco & albo tranſverſim ſtriatæ : vigeſima ſecunda griſeo-fuſca, maculis albidis ad margines variegata : tres corpori viciniores fuſco-nigricantes, ad margines albido ſimiliter maculatæ. Remiges quatuor corpori finitimæ longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates fermè pertingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ ſunt fuſco-nigricantes, candicante tranſverſim ſtriatæ : laterales fuſcæ, albo tranſverſim ſtriatæ. Roſtrum nigrum, excepto tamen mandibulæ inferioris exortu albido. Roſtri autem extremitas paululùm deorſum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. Juxta maris littora degit. *Ex muſeo D. Aubry.*

** 5. La Barge rousse.

Voyez Pl. XXV. Fig. 1.

Limosa superne nigricans, marginibus pennarum rufescentibus, infernè ferruginea; tæniâ supra oculos rufescente; uropygio albo-rufescente, maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus fuscis albo transversim striatis.... Limosa rufa.

Scolopax rostro subrecurvato, pedibusque nigris, pectore ferrugineo. Scolopax Lapponica. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 12.
Scolopax rostro recto flavescente, pedibus fuscis, corpore subtus fulvo fusco-undato. Hæmastica. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 14.
Totanus fulvus, maculis fuscis. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IV. sp.* 2.
Recurvirostra pectore croceo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 138.
Francolin à poitrine rouge. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVIII; avec une figure assez exacte Pl.* 138.
Les Anglois l'appellent Red-breasted Godwit. *Edwards.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tredecim pollices & quatuor lineas explet, & ad extremos ungues quatuordecim pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices cum linea una longum est; cauda tres pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes unum pollicem & decem cum semi lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; posti-

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de quatorze pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces une ligne de long; sa queue trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quinze lignes; son pied un pouce dix lignes & demie; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du

milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a un pied onze pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de rousſâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande rousſâtre, qui s'étend depuis l'origine du bec jusque vers l'occiput, en passant par-dessus les yeux. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un blanc mêlé d'une légere teinte de rousſâtre, & marquées chacune d'une tache noirâtre, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Les couvertures du dessus de la queue sont rayées transversalement de blanc-rousſâtre & de brun. La gorge, la partie inférieure & les côtés du col, la poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont d'un beau ferrugineux. Le haut des jambes est de la même couleur, mais beaucoup plus claire. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches, & variées de taches brunes,

cus autem quatuor tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis undecim pollicum & quatuor linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi supremam, vestiunt pennæ nigricantes, marginibus rufescentibus prædictæ. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat rufescens, ab exortu rostri orta, supra oculos ducta, & versùs occipitium usque protensa. Dorsum infimum & uropygium pennis vestiuntur albo-rufescentibus, maculâ nigricante, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Superiores caudæ tectrices variegant tæniæ transversæ alternatim albo-rufescentes & fuscæ. Guttur, collum inferiùs & ad latera, pectus, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices eleganti ferrugineo colore imbuuntur. Crurum partem supremam tingit idem color, sed multò dilutior. Pennæ alas subtus

obtegentes sunt candidæ, easque variegant maculæ fuscæ, cujuslibet pennæ medium occupantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, fuscæ, albo fimbriatæ : majores à corpore remotiores, fusco-nigricantes ; ex istis autem intimæ sunt in apice albo marginatæ. Alam componunt viginti septem remiges : sex primores ex fusco nigricant, attamen ab ipsarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque sunt in latere interiore maximâ parte dilutè griseæ, albido maculatæ ; scapo insuper albo-rufescente donantur : septima & octava remigibus nuper descriptis concolores, sed albo insuper in tota ipsarum circumferentia marginantur : quindecim proximè sequentes, à nona scilicet ad vigesimam tertiam usque inclusivè, sunt in latere exteriore griseo-fuscæ, in interiore griseæ, inque tota circumferentia albo fimbriatæ : quatuor corpori viciniores fusco-nigricantes, maculis rufescentibus ad margines variegatæ. Quæ quatuor noviſſimæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala com-

placées au milieu de chaque plume. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont brunes & bordées de blanc : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre ; & de celles-ci les plus intérieures sont bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les six premieres sont d'un brun-noirâtre, ayant cependant depuis leur origine jusque vers les deux tiers de leur longueur la plus grande partie de leur côté intérieur d'un gris clair, tacheté de blanchâtre ; elles ont aussi leur tige d'un blanc-roussâtre : la septiéme & la huitiéme sont colorées comme ces dernieres, mais elles sont de plus bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quinze suivantes, sçavoir depuis la neuviéme jusqu'à la vingt-troisiéme inclusivement, sont d'un gris-brun du côté extérieur, grises du côté intérieur, & bordées de blanc dans toute leur circonférence : les quatre plus proches du corps sont d'un brun-noirâtre, & variées sur leurs bords de taches roussâtres. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée,

un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, rayées tranſverſalement d'un blanc qui en quelques endroits tire un peu ſur le rouſſâtre. Le bec eſt d'un jaune-rougeâtre depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur, & de là juſqu'à ſon extrémité il eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont de cette derniere couleur; & les ongles noirs. On la trouve ſur les bords de la mer *Du cabinet de M. Mauduyt.*

plicatur, nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſcis, albo tranſverſim ſtriatis; quæ albedo quibuſdam in locis paululùm ad rufeſcentem inclinat colorem. Roſtrum ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque ex luteo rubeſcit, à medietate ad apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſimiliter nigricantes, ungues verò nigri. Circa maris littora verſatur. *Ex muſeo D. Mauduyt.*

6. La grande Barge rousse.

Limoſa ſuperne nigricans, marginibus pennarum rufeſcentibus, infernè ſordidè alba, maculis tranſverſis nigricantibus varia; tæniâ ſupra oculos albo-rufeſcente; collo rufo, infernè nigricante tranſverſim ſtriato; uropygio candido, maculis nigricantibus vario; rectricibus nigricantibus, albo tranſverſim ſtriatis . . . . Limosa rufa major.

Scolopax roſtro recto, pedibus vireſcentibus, capite colloque rufeſcentibus, remigibus tribus nigris baſi albis. Ægocephala. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 13.

Barge ſeu Ægocephalus Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 215.
Raj. Syn. Avi. pag. 105. *N°. A.* 4.
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 36. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 16.

Glareola Ægocephalus. *Klein. Avi. pag.* 102. *N°.* 11.

Francolin. *Alb. Tom. II. pag.* 44; *avec une figure mal coloriée Pl.* 70.

Les Anglois l'appellent Godwit. *Willugh, Alb. & en quelques endroits,* Stone-Plover. *Willugh.*

Les Anglois qui habitent l'Iſle d'Ely & Cambridge, Yarwhelp *ou* Yarwip. *Willugh, Raj.*

Præcedentem multùm crassitie superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem quatuor pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & quatuor lineas longum est; cauda tres pollices; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quindecim lineas, extimus duodecim cum semi lineas, intimus unum pollicem; posticus autem quatuor lineas tantùm. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Pennæ partem capitis superiorem, sicut & dorsi supremam, obtegentes nigricant, & marginibus donantur rufescentibus. Scapulares concolores. In utroque capitis latere tænia extat albo-rufescens, pro-

Elle est beaucoup plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied quatre pouces six lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long; sa queue trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quinze lignes, l'extérieur douze lignes & demie, l'intérieur un pouce; & celui de derriere quatre lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête & du dos sont couvertes de plumes noirâtres, bordées de roussâtre. Les scapulaires sont de la même couleur. De chaque côté de la tête est une bande d'un blanc-roussâtre, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend jusqu'au-dessus des

yeux. La gorge & le col ſont roux; mais la partie inférieure du col eſt variée de taches tranſverſales noirâtres. La partie inférieure du dos & le croupion ſont d'un blanc varié de taches noirâtres. Les couvertures du deſſus de la queue ſont rayées tranſverſalement de blanc & de noirâtre. La poitrine, le ventre, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont d'un blanc ſale, varié de taches tranſverſales noirâtres. Le haut des jambes eſt d'un blanc ſale & ſans taches. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont noirâtres, & bordées de rouſſâtre: les grandes les plus éloignées du corps ſont noires, & bordées de blanc ſeulement par le bout. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires, & ont leur tige blanche; les trois premieres ſont de plus marquées vers le tiers de leur longueur d'une grande tache tranſverſale blanche: toutes les moyennes ſont noirâtres, bordées & terminées de rouſſâtre. De celles-ci les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes

pe roſtri exortum orta, & ſupra oculos uſque producta. Guttur & collum ſunt rufa; colli tamen inferiorem partem variegant maculæ tranſverſæ nigricantes. Dorſum infimum & uropygium albicant, & maculis nigricantibus variegantur. Superiores caudæ tectrices ſunt albo & nigricante tranſverſim ſtriatæ. Pectus, venter, latera & tectrices caudæ inferiores ſordidè albent, maculiſque variegantur tranſverſis nigricantibus. Crurum ſuprema pars eſt pariter ſordidè alba, ſed immaculata. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, nigricant, & rufeſcente marginantur: majores à corpore remotiores ſunt nigræ, albo in apice tantùm fimbriatæ. Remiges majores nigro quoque imbutæ, ſcapo candido præditæ, tribus primoribus majuſculâ inſuper maculâ tranſversâ candidâ versùs ipſarum tertiam longitudinis partem inſignitis: minores omnes nigricantes, rufeſcente fimbriatæ & terminatæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum

extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes, albo transversim striatæ. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem nonnihil gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum in exortu ex albo rubescens, versùs extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-virideſcentes; ungues verò nigri. Maris arenosa littora frequentat.

noirâtres, rayées transversalement de blanc. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un blanc-rougeâtre à son origine, & noir vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun-verdâtre; & les ongles noirs. Elle se tient sur les sables des bords de la mer.

** 7. La Barge rousse d'Amérique.

Limosa superne fusco-rufescens, nigro transversim striata; infernè albo-rufescens; tæniâ supra oculos, genis & gutture candidis; uropygio rufo, nigricante transversim striato; collo inferiore & pectore rufescentibus, collo inferiore maculis longitudinalibus nigris, pectore maculis transversis fuscis vario; rectricibus rufis, nigro transversim striatis . . . . Limosa Americana rufa.

Scolopax rostro recto longo, pedibus fuscis, remigibus secundariis rufis nigro punctulatis. Fedoa. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 8.
Grand Francolin de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVII; avec une figure exacte Pl.* 137.
Les Anglois l'appellent Greater American Godwit. *Edwards.*
Les Anglois de la Baye de Hudson, Curlew. *Edwards.*

Crassitie præcedentem nonnihil excedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem sexdecim pol-

Elle est un peu plus grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de seize

pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied ſept pouces quatre lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; ſa queue deux pouces huit lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce cinq lignes; ſon pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur ſeize lignes, l'intérieur quatorze lignes; & celui de derriere ſix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds trois pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'à ſix lignes au-delà du bout de la queue. Les parties ſupérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes ſcapulaires ſont d'un brun-rouſſâtre, rayé tranſverſalement de noir. La partie inférieure du dos & le croupion ſont roux, & rayés tranſverſalement de noirâtre. Les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. De chaque côté de la tête eſt une bande blanche, qui part d'auprès de l'origine du bec,

lices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem ſeptem pollices & quatuor lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & novem lineas longum eſt; cauda duos pollices & octo lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem & quinque lineas; pes duos pollices cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus ſexdecim lineas, intimus quatuordecim lineas; poſticus autem ſex lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranulâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & trium pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad ſex uſque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Partes capitis & colli ſuperiores, ſicut & dorſi ſuprema, ſcapulareſque pennæ ſunt fuſco-rufeſcentes, nigro tranſverſim ſtriatæ. Dorſum infimum & uropygium rufa, tæniis tranſverſis nigricantibus varia. Superiores caudæ tectrices concolores. In utroque capitis

pitis latere tænia extat candida, prope roſtri exortum orta, ſupra oculos ducta, & versùs occipitium uſque protenſa. Caput ad latera, idque infra oculos, ſive genas, gutturque tingit idem candidus color. Collum inferius rufeſcit, maculiſque variegatur longitudinalibus nigris. Pectus pariter rufeſcit, ſed maculis tranſverſis fuſcis variegatur. Venter & crurum ſuprema pars ex albo rufeſcunt, & maculis deſtituuntur. Latera, inferioreſque caudæ tectrices ex albo quoque rufeſcentes, maculis tranſverſis fuſcis variæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſpadiceæ. Superiores alarum tectrices minimæ fuſcæ, rufeſcente fimbriatæ: mediæ fuſco-rufeſcentes, nigro tranſverſim ſtriatæ: majores corpori finitimæ concolores: ſequentes, illæ ſcilicet quæ medium locum occupant, ſpadiceæ, punctulis nigris aſperſæ: majores tandem à corpore remotiores nigricantes, albo in apice fimbriatæ. Remiges majores nigricant: proximè ſequentes ſunt ſpadiceæ, punctulis nigris aſperſæ: corpori viciniores fuſco-rufeſcentes, nigro tranſverſim

& s'étend juſque vers l'occiput, en paſſant par-deſſus les yeux. Les côtés de la tête au-deſſous des yeux ou les joues, & la gorge ſont du même blanc. La partie inférieure du col eſt rouſſâtre, & variée de taches longitudinales noires. La poitrine eſt pareillement rouſſâtre, mais elle eſt variée de taches tranſverſales brunes. Le ventre & le haut des jambes ſont d'un blanc-rouſſâtre & ſans taches. Les côtés, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue, ſont de la même couleur, & variés de taches tranſverſales brunes. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un rouge-bai. Les petites du deſſus ſont brunes, & bordées de rouſſâtre: les moyennes ſont d'un brun-rouſſâtre, rayé tranſverſalement de noir: les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur: les ſuivantes, ſçavoir celles qui occupent le milieu, ſont d'un rouge-bai tout parſemé de petits points noirs: enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées de blanc par le bout. Les grandes plumes de l'aîle ſont noirâtres: les ſuivantes ſont d'un rouge-bai tout parſemé de petits points noirs: & les plus proches du corps ſont d'un brun-rouſſâtre,

rayé transversalement de noir. Ces dernieres sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presque jusqu'au bout de la queue. La queue est composée de douze plumes rousses, rayées transversalement de noir. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales. Le bec est d'un beau jaune depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur, ensuite il est d'un brun qui devient de plus en plus foncé, en approchant vers son bout, qui est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On la trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Elle a été envoyée de *Canada* à *M. de Reaumur* par *M. Gautier*.

striatæ. Quæ novissimè dictæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, caudam ferè extremam attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus rufis, nigro tranversim striatis. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt. Rostrum ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque eleganter luteum, deinde fuscum; qui color, versùs apicem procedendo, sensim atque sensim fit saturatior; in extremitate autem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricant. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Canada* in *musæum Realmurianum* missa à *D. Gautier*.

8. La Barge blanche.

Limosa candida; marginibus alarum, remigibus majoribus, rectricibusque albo-flavicantibus .... Limosa candida.

Francolin blanc de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIX; avec une figure exacte Pl.* 139. (*fig. postérieure*).
Les Anglois l'appellent White-Godwit from Hudson's-Bay. *Edwards.*

Elle est à peu près de la grosseur de la *Barge rousse*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatorze pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles

Cum *Limosa rufa* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quatuordecim pollices & tres circiter lineas explet, & ad extre-

mos ungues sexdecim pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & lineas binas longum est; cauda duos pollices & quatuor lineas; pars crurum plumis denudata sexdecim lineas; pes duos pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas, intimus unum pollicem; posticus autem tres tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranulâ ad primum usque articulum extensâ, & digito intimo rudimento membranæ coadunatur. Alæ complicatæ ad sex usque lineas ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, crurum partem supremam & latera vestiunt pennæ candidæ. Scapulares, quæ alas superne cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Inferiores alarum tectrices sunt dilutè fuscæ. Alarum margines per totam longitudinem obtegunt plumulæ albo-flavicantes. Remiges

de seize pouces neuf lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces deux lignes de long; sa queue deux pouces quatre lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, seize lignes; son pied deux pouces deux lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce; & celui de derriere trois lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une petite membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par un petit commencement de membrane. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes blanches. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun clair. Le bord de l'aîle est couvert dans toute sa longueur de petites plumes d'un blanc-jau-

nâtre. Les grandes plumes de l'aîle ſont de la même couleur : les moyennes ſont blanches. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſque juſqu'au bout de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un blanc-jaunâtre. Le bec eſt orangé, excepté ſon bout, qui eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un brun foncé. On la trouve à la *Baye de Hudſon*.

majores ex albo quoque flavicant : minores ſunt candidæ. Ex minoribus autem, corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad caudam ferè extremam pertingunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus albo-flavicantibus. Roſtrum aurantium, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ſaturatè fuſci. Habitat in *Freto Hudſonis*.

LXXVII.

Le genre de la Beccaſſe.

Son caractere eſt d'avoir

Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :

La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :

Le bec menu, très-long, droit, & dont le bout eſt obtus & raboteux.

LXXVII.

Genus Scolopacis.

Hujus character eſt

Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :

Crura in parte inferiore plumis denudata :

Roſtrum gracile, longiſſimum, rectum; ipſius apice obtuſo & rugoſo.

** 1. La Beccasse.

Scolopax ſuperne caſtaneo, nigro & griſeo variegata, infernè griſeo-rufeſcens ; nigricante tranſverſim ſtriata ; tæniâ utrinque roſtrum inter & oculum nigrâ ; gutture candicante ; collo ſuperiore tæniis quatuor tranſverſis nigris inſignito ; uropygio caſtaneo, nigricante tranſverſim ſtriato ; rectricibus nigris, apice griſeis, maculis triangularibus caſtaneis in margine exteriore notatis . . . . Scolopax.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6

Echelle de 6. Pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Barge grise.

2. Barge brune.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Alouette-de-mer de S. Domingue.

2. Grande Barge grise.

Dessiné et Gravé par Matinet.

1. Barge rousse.

2. Petite Alouette-de-mer de S. Domingue.

Scolopax rostro recto lævi, pedibus cinereis, femoribus tectis, fasciâ frontis nigrâ. Rusticola. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 7.

Scolopax subtus fulva, superne cinerea. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XII. sp.* 1.

Scolopax. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31, *sub titulo*, Scolopax sive Gallinago : *& insuper altera icon non satis accurata Tab.* 53, *sub titulo*, Rusticola.

Willugh. Ornith. pag. 213. *hujus icon non satis accurata Tab. LIII. Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 18.

Scolopax simpliciter Aristotelis, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 99. *N°.* 1.

Scolopax, Gallinago maxima. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°. A.* 1.

Scolopax, sive Perdix rustica. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 471. *hujus icon non satis accurata pag.* 473.

Scolopax, Rusticula major. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. VII. Charlet. Onomazt. pag.* 108. *N°. VII.*

Ascolopax. *Bell. Obs. pag.* 18.

Rusticula. *Moehr. Avi. Gen.* 97.

Rusticula, vel Perdix rustica major. *Gesn. Avi. pag.* 501. *hujus icon non satis accurata pag.* 502.

Gesn. icon. Avi. pag. 110, *in qua eadem icon.*

Perdix rustica major. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 329.

Perdix rustica major; Ascolopax; Scolopax; Gallinago Gazæ. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 292.

Perdix rustica major, seu Scolopax Aldrovandi; Gallina rustica; Rusticula major. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 409.

Gallina rustica. *Gesn. Avi. pag.* 477.

Rukicola. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *sp.* 4.

Numenius rostri apice lævi; capite lineâ utrinque nigrâ; rectricibus nigris apice albis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 141.

Wood-Cock. *Borl. Nat. Hist. of Cornwall. pag.* 245. *hujus icon pessima Tab. XXIV. fig. XII.*

Beccasse. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 272; *avec une figure peu exacte pag.* 273.

Bécasse, Bécasse grande, Béquasse, Videcocq. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 52 *b*, *dans laquelle est la même figure.*

Bécasse. *Alb. Tom. I. pag.* 62; *avec une figure peu exacte Pl.* 70.

Les Grecs l'appellent Σκολόπαξ. *Bel. Gesn. Schwenck.* Α'σκολόπαξ. *Bel. Aldrov.* Ασπαλώπαξ. *Schwenck. & vulgairement* Ξυλόρνις. *Jonst.*

Les Grecs modernes, Χλωρίθα. *Bell.*

Les Turcs dans l'Asie mineure, Tcheluk. *Gesn. Aldrov.*

Les Normands, Videcoq. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, Becada. *Barr.*

Les Italiens, Beccassa; Gallinella; Gallina arciera. *Bel. Gesn.*

Aldrov. GALLINA RUSTICELLA ; GALLINA SALVATICA. *Aldrov.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, GALLINAZA ; POLLA. *Bel. Geſn. Aldrov.*
Les Italiens aux environs de Breſſe, ARCIA. *Bel. Geſn. Aldrov.*
Les Boulonnois, PIZZACCARA. *Aldrov.*
Les Habitans de Parmes, PIZZACCARA ; BECCASSA. *Aldrov.*
Les Toſcans, ACCEGGIA. *Geſn. Aldrov.*
Les Génois, RONZESA : *& quelques-uns*, ROPEZORA. *Aldrov.*
Les Allemands, SCHNEPFF. *Geſn. Aldrov.* GROSSER SCHNEPF. *Geſn.* RIET-SCHNEPFF ; SCHNEPFF-HUN. *Geſn. Aldrov.* SCHNEPFFE ; SCHNEP-HUN ; PUSCH-SCHNEPPE, WALD-SCHNEPPE ; HOLTZ-SCHNEPPE ; BERG-SCHNEPPE. *Schwenck.* WALD-SCHNEPFE ; HOLTZ-SCHNEPFE ; BERG-SCHNEPFE. *Rzac.*
Les Flamands, SNEPPE. *Geſn. Aldrov.*
Les Brabançons, NEPPE. *Geſn.*
Les Polonois, SLOMKA. *Rzac.*
Les Suédois, MORKULLA. *Linn.*
Les Anglois, WOOD-COCK. *Geſn. Aldrov. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Linn. Alb. Borl.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur de la *Perdrix griſe*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de treize pouces, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces ſept lignes de long ; ſa queue trois pouces ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux lignes ; ſon pied dix-huit lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce ſept lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur un pouce ; & celui de derriere cinq lignes & demie. Les trois doigts antérieurs ſont réunis à leur origine par un

Perdicem cineream craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tredecim pollices explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & ſeptem lineas longum eſt ; cauda tres pollices ; pars crurum plumis denudata lineas binas ; pes octodecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum ſeptem lineis, extimus tredecim lineas, intimus unum pollicem ; poſticus autem quinque cum ſemi lineas. Digiti tres antici in ipſarum exortu

rudimento membranæ valdè exiguo inter se connectuntur. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam ferè pertingunt. Partes capitis & colli superiores, sicut & dorsi suprema, scapularesque pennæ castaneo, nigro, paucoque griseo eleganter variegantur. Collum superius latis quatuor tæniis transversis nigris insignitur. In utroque capitis latere exigua extat tænia concolor, ab oris angulis orta, & ad oculos usque producta. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneus, nigricante transversim striatus. Guttur candicat. Pars colli inferior rufescit, tæniisque transversis nigricantibus insignitur. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores alarum tectrices sunt griseorufescentes, pariter nigricante transversim striatæ. Pennæ caudam subtus obtegentes dilutè rufæ, nigricantibus variegatæ maculis, aliis transversis, alteris longitudinalibus. Superiores alarum tectrices minores castaneæ,

très-petit commencement de membrane. Elle a un pied dix pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. Les parties supérieures de la tête, du col & du dos, & les plumes scapulaires sont joliment variées de marron, de noir & d'un peu de gris. Sur la partie supérieure du col sont quatre larges bandes transversales noires. De chaque côté de la tête est une petite bande de la même couleur, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusqu'aux yeux. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron rayé transversalement de noirâtre. La gorge est blanchâtre. La partie inférieure du col est d'un roussâtre rayé transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous des aîles sont d'un gris-roussâtre, rayé de même transversalement de noirâtre. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un roux clair, varié de taches noirâtres, les unes transversales, d'autres longitudinales. Les petites du dessus des aîles sont d'un marron rayé transversalement de brun; les grandes les plus pro-

ches du corps ſont variées & rayées tranſverſalement de gris, de brun & de marron clair : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées ſur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement ſur leur bord intérieur; elles ſont auſſi bordées de marron clair par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes : la premiere eſt brune, & variée ſur le côté extérieur de taches blanchâtres, & ſur le bord intérieur de taches de marron clair : les ſeize ſuivantes, ſçavoir depuis la ſeconde juſqu'à la dix-ſeptiéme incluſivement, ſont brunes, & marquées de taches triangulaires d'un beau marron, placées ſur leur côté extérieur, & de taches de marron clair, placées obliquement ſur leur bord intérieur; elles ſont auſſi bordées de marron clair par le bout : les ſix plus proches du corps ſont variées & rayées tranſverſalement de gris, de brun & de marron clair. Ces ſix dernieres ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes noires, terminées de

fuſco tranſverſim ſtriatæ : majores corpori viciniores griſeo, fuſco & caſtaneo diluto variæ & tranſverſim ſtriatæ : majores à corpore remotiores fuſcæ, triangularibus notatæ maculis eleganter caſtaneis, in latere exteriore poſitis, maculiſque dilutè caſtaneis, ad marginem interiorem obliquè collocatis, inſignitæ ; ſunt quoque caſtaneo diluto in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti tres remiges, quarum prior fuſca eſt, maculis candicantibus in latere exteriore varia, maculis verò dilutè caſtaneis ad marginem interiorem notata : ſexdecim proximè ſequentes, à ſecunda ſcilicet ad decimam ſeptimam uſque incluſivè, fuſcæ, triangularibus notatæ maculis eleganter caſtaneis, in latere exteriore collocatis, maculiſque dilutè caſtaneis, ad interiorem marginem obliquè poſitis, inſignitæ ; caſtaneo diluto in extremitate inſuper marginantur : ſex corpori viciniores griſeo, fuſco & caſtaneo diluto variegantur & tranſverſim ſtriantur. Quæ ſex noviſſimæ remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur,

complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigræ, griseo terminatæ, maculisque triangularibus eleganter castaneis in margine exteriore notatæ. Rostrum in exortu ex griseo ad carneum colorem vergit, in extremitate nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque griseo-fusci. Sylvas humidas & rivulos juxta sepes frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

gris, & marquées sur leur bord extérieur de taches triangulaires d'un beau marron. Le bec est à son origine d'un gris tirant sur le couleur de chair, & noirâtre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Elle fréquente les bois humides & les ruisseaux bordés de hayes. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** A. *La Beccasse blanche.*

Scolopax candida.

Scolopax alba. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 6.
Beccasse blanche. *Alb. Tom. III. pag.* 36; *avec une figure passable Pl.* 85.
Les Anglois l'appellent White Wood-Cock. *Alb.*

A præcedente differt colore in universo corpore candido. (Illa cujus descriptionem dedit *Albinus*, pauco variegatur castaneo). Rostrum ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque sunt pallidè lutei; ungues verò candidi. *Ex museo Realmuriano.*

Elle différe de la précédente par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. (Celle qu'*Albin* a décrite, est variée d'un peu de marron.) Son bec est d'un blanc-jaunâtre. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune pâle; & les ongles blancs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Beccassine.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 1.

Scolopax ſuperne nigricante & fulvo diluto variegata, infernè alba; gutture fulvo; capite ſuperiore triplici tæniâ longitudinali dilutè fulvâ notato; dorſo faſciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis inſignito; uropygio fuſco-nigricante, albo-fulveſcente tranſverſim ſtriato; rectricibus in exortu nigricantibus, in extremitate fulvis, nigricante tranſverſim ſtriatis . . . . Gallinago.

Scolopax roſtro recto apice tuberculato, pedibus fuſcis, lineis frontis fuſcis quaternis. Gallinago. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 11.
Scolopax cinerea minor, roſtro nigro. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen XII. ſp.* 2.
Scolopax media. *Klein. Avi. pag.* 99. *N°.* 2.
Scolopax, quæ Capella cœleſtis authorum. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 3.
Scolopax, ſeu Gallinago minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 476. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 479.
Scolopax, ſeu Gallinago minor, & Scolopax minor. *Jonſt. Avi. pag.* 110. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 31; *& inſuper altera icon à Geſnero mutuata Tab. XXVII, ſub titulo*, Ruſticula minor.
Gallinago. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 56. *ſp.* 6.
Gallinago, ſive Ruſticula minor. *Geſn. Avi. pag.* 505, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Gallinago, vel Scolopax minor, ſive Ruſticula minor. *Geſn. icon. Avi. pag.* 112, *in qua eadem icon.*
Gallinago, Scolopax minor. *Charlet. Exer. pag.* 112. *N°. VIII. Charlet. Onomazt. pag.* 108. *N°. VIII.*
Gallinago minor. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 2. *Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag.* 18.
Gallinago minor Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 484, *in qua hujus icon peſſima.*
Gallinago minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 214. *hujus icon minùs accurata Tab. LIII.*
Gallinago minor Willughby. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 381.
Gallinago vulgaris minor. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 34. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 15.
Ruſticula; Gallinago Gazæ; Scolopax minor aliis. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 295.
Perdix ruſtica minor. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 330.

Perdix rustica minor ; Scolopax minor ; Rusticula minor ; Gallinago minor ; Capella-cœlestis. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 410.

Numenius capite lineis quatuor fuscis longitudinalibus, rostri apice tuberculoso, femoribus seminudis. *Faun. Suec. Linn. N°.* 143.

Molliceps Aristotelis. *Jonst. Charlet.*

Bécassine. *Alb. Tom. I. pag.* 63 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 71.

Bécassine ou Bécasseau. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 215, *dans laquelle il y a une mauvaise figure.*

Bécassine, Bécasseau, Bécasson, Bécasse petite. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 54 *a*, *dans laquelle est une figure passable.*

Les Turcs l'appellent Jelvé. *Gesn. Aldrov.*

Les Italiens, Pizzardella. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, Schnepffe ; Heer-Schnepfe ; Wasser-Schnepfe. *Rzac.* Heer-Schnepff. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* Har-Schnepf ; Haer-Sneff ; Grass-Schnepff ; Schnepfflin. *Gesn. Aldrov.* Grase-Schnepff ; Bruch-Schnepfle ; Wasser-Schnepffe ; Wasser-Heunlin. *Schwenck.*

Les Siléſiens, Himels Geisz ; Himels Ziege. *Schwenck.* Himmels-Ziege. *Rzac.*

Les Polonois, Bekas ; Baranek ; Kozielek. *Rzac.*

Les Suédois, Wald-Snaeppa ; Mall-Snaeppa. *Linn.*

Les Anglois, Snipe. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.* Snite. *Willugh. Raj. Sibbald.*

Crassitie *Coturnicem* paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices & quinque lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & quinque cum semi lineas longum est ; cauda duos pollices cum sex lineis ; pars crurum plumis denudata quinque lineas ; pes quatuordecim lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & qua-

Elle est un peu plus grosse qu'une *Caille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces cinq lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces cinq lignes & demie de long ; sa queue deux pouces six lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes ; son pied quatorze lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize

lignes, l'intérieur douze lignes & demie ; & celui de derriere quatre lignes ſeulement. Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a quinze pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un noir varié de petites taches fauves, & marqué de trois bandes longitudinales d'un fauve clair, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec juſqu'à l'occiput, & une autre de chaque côté, qui part auſſi de l'origine du bec, & s'étend juſqu'à l'occiput, en paſſant immédiatement par-deſſus les yeux. Sur les côtés de la tête l'eſpace contenu entre le bec & l'œil eſt fauve, & marqué d'une petite bande brune, qui part des coins de la bouche, & s'étend juſqu'à l'œil. La gorge eſt fauve. La partie inférieure du col eſt variée de fauve très-clair & de brun. La partie poſtérieure de la tête, les parties ſupérieures du col & du dos, & les plumes ſcapulaires ſont variées de noirâtre & de fauve clair, cette derniere couleur formant ſur le dos quatre bandes longitudinales,

tuor lineas, extimus tredecim lineas, intimus duodecim cum ſemi lineas ; poſticus autem quatuor tantummodo lineas. Omnes digiti ſunt ad exortum uſque à ſe invicem penitùs diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quindecim pollicum & ſex linearum ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput ſuperius nigrum eſt, minutis maculis fulvis varium, & tribus notatum tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, unâ ſcilicet in medio poſitâ, ab exortu roſtri ad occipitium uſque productâ, alterâ utrinque collocatâ, ab exortu roſtri ſimiliter ortâ, immediatè ſupra oculos ductâ, & ad occipitium uſque protensâ. Caput ad latera, in ſpatio ſcilicet roſtrum inter & oculum contento, fulvum eſt, exiguâque tæniâ fuſcâ, ab oris angulis ortâ, & ad oculum uſque productâ, inſignitum. Guttur quoque fulvum. Pars colli inferior fulvo dilutiſſimo & fuſco variegata. Caput poſterius, pars colli ſuperior, ſicut & dorſi ſuprema, ſcapulareſque pennæ

nigricante & fulvo diluto variegantur ; color autem dilutè fulvus quatuor efficit in dorso tænias longitudinales, utrinque binas, scilicet in dorso ipso unam, & in scapularium latere exteriore alteram. Dorsum infimum & uropygium obtegunt pennæ fusco-nigricantes, tæniis transversis ex albo ad fulvum vergentibus notatæ. Superiores caudæ tectrices sunt fulvæ, nigricante transversim striatæ. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera in parte infima albicant. Latera in parte suprema albent quidem, sed aliquid fulvi admixtum habent, & fusco transversim striantur. Tectrices caudæ inferiores sunt dilutè fulvæ, nigricante maculatæ. Pennæ alas subtus cooperientes fuscæ, albo fimbriatæ. Quæ alarum margines infra articulum carpo humano respondentem obtegunt, concolores. Superiores alarum tectrices minimæ sunt saturatè fuscæ : mediæ, sicut & majores corpori viciniores, fusco saturato & fulvo diluto variegatæ : majores à corpore remotiores saturatè fuscæ, albo in apice marginatæ. Viginti quatuor remi-

deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même & une sur le côté extérieur des scapulaires. La partie inférieure du dos & le croupion sont couverts de plumes d'un brun-noirâtre, marquées de bandes transversales d'un blanc tirant sur le fauve. Les couvertures du dessus de la queue sont fauves, & rayées transversalement de noirâtre. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & le bas des côtés sont blancs. Le haut des côtés est d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve, & rayé transversalement de brun. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un fauve clair, tacheté de noirâtre. Celles du dessous des aîles sont brunes, & bordées de blanc. Les plumes qui couvrent le bord de l'aîle au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, sont de la même couleur. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un brun foncé : les moyennes, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont variées de brun foncé & de fauve clair : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun foncé, & bordées de blanc par le bout. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes : les dix premieres sont brunes ; de celles-là,

la premiere a ſon côté extérieur blanc; la ſeconde eſt bordée extérieurement de blanc; les huit autres, ſçavoir depuis la troiſiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont bordées intérieurement d'un blanchâtre tacheté de brun; & dans cinq de ces dernieres, ſçavoir depuis la ſixiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, la bordure blanchâtre s'étend auſſi ſur le bout: les huit ſuivantes, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la dix-huitiéme incluſivement, ſont brunes, terminées de blanc, & ont auſſi une grande partie de leur côté intérieur rayée tranſverſalement de blanc; de plus le blanc de leur extrémité borde leur côté extérieur d'autant plus haut vers leur origine, que la plume eſt plus proche du corps: la dix-neuviéme & la vingtiéme ſont brunes, bordées & terminées de blanc, & ſont de plus variées de gris du côté intérieur: enfin les cinq plus proches du corps ſont rayées de bandes obliques, alternativement noirâtres & d'un fauve clair, ces dernieres bandes étant elles-mêmes tachetées de noirâtre. Ces cinq dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que

gibus ala conflatur: decem primores fuſcæ; ex iſtis autem prior in latere exteriore albet; ſecunda margine exteriore donatur candidâ; octo reliquæ, à tertia ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, marginibus donantur interioribus albidis, fuſco maculatis; & ex noviſſimis iſtis quinque, à ſexta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, margine candicante etiam in apice præditæ ſunt: octo proximè ſequentes, ab undecima ſcilicet ad decimam octavam uſque incluſivè, fuſcæ, albo terminatæ, & in lateris interioris maxima parte albo quoque tranſverſim ſtriatæ; albedo autem quâ terminantur, marginem efficit in latere exteriore concolorem eò magis versùs ipſarum exortum appropinquantem, quò remix fit corpori vicinior: decima nona & vigeſima fuſcæ ſunt, albo fimbriatæ & terminatæ, inque latere interiore griſeo inſuper variegatæ: quinque tandem corpori finitimæ tæniis ſtriatæ obliquis, alternatim nigricantibus & dilutè fulvis; quæ ipſæ tæniæ dilutè fulvæ nigricante maculantur. Quinque iſtæ noviſſimè dictæ remiges longæ

sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices in exortu nigricantes, in reliqua longitudine fulvæ, nigricante transversim striatæ : in sex intermediis rectricibus color nigricans, ipsarum exortum tingens versùs extremitatem magnopere protenditur ; & utrinque extima dilutissimo fulvo imbuitur. Oculorum irides avellaneæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque fuscum, inde ad apicem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco - virideſcentes ; ungues verò nigricantes. Loca paludosa frequentat, & juxta rivulorum ripas versatur. *Ex museo Realmuriano.*

les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres à leur origine ; le reste de leur longueur est fauve, & rayé transversalement de noirâtre : sur les six plumes du milieu le noirâtre de l'origine s'étend fort loin vers leur extrémité ; & le fauve de la plus extérieure de chaque côté est très-clair. L'iris des yeux est de couleur de noisette. Le bec est brun depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est noirâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds son d'un brun - verdâtre ; & les ongles noirâtres. Elle se tient dans des endroits marécageux, & le long des petits ruisseaux. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. La petite Beccassine.

Voyez Pl. XXVI. Fig. 2.

Scolopax superne nigro & fulvo variegata, nigro-violaceo & viridi-aureo colore variante, infernè fusco, fulvo obscuro & albido varia ; ventre albo ; gutture albo-fulvescente ; capite superiore duplici tæniâ longitudinali dilutè fulvâ notato ; dorso fasciis quatuor longitudinalibus dilutè fulvis insignito ; uropygio splendidè violaceo, pennis albido in apice marginatis ; rectricibus binis intermediis nigricanti-

bus, fulvo marginatis, lateralibus fuſcis, fulvo variegatis . . . . GALLINAGO MINOR.

Scolopax minima, ex fulvo & caſtaneo colore maculata. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XII. ſp.* 3.
Scolopax minima. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 4.
Gallinago minima, ſeu tertia Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 214. *Raj. Syn. Avi. pag.* 105. *N°. A.* 3.
Cinclus. *Charlet. Exer. pag.* 113. *N°. XI.*
Charlet. Onomazt. pag. 108. *N°. XI.*
Cinclus quartus, Gallinago minima Bellonii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 493, *in qua hujus icon peſſima.*
Cinclus, Gallinago minima Bellonii. *Jonſt. Avi. pag.* 112. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 53.
Plus petite eſpece de Bécaſſine. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 217.
Mâle de la Beccaſſine. *Alb. Tom. III. pag.* 36; *avec une figure mal coloriée Pl.* 86.
Les François l'appellent DEUX-POUR-UN. *Bel. Willugh.*
Les François qui habitent les bords de l'Océan, FOUTON. *Bel. Aldrov.*
Les Catalans, BECADELL. *Barr.*
Les Flamands, HALF-SCHNEPF. *Charlet.*
Les Anglois, JUD-COCK; JACK-SNIPE. *Willugh. Raj. Alb.* GID-SNIPE. *Willugh. Raj.* HALF-SNIPE. *Charlet.*

Elle eſt de moitié plus petite que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de huit pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de huit pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce ſept lignes de long; ſa queue un pouce neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre lignes; ſon pied dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, treize lignes, l'extérieur onze lignes,

Craſſitie præcedenti mediâ parte cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octo pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues octo pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & ſeptem lineas longum eſt; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum plumis denudata quatuor lineas; pes decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tredecim lineas, extimus

mus undecim lineas, intimus decem lineas; posticus autem tres tantummodo lineas. Digiti omnes sunt ad exortum usque à se invicem penitùs discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum tredecim pollicum & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput superius eleganti imbuitur nigro minutis maculis fulvis vario, & binis notato tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, prope rostri exortum ortis, & ad occipitium usque productis. Partem colli superiorem vestiunt pennæ ex fulvo ad fuscum vergentes, maculis fuscis variæ, albido fimbriatæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ sunt nigro & fulvo variegatæ, nigro tamen violaceo lucido & viridi-aureo splendenti colore variante : dorsum insuper quatuor insignitur tæniis longitudinalibus dilutè fulvis, binis utrinque, scilicet in dorso unâ, & in scapularium latere exteriore alterâ: ex scapularibus autem quædam albo in apice fimbriantur. Dorsum infimum & uropygium

l'intérieur dix lignes; & celui de derriere trois lignes seulement. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a treize pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un beau noir varié de petites taches fauves, & marqué de deux bandes longitudinales d'un fauve clair, qui partent d'auprès de l'origine du bec, & s'étendent jusqu'à l'occiput. Le dessus du col est couvert de plumes d'un fauve rembruni, variées de taches brunes, & bordées de blanchâtre. La partie supérieure du dos & les plumes scapulaires sont variées de noir & de fauve, le noir changeant en violet brillant & en verd-doré éclatant. Le dos est de plus marqué de quatre bandes longitudinales d'un fauve clair, deux de chaque côté, sçavoir une sur le dos même, & une sur le côté extérieur des scapulaires : quelques-unes de ces dernieres plumes sont bordées de blanc par le bout. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un violet brillant, & bordées de blanchâtre par le

bout. Les couvertures du deſſus de la queue ſont noirâtres, tachetées & bordées de fauve. Les côtés de la tête ſont d'un fauve clair, & marqués d'une bande longitudinale noirâtre, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend juſqu'à l'œil. La gorge eſt d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. La partie inférieure & les côtés du col, la poitrine & les côtés ſont variés de brun, de fauve rembruni & de blanchâtre. Le ventre eſt blanc, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue. Le haut des jambes eſt couvert de plumes griſes. Les petites couvertures du deſſous des aîles ſont d'un blanc varié de cendré : les grandes ſont entiérement cendrées. Les plus petites du deſſus ſont brunes, & bordées de blanc : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont variées de brun, de fauve clair & d'un peu de blanchâtre : les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & bordées de blanchâtre par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes : les dix premieres ſont brunes; ſix de celles-là, ſçavoir depuis la çinquiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont bordées de blanchâtre par le bout : les dix ſuivantes,

pennis veſtiuntur ſplendidè violaceis, albido in apice marginatis. Superiores caudæ tectrices ſunt nigricantes, fulvo maculatæ & fimbriatæ. Caput ad latera eſt dilutè fulvum, tæniâ longitudinali nigricante, prope roſtri exortum ortâ, & ad oculum uſque productâ, inſignitum. Guttur albet, ſed aliquid fulvi admixtum habet. Collum inferiùs & ad latera, pectus & latera fuſco, fulvo obſcuro & albido variegantur. Venter, inferioreſque caudæ tectrices albicant. Crurum ſupremam partem veſtiunt pennæ griſeæ. Tectrices alarum inferiores minores ſunt candidæ, cinereo variæ : majores penitùs cinereæ. Superiores minimæ fuſcæ, albo fimbriatæ : mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, fuſco, fulvo diluto & pauco albido variegatæ; majores à corpore remotiores fuſcæ, candicante in apice marginatæ. Viginti quatuor remigibus ala conſtat : decem primores fuſcæ; ex iſtis autem ſex, à quinta ſcilicet ad decimam uſque incluſivè, albido in apice marginatæ : decem proximè ſequentes, ab undecima ſcilicet ad vigeſimam

usque inclusivè, dilutè fuscæ, candicante obliquè terminatæ ; quæ decem remiges in acumen desinunt : vigesima prima fusca, attamen in latere exteriore partim obscurè fulva, fusco maculata, & margine albâ prædita : tres tandem corpori viciniores in latere interiore fuscæ, in exteriore fulvæ, nigricante transversim striatæ & maculatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ nigricant, & marginibus fulvis præditæ sunt : laterales omnes fuscæ, in latere exteriore multò magis quàm in interiore fulvo variegatæ. Binæ rectrices intermediæ in acumen desinunt, & trium linearum longitudine laterales excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum ab ipsius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes usque fuscum, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque

sçavoir depuis l'onziéme jusqu'à la vingtiéme inclusivement, sont d'un brun clair, & terminées obliquement de blanchâtre ; ces dix plumes se terminent en pointe : la vingt-uniéme est brune, ayant une partie de son côté extérieur d'un fauve rembruni, tacheté de brun, & bordé de blanc : enfin les trois plus proches du corps sont brunes du côté intérieur, tandis que leur côté extérieur est d'un fauve rayé transversalement & tacheté de noirâtre. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de fauve : toutes les latérales sont brunes, & variées de fauve, mais beaucoup plus du côté extérieur que du côté intérieur. Les deux plumes du milieu de la queue se terminent en pointe, & sont de trois lignes plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est brun depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est

noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un brun-verdâtre ; & les ongles noirâtres. On la trouve dans les endroits marécageux & couverts de joncs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

fuſco-virideſcentes ; ungues verò nigricantes. In paludoſis locis & juncetis habitat. *Ex muſeo Realmuriano.*

4. La Beccassine de Madrast.

Scolopax ſuperne nigricante & fulvo variegata, infernè alba ; gutture & collo inferiore fulvis, maculis nigricantibus variis ; capite ſuperiore triplici tæniâ longitudinali fuſco-nigricante notato ; dorſo faſciis duabus longitudinalibus fuſco-nigricantibus inſignito ; tæniâ tranſversâ in pectore nigrâ ; rectricibus nigro, fulvo & griſeo variegatis . . . . Gallinago Maderaspatana.

Gallinago Maderaſpatana, Perdicis colore. *Raj. Syn. Avi. pag.* 193. *N°.* 2. *hujus icon peſſima Tab. I. fig.* 2.
Les Anglois l'appellent Partridge-Snipe. *Raj.*

J'ignore quelle eſt ſa grandeur. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont variés de noirâtre & de fauve. Les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Le deſſus de la tête eſt marqué de trois bandes longitudinales d'un brun-noirâtre, l'une placée dans le milieu, & qui s'étend depuis l'origine du bec juſqu'à l'occiput, & une autre de chaque côté placée derriere l'œil. Sur le dos ſont auſſi deux bandes

Quâ magnitudine polleat prorſus ignoro. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium nigricante & fulvo variegantur. Pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes, ſuperioreſque caudæ tectrices concolores. Caput ſuperius tribus notatur tæniis longitudinalibus fuſco-nigricantibus, unâ ſcilicet in medio poſitâ, ab exortu roſtri ad occipitium uſque productâ, alterâ utrinque ponè oculum collocatâ. Dorſum binis quoque faſciis longitudinalibus fuſco-nigri-

cantibus est insignitum. Guttur & partem colli inferiorem tingit color fulvus maculis nigricantibus varius. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & tectrices caudæ inferiores albent; attamen tænia extat transversa in pectore nigra. Remiges nigro, fulvo & griseo eleganter variegantur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Rostrum rufescit. Hoc habet singulare hæc species, quod digitus posticus anticos digitos longitudine adæquet. Habitat circa *Maderaspatanum*.

longitudinales d'un brun-noirâtre. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un fauve varié de taches noirâtres. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs; mais la poitrine est marquée d'une bande transversale noire. Les plumes de l'aîle sont joliment variées de noir, de fauve & de gris. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Le bec est roussâtre. Ce qu'il y a de singulier dans cette espece, c'est que le doigt de derriere est aussi long que ceux de devant. On la trouve aux environs de *Madrast*.

5. La Beccassine d'Angleterre.

Scolopax superne rufa, maculis nigris & pauco albo variegata, infernè alba; gutture, collo inferiore & pectore maculis nigricantibus variis; medio ventre nigricante, albo undulato; rectricibus binis intermediis fuscis, rufo maculatis, lateralibus fusco-albicantibus . . . . Gallinago Anglicana.

Dunlin Septentrionalium Anglorum D. Johnson. *Willugh. Ornith. pag.* 226.
Raj. Syn. Avi. pag. 109.
Les Anglois Septentrionnaux l'appellent Dunlin. *Willugh. Raj.*

Cum *Gallinagine minori* crassitie & magnitudine convenit. Partes capitis & colli superiores, dorsum, uropy-

Elle est de la grosseur & de la grandeur de la *petite Beccassine*. Les parties supérieures de la tête & du col, le dos, le crou-

pion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un roux tout parſemé d'aſſez grandes taches noires, & varié d'un peu de blanc. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont blanches, & variées de taches noirâtres. Le milieu du ventre eſt noirâtre, & varié de blanc en zigzags. Le reſte du ventre, les couvertures du deſſous de la queue, le haut des jambes & les côtés ſont blancs. Les aîles ſont d'un bleu tirant ſur le brun. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont brunes, & variées de quelques taches rouſſes : toutes les latérales ſont d'un brun clair ou blanchâtre. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. Le doigt de derriere eſt extrêmement court. On la trouve dans la partie Septentrionale de l'*Angleterre*.

gium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt rufæ, majuſculis maculis nigris aſperſæ, & pauco albo variegatæ. Guttur, pars colli inferior & pectus albore nitent, quem variegant maculæ nigricantes. Medius venter nigricat, alboque eſt undulatus. Reliquus venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices albent. Alæ ex cæſio ad fuſcum vergunt. Duodecim rectricibus cauda conſtat: binæ intermediæ fuſcæ, maculis quibuſdam rufis variegatæ : laterales omnes dilutè fuſcæ, aut fuſco-albicantes. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Digitus poſticus valdè brevis. Habitat in *Angliæ* Septentrionali regione.

SECTION VI.

Ceux qui ont le bec courbé en arc en en-bas.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui du *Courly*.

SECTIO VI.

Eæ quæ roſtrum habent deorſum arcuatum.

UNICO genere, *Numenii* ſcilicet, conſtituitur hæc ſectio.

Fig. 1.

Fig. 2.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Beccassine.

2. Petite Beccassine.

LXXVIII.

Genus Numenii.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum deorsum arcuatum.

Omnes hujus generis Alites rostro donantur apice obtuso.

LXXVIII.

Le genre du Courly.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec courbé en arc en enbas.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le bout du bec obtus.

** 1. Le Courly.

Numenius pennis in medio fusco-nigricantibus, in utraque margine fulvis superne vestitus, infernè albus; gutture albido, maculis griseis vario; pectore & lateribus ad fulvum vergentibus, maculis transversis fuscis insignitis; uropygio candido maculis longitudinalibus fuscis notato; rectricibus binis intermediis griseis, lateralibus albis, omnibus fusco transversim striatis . . . . Numenius.

Numenius rostro arcuato, alis nigris: maculis niveis, pedibus cœrulescentibus. *Faun. Succ. Linn. N°.* 139.
Numenius. *Moehr. Avi. Gen.* 87.
Numenius veterum, vel ei cognatus. Arquata major. *Gesn. icon. Avi. pag.* 113, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Numenius, Arquata, Gesneri, Aldrovandi. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 1.
Numenius, sive Arquata. *Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag.* 18. *hujus icon non satis accurata Tab.* 12. *fig.* 2.
Numenius Aldrovandi, sive Arquata. *Willugh. Ornith. pag.* 216. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*
Numenius Aldrovandi, sive Arcuata. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 38. *hujus icon satis accurata Tab.* 17.
Numenius sive Arcuata major. *Raj. Syn. Avi. pag.* 103. *N°. A.* 1.

Arquata albicans, maculis ſubcaſtaneis. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. IX. ſp.* 1.

Arquata. *Jonſt. Avi. pag.* 108. *maris icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *ſp.* 1.

Arquata ſeu Numenius. *Geſn. Avi. pag.* 221. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 222.

Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 424. *maris icon non ſatis accurata pag.* 426. *Muſ. Worm. pag.* 307.

Arquata, Arcuata, Numenius veterum, Curlinus. *Charlet. Exer. pag.* 111. *N°. II.*

Charlet. Onomazt. pag. 106. *N°. II.*

Arquata Aldrovandi, Geſneri; Arcuata Coſmii; Numenius Jonſtoni; Pardalus primus Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 365.

Scolopax roſtro arcuato, pedibus cœruleſcentibus, alis nigris maculis niveis. Arquata. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *ſp.* 5.

Pardalus primus. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 315.

Corlis & Corlieu. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 204; *avec une figure peu exacte pag.* 205.

Corlis, Corlieu. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 47 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.*

Corlieu. *Alb. Tom. I. pag.* 69; *avec une figure mal coloriée Pl.* 79.

Les Grecs l'appellent Ἑλώριος. *Bel.*

Les Catalans, POLIT. *Barr.*

Les Italiens, TORQUATO; ARCASE.; CHARLOT. *Bel. Geſn. Aldrov.*

Les Italiens qui habitent la Poüille, TARLINO *ou* TERLINO. *Bel. Geſn. Aldrov.*

Les Italiens aux environs du Lac Majeur, SPINZAGO. *Bel. Geſn. Aldrov.*

Les Vénitiens, ARCUATO. *Aldrov.*

Les Boulonnois, PIVIER. *Aldrov.*

Les Milanois, CAROLI. *Bel. Geſn. Aldrov.*

Les Allemands, BRACH-VOGEL; WIND-VOGEL; WETTER-VOGEL. *Geſn. Aldrov.* JUT-VOGEL. *Rzac.* GROSSER BRACH-VOGEL; BRACH-HUN; GILOCH; HIMEL-GEISZ. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, REGEN-VOGEL. *Geſn. Aldrov.*

Les Allemands aux environs du Lac de Conſtance, GRENY. *Geſn. Aldrov.*

Les Siléſiens, GEISZ-VOGEL. *Schwenck.*

Les Hollandois, HANIKENS. *Geſn. Aldrov.*

Les Friſons, SCHRYE. *Geſn. Aldrov.*

Les Friſons Orientaux, WALLOP. *Geſn.*

Les Anglois, CURLEW. *Geſn. Willugh. Raj. Charlet.* WATER-CURLEW. *Alb.* KURLU. *Geſn. Aldrov.* WHAUPE. *Geſn. Ils appellent le mâle*, JACK-CURLEW. *Willugh. Alb.*

Il eſt à peu près de la groſ- Cum *Capone* craſſitie cir-

citer convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues duos pedes totidem pollices & octo lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & octo lineas longum est; cauda quatuor pollices cum octo lineis ; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, extimus unum pollicem cum septem lineis, intimus octodecim lineas ; posticus autem septem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & quatuor pollicum; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes usque protenduntur. Caput, collumque vestiunt plumulæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem

seur d'un *Chapon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces huit lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces huit lignes de long ; sa queue quatre pouces huit lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix-huit lignes ; son pied trois pouces ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce sept lignes, l'intérieur dix-huit lignes; & celui de derriere sept lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds quatre pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La tête & le col sont couverts de petites plumes brunes dans leur milieu selon la longueur de leur tige, & fauves sur les deux côtés. La gorge est blanchâtre, chaque plume étant marquée d'une pe-

tite tache griſe. La partie ſupérieure du dos eſt couverte de plumes d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & fauves ſur les deux bords. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, ſont blanches, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige depuis leur origine juſque vers les trois quarts de leur longueur. Les couvertures du deſſus de la queue ſont blanchâtres, & marquées de bandes tranſverſales brunes; les bords de ces bandes tirent un peu ſur le fauve. La poitrine & les côtés ſont d'un blanc tirant ſur le fauve, chaque plume étant encore marquée de bandes tranſverſales brunes, dont la plus proche du bout de la plume a la forme d'un fer de lance. Le ventre & le haut des jambes ſont blancs. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la même couleur, mais chaque plume eſt marquée d'une bande tranſverſale brune, placée vers les deux tiers de ſa longueur, & d'une tache de même couleur, qui a la forme d'un fer de lance, & eſt placée vers le bout de la plume. Les petites couvertures du deſſous des aîles ſont blanches, & variées de brun : les gran-

fuſcæ, in utroque latere fulvæ. Guttur candicat; quælibet autem penna minutâ inſignitur maculâ griſeâ. Dorſi ſupremam partem cooperiunt pennæ in medio fuſco-nigricantes, in utraque margine fulvæ. Quæ dorſum infimum & uropygium obtegunt, candidæ, ab exortu versùs tres quartas longitudinis partes uſque tæniâ fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, notatæ. Superiores caudæ tectrices ſunt candicantes, tæniis tranſverſis fuſcis inſignitæ; quarum tæniarum margines ad fulvum colorem nonnihil inclinant. Pectus & latera ex albo ad fulvum vergunt; unaquæque autem penna tæniis pariter notatur tranſverſis fuſcis, quarum quæ versùs pennæ extremitatem collocatur, eſt lanceolata. Venter & crurum ſuprema pars albent. Pennæ caudam ſubtus obtegentes ſimiliter candidæ, quælibet tamen inſignitur tæniâ tranſverſâ fuſcâ, versùs duas tertias ipſius longitudinis partes poſitâ, & maculâ inſuper concolore lanceolatâ, versùs pennæ extremitatem collocatâ. Inferiores alarum tectrices minores albæ, fuſco

variegatæ : majores ſimiliter candidæ, ſed cinereo tranſverſim ſtriatæ. Scapulares pennæ minores pennis partem dorſi ſupremam veſtientibus concolores : majores fuſco-nigricantes, attamen ad latera griſeo, in fuſco-nigricante quaſi dentatim incluſo, variegatæ. Tectrices alarum ſuperiores minimæ ex fuſco nigricant, & candicante marginantur : mediæ ſunt in medio fuſco-nigricantes, ad margines fulvæ : majores corpori viciniores majoribus ſcapularibus concolores : majores à corpore remotiores fuſco-nigricantes, candicante in apice tantùm fimbriatæ. Triginta remigibus ala conflatur : quinque primores nigricantes, tæniis tranſverſis albis in latere interiore ſtriatæ : quinque proximè ſequentes, à ſexta ſcilicet ad decimam uſque incuſivè, pariter nigricant, ſed in margine exteriore maculis notantur candidis, griſeo variegatis, & tæniis tranſverſis albis interiùs ſtriantur : quatuordecim quæ proximè ſequuntur, ab undecima ſcilicet ad vigeſimam quartam uſque incluſivè, fuſcæ ſunt, & ad margines albo, in fuſco quaſi dentes ſont pareillement blanches, mais elles ſont rayées tranſverſalement de cendré. Les petites plumes ſcapulaires ſont de la même couleur que celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos : les grandes ſont d'un brun-noirâtre, mais leurs côtés ſont variés d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun-noirâtre. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre : les moyennes ſont d'un brun-noirâtre dans leur milieu, & fauves ſur leurs bords : les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur que les grandes ſcapulaires : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un brun-noirâtre, & bordées de blanchâtre ſeulement par le bout. L'aîle eſt compoſée de trente plumes : les cinq premieres ſont noirâtres, & rayées intérieurement de bandes tranſverſales blanches : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la ſixiéme juſqu'à la dixiéme incluſivement, ſont pareillement noirâtres, marquées ſur leur bord extérieur de taches blanches variées de gris, & rayées du côté intérieur de bandes tranſverſales blanches : les quatorze qui ſuivent, ſçavoir depuis l'onziéme juſqu'à la vingt-quatriéme

incluſivement, ſont brunes, & variées ſur leurs bords d'un blanc comme dentelé & engrené dans le brun, cette derniere couleur étant d'autant plus claire, que la plume eſt plus proche du corps : enfin les ſix plus proches du corps ſont brunes, & variées ſur leurs bords d'un gris comme dentelé & engrené dans le brun. Ces ſix dernieres plumes ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîlé eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les deux du milieu ſont griſes : les latérales ſont blanches; & toutes ſont rayées tranſverſalement de brun. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un brun qui ſe fonce de plus en plus en approchant de ſon extrémité, où il eſt noirâtre : le demi-bec inférieur eſt blanchâtre depuis ſon origine juſque vers la moitié de ſa longueur; le reſte eſt d'un brun qui devient noirâtre vers ſon bout. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. On le trouve ſur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

tatim incluſo, variegatæ; color autem fuſcus eò dilutior eſt, quò remix fit corpori vicinior : ſex tandem corpori finitimæ fuſcæ, ad margines griſeo, in fuſco quaſi dentatim incluſo, variegatæ. Sex iſtæ nuper deſcriptæ remiges longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum binæ intermediæ griſeæ : laterales albæ; omnes autem ſunt fuſco tranſverſim ſtriatæ. Mandibula ſuperior fuſco imbuitur, qui color, versùs ipſius extremitatem procedendo, ſenſim atque ſenſim fit ſaturatior; extremitas autem nigricat : mandibula inferior ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque candicans, in reliqua longitudine fuſca, qui color fuſcus versùs apicem nigricat. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. Juxta maris, fluminum & ſtagnorum littora verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

** A. *Le Courly blanc.*

Numenius candidus.

A præcedente discrepat tantùm colore in universo corpore albo. Rostrum dilutè grisеum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ex albo flavicant. *Ex museo Realmuriano.*

Il ne différe du précédent que par sa couleur, qui est blanche par tout le corps. Son bec est d'un gris clair. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, ses pieds & ses ongles sont d'un blanc-jaunâtre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. Le petit Courly ou le Corlieu.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 1.

Numenius pennis in medio saturatè fuscis, ad margines grisеis superne vestitus, infernè albus; capite superiore fusco, tæniâ in medio longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, insignito; maculâ rostrum inter & oculos candidâ; pectore & lateribus ad fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; uropygio candido; rectricibus sex intermediis grisеo-fuscis, tribus utrinque extimis albis, exteriùs ad fulvum vergentibus, omnibus fusco transversim striatis . . . . Numenius minor.

Numenius rostro arcuato, dorso maculis fuscis rhomboidalibus; pedibus cœruleſcentibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 140.

Numenius minor. *Linn. Syst. Nat. ed.* 6. *Gen.* 59. *sp.* 2.
Klein. Avi. pag. 109. *N°.* 2.

Arquata minor. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 366.

Arquata minor nostras. *Willugh. Ornith. pag.* 217.
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°. A.* 2.

Scolopax rostro arcuato, pedibus cœruleſcentibus, maculis dorsalibus fuscis rhomboidalibus. Phæopus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 6.

Phæopus altera, vel Arquata minor. *Gesn. Avi. pag.* 499, *in qua hujus icon minimè accurata.*

Phæopus alter. Arquata minor. *Gesn. icon. Avi. pag.* 103, *in qua eadem icon.*

Phæopus altera, seu Arquata minor Gesneri. *Willugh. Ornith. pag.* 217.

Gallinula Phæopos altera, seu Arquata minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 458. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 460.

Wimbrel ou petit Corlieu. *Edwards. Glanur. Part. II. pag.* 204. *Chap. XCVII ; avec une figure aſſez exacte Pl.* 307.
Les Italiens l'appellent TARANGOLO. *Geſn. Aldrov. Willugh.*
Les Vénitiens, TARANIOLO. *Willugh. Raj.*
Les Allemands, REGEN-VOGEL. *Geſn. Aldrov. Willugh.*
Les Anglois, WHIMBRELL. *Raj.* WHIMBREL. *Willugh. Klein. Edwards.* LESSER CURLEW. *Edwards.*

Les citations qui ſuivent appartiennent à la même eſpece, ou du moins à une variété.

Sequentes citationes ad eamdem ſpeciem, aut ſaltem ad ipſius varietatem attinent.

Phœopus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 102, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Phœopus Gallinula Geſneri. *Willugh. Ornith. pag.* 217.
Gallinula quam noſtri vocant Brach-hun ; vel Phœopus. *Geſn. Avi. pag.* 498, *in qua hujus icon minimè accurata.*
Gallinula Phœopus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 458. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 459.
Les Milanois l'appellent GIRARDELLO. *Geſn. Aldrov.*
Les Suiſſes, BRACH-HUN. *Geſn.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, BRACH-VOGEL. *Geſn. Aldrov. Willugh.*

Il eſt beaucoup plus petit que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de quinze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de ſeize pouces deux lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces quatre lignes de long ; ſa queue quatre pouces ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatorze lignes ; ſon pied deux pouces une ligne ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes, l'extérieur quatorze lignes, l'inté-

Præcedenti multùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam quindecim pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues ſexdecim pollices & lineas binas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & quatuor lineas longum eſt ; cauda quatuor pollices ; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas ; pes duos pollices cum linea una ; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas, extimus qua-

tuordecim lineas, intimus tredecim lineas ; posticus autem sex lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum quinque pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertingunt. Caput superius fuscum est, tæniâ longitudinali, maculis cinereo-albis variâ, à rostro ad occipitium usque productâ, in medio insignitum. Guttur albicat. In utroque capitis latere macula extat pariter candida, rostrum inter & oculum posita. Caput ad latera, collum & pectus obtegunt pennæ ex cinereo-albo ad fulvum vergentes, tæniâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatæ. Quæ partem dorsi supremam vestiunt, sicut & scapulares, sunt in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Dorsum infimum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars,

rieur treize lignes ; & celui de derriere six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds cinq pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est brune, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale variée de taches de gris-blanc, qui s'étend depuis le bec jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. De chaque côté de la tête est une tache de la même couleur, placée entre le bec & l'œil. Les côtés de la tête, le col & la poitrine sont couverts de plumes d'un gris-blanc tirant sur le fauve, & marquées chacune d'une bande brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. La partie inférieure du dos, le croupion, le ventre, le haut des

jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs; quelques-unes des longues plumes des côtés tirent cependant un peu ſur le fauve, & ſont rayées tranſverſalement de brun. Les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un gris-blanc tirant ſur le fauve, & rayées de même tranſverſalement de brun. Les petites du deſſous des aîles ſont blanches : les grandes ſont de la même couleur, & rayées tranſverſalement de cendré-brun. Le bord de l'aîle eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de blanc. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un gris-brun, & marquées ſur leurs bords de taches tranſverſales d'un gris-blanc : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur, & marquées vers les bords du côté intérieur de bandes tranſverſales blanchâtres : les ſuivantes ſont d'un gris-brun, & marquées ſur leurs bords de taches tranſverſales blanchâtres : les quatre ou cinq plus proches du corps ſont colorées comme ces dernieres, avec cette différence, qu'elles n'ont pas de taches

inferioreſque caudæ tectrices albent; quædam tamen ex longiuſculis pennis latera cooperientibus paululùm ad fulvum inclinant, & fuſco tranſverſim ſtriantur. Pennæ caudam ſuperne veſtientes ſunt cinereo-albæ ad fulvum vergentes, fuſco ſimiliter tranſverſim ſtriatæ. Inferiores alarum tectrices minores candidæ : majores concolores, cinereo-fuſco tranſverſim ſtriatæ. Alarum margines cooperiunt plumulæ fuſcæ, albo fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt griſeo-fuſcæ, maculis tranſverſis cinereo-albis ad margines inſignitæ : majores à corpore remotiores nigricantes. Remiges majores quoque nigricant, & tæniis tranſverſis candicantibus versùs ipſarum margines in latere interiore notantur : proximè ſequentes ſunt griſeo-fuſcæ, maculis tranſverſis candicantibus ad margines inſignitæ : quatuor aut quinque corpori viciniores noviſſimè dictis concolores, ab illis tamen diſcrepantes in eo quod maculis candicantibus in latere interiore deſtituantur. Remiges omnes ſunt ſubtus cinereæ, albo

eodem

eodem modo variegatæ ac candicante ſuperne variegantur. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices, quarum ſex intermediæ ſunt ſubtus cinereæ, ſuperne verò griſeo-fuſcæ, fuſco tranſverſim ſtriatæ : tres utrinque extimæ albæ, paululùm in latere exteriore tantùm ad fulvum vergentes, & tæniis tranſverſis fuſcis in utroque latere notatæ. Roſtrum nigricans, exceptâ mandibulæ inferioris baſi candicante. Pars crurum plumis denudata, pedeſque griſeo-virideſcentes; ungues verò nigricantes. Præcedentis inſtar, juxta maris, fluminum & ſtagnorum littora verſatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

blanchâtres ſur leur côté intérieur. Le deſſous de toutes les plumes de l'aîle eſt cendré, & variée de blanc de la même façon que ces plumes le ſont de blanchâtre en-deſſus. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes : les ſix du milieu ſont cendrées en-deſſous, & en-deſſus elles ſont d'un gris-brun rayé tranſverſalement de brun : les trois plus extérieures de chaque côté ſont blanches, cette couleur tirant un peu ſur le fauve du côté extérieur ſeulement, & marquées des deux côtés de bandes tranſverſales brunes. Le bec eſt noirâtre, excepté la bâſe du demi-bec inférieur, qui eſt blanchâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un gris-verdâtre ; & les ongles noirâtres. On le trouve comme le précédent, ſur les bords de la mer, des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 3. Le Courly de Madagascar.

Voyez Pl. XXVIII.

Numenius pennis in medio ſaturatè fuſcis, ad margines griſeis ſuperne veſtitus, infernè albus ; pectore & lateribus ad

fulvum vergentibus, maculis in pectore longitudinalibus, in lateribus transversis fuscis; rectricibus griseis, fusco transversim striatis .... NUMENIUS MADAGASCARIENSIS.

Il est de la grosseur du *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds cinq pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a six pouces neuf lignes de long; sa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce huit lignes; & celui de derriere huit lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds trois pouces quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent presque jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête,

Cum *Numenio nostrate* crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & totidem pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & quinque pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices & novem lineas longum est; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem cum octo lineis; posticus autem octo cum semi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, solummodo ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum totidem pollicum & quatuor linearum intervallo distant;

alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Partem capitis superiorem, collum superius & dorsum vestiunt pennæ in medio saturatè fuscæ, ad margines griseæ. Quæ uropygium obtegunt concolores; attamen in illis color fuscus minus spatium occupat; griseus verò paulò dilutior est. Scapulares sunt quoque in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscæ, ad margines griseæ; fusco transversim striatæ. Superiores caudæ tectrices griseo-rufescentes, tæniis insignitæ fuscis, aliis transversis, alteris circumferentiæ pennæ parallelis. Guttur albicat. Pars colli inferior pennis vestitur cinereo-albis, lineâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notatis. Pectus & latera ex albo nonnihil ad rufescentem inclinant colorem; quem colorem variegant maculæ fuscæ in pectore longitudinales, in lateribus verò transversæ. Venter & crurum suprema pars albent, maculisque destituuntur. Pennæ caudam subtus obtegentes ex albo paululùm ad rufescentem colorem vergunt, & lineis fuscis, aliis longi-

le dessus du col & le dos sont couverts de plumes d'un brun foncé dans leur milieu, & grises sur leurs bords. Celles qui couvrent le croupion sont de la même couleur; mais le brun occupe moins d'espace, & le gris est un peu plus clair. Les scapulaires sont aussi d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige; leurs bords sont gris, & rayés transversalement de brun. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un gris-roussâtre, marqué de bandes brunes, dont les unes sont transversales, & d'autres sont paralleles à la circonférence de la plume. La gorge est blanche. La partie inférieure du col est couverte de plumes d'un gris-blanc, marquées chacune d'une ligne brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. La poitrine & les côtés sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre; cette couleur est variée sur la poitrine de taches longitudinales brunes, & sur les côtés de taches transversales de la même couleur. Le ventre & le haut des jambes sont blancs & sans taches. Les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc tirant un peu sur le roussâtre, varié de lignes brunes, dont les unes sont lon-

gitudinales, & les autres tranſverſales. Les petites couvertures du deſſous des aîles ſont blanches, & rayées tranſverſalement de brun foncé : les grandes ſont blanches, & rayées tranſverſalement de cendré clair. Les plus petites du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le bord de l'aîle, ſont d'un brun foncé, & bordées de blanchâtre : les grandes les plus proches du corps ſont de la même couleur que les plumes ſcapulaires : les ſuivantes, ſçavoir celles qui occupent le milieu, ſont griſes, bordées de blanc, & marquées d'une ligne brune, qui s'étend tout le long de leur tige : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres; & de celles-là les plus intérieures ſont bordées de blanc par le bout. L'aîle eſt compoſée de trente plumes : les trois premieres ſont d'un noirâtre plus foncé du côté extérieur que du côté intérieur, ayant de plus une grande partie de leur côté intérieur tachetée de blanchâtre, & leur tige blanche : la quatriéme eſt de la même couleur, mais ſon côté intérieur eſt marqué vers ſes bords de taches tranſverſales blanches : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la cinquié-

tudinalibus, alteris tranſverſis variegantur. Inferiores alarum tectrices minores ſunt candidæ, fuſco ſaturato tranſverſim ſtriatæ : majores pariter albæ, tæniis tranſverſis dilutè cinereis variæ. Tectrices alarum ſuperiores minimæ, illæ ſcilicet quæ alarum margines obtegunt, ſunt ſaturatè fuſcæ, candicante fimbriatæ : majores corpori viciniores pennis ſcapularibus concolores : proximè ſequentes, iſtæ ſcilicet quæ medium locum obtinent, griſeæ, albo marginatæ, lineâque fuſcâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, notatæ : majores tandem à corpore remotiores nigricant; ex iſtis autem intimæ albo in apice marginantur. Alam componunt triginta remiges, quarum tres primores ſunt nigricantes, in latere exteriore ſaturatiùs, in interiore dilutiùs, interiùs inſuper maximâ parte candicante maculatæ, & ſcapo albo præditæ : quarta noviſſimè deſcriptis concolor, ſed in latere interiore maculis tranſverſis albis versùs margines inſignita : quinque proximè ſequentes, à quinta ſcilicet ad nonam uſque incluſivè,

nigricantes, maculis transversis albis in utroque latere notatæ : septemdecim quæ sequuntur, à decima scilicet ad vigesimam sextam usque inclusivè, griseæ, maculis transversis candidis in utroque latere insignitæ : quatuor corpori finitimæ in medio secundùm ipsarum scapi longitudinem saturatè fuscæ, ad margines griseæ, fuscoque transversim striatæ. Quæ quatuor nuper descriptæ remiges longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Cauda duodecim constat rectricibus griseis, fusco transversim striatis. Mandibula superior ex fusco rubescit, versùs extremitatem tamen nigricat : mandibula inferior ab ipsius exortu mediam versùs longitudinem usque candicans, in reliqua longitudine fusca, attamen versùs extremitatem nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusco-rubescentes; ungues verò nigricantes. Habitat in *Madagascaria*, unde in *museum Realmurianum* allatus est à *D. Poivre.*

me jusqu'à la neuviéme inclusivement, sont noirâtres, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les dix-sept suivantes, sçavoir depuis la dixiéme jusqu'à la vingt-sixiéme inclusivement, sont grises, & marquées des deux côtés de taches transversales blanches : les quatre plus proches du corps sont d'un brun foncé dans leur milieu selon la longueur de leur tige ; leurs bords sont gris, & rayés transversalement de brun. Ces quatre dernieres plumes sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La queue est composée de douze plumes grises, rayées transversalement de brun. Le demi-bec supérieur est d'un brun-rougeâtre, qui devient noirâtre vers son bout : le demi-bec inférieur est blanchâtre depuis son origine jusque vers la moitié de sa longueur ; ensuite il est d'un brun qui devient noirâtre vers son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un brun rougeâtre ; & les ongles noirâtres. On le trouve à *Madagascar*, d'où il a été apporté à *M. de Reaumur* par *M. Poivre.*

** 4. Le Courly verd.

Voyez Pl. XXVII. Fig. 2.

Numenius ſuperne obſcurè viridi-aureus, cupri puri colore varians; infernè cinereo-fuſcus; capite ſuperiore fuſco, lineis longitudinalibus albidis vario; gutture & collo fuſco-caſtaneis, gutture & colli inferioris parte ſupremâ lineis longitudinalibus albidis variegatis; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; caudâ nonnihil bifurcâ . . . . Numenius viridis.

Numenius ſubaquilus. *Klein. Avi. pag.* 110. *N°.* 8.
Numenius ſive Falconellus puniceo-viridis; Ardeæ ſpecies Marſilli. *Klein. Avi. pag.* 100. *N°.* 7.
Falcinellus puniceo-viridis; Ardeæ ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 44. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 20.
Falcinellus. *Geſn. Avi. pag.* 220, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Falcinellus, ſive Avis falcata. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 422. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 423.
Falcinellus, ſive Falcata. *Jonſt. Avi. pag.* 105. *hujus duæ icones, una à Geſnero, altera ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 7.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 7.
Falcinellus Geſneri & Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 218. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°.* 3.
Falcinellus Geſneri & Aldrovandi, colore furvo. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 42. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 19.
Falcata. *Geſn. icon. Avi. pag.* 116, *in qua hujus icon minùs accurata.*
Les Italiens l'appellent Falcinello. *Geſn. Aldrov.* Ayron negro. *Geſn. Aldrov. Willugh. Marſil.*
Les Allemands, Weltscher-Vogel. Sichler; Sagiser. *Geſn. Aldrov.*
Les Anglois, Scythe-bill'd Heron. *Charlet.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Corlieu*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied ſept pouces, & juſqu'à celui

Numenium minorem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & ſeptem pol-

lices explet, & ad extremos ungues unum pedem & undecim pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & decem lineas longum eſt; cauda eâdem longitudine pollet; pars crurum plumis denudata unum pollicem & undecim lineas longa; pes tres pollices cum linea una; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & decem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus viginti quinque lineas; poſticus autem unum pollicem & quatuor lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque productâ, adnectitur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum & decem pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam pertingunt. Partem capitis ſuperiorem obtegunt pennæ fuſcæ, in utroque latere albido fimbriatæ; unde caput ſuperius lineolis longitudinalibus albidis varie-

des ongles d'un pied onze pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces dix lignes de long; ſa queue a auſſi trois pouces dix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce onze lignes; ſon pied trois pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces dix lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere un pouce quatre lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds dix pouces de vol, & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent jnſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes brunes, bordées des deux côtés de blanchâtre; ce qui rend le deſſus de la tête varié de petites lignes longitudinales de cette couleur. La gorge & le haut de la partie inférieure du col ſont d'un brun tirant un peu ſur le marron, chaque plume étant de même bor-

dée des deux côtés de blanchâtre ; ce qui produit la même variété que deſſus la tête. Le reſte du col eſt d'un brun tirant un peu ſur le marron & ſans taches. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus de la queue ſont d'un verd-doré obſcur, & changeant, ſelon les différentes expoſitions aux rayons de lumiere, en une couleur de cuivre de roſette aſſez brillante. La poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un cendré-brun : on apperçoit cependant ſur la poitrine & les couvertures du deſſous de la queue un peu du même verd-doré que celui du dos. Les moyennes plumes de l'aîle ſont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette : les grandes ſont d'un verd-doré un peu plus foncé. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Les deux du milieu ſont un peu plus courtes que les latérales, qui vont tou-

gatum apparet. Guttur & colli inferioris ſuprema pars ex fuſco nonnihil ad caſtaneum colorem inclinant, & quælibet penna eſt pariter in utroque latere albido fimbriata; unde fit eadem ac in capite ſuperiore varietas. Reliquum collum ex fuſco paululùm ad caſtaneum colorem vergit, & maculis deſtituitur. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne & infernè cooperiunt, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt obſcurè viridi-aureæ, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, cupri puri colore ſatis ſplendido variantes. Pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & inferiores caudæ tectrices ex cinereo fuſceſcunt : in pectore tamen & tectricibus caudæ inferioribus aliquid admiſcetur ejuſdem viridi-aurei quo dorſum perluſtratur. Remiges minores ſunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes : majores ſimiliter imbutæ viridi-aureo, ſed nonnihil ſaturatiore. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duode-

cim

cim rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermediæ lateralibus paululùm longitudine cedunt ; laterales autem sensim atque sensim majorem obtinent longitudinem ad utrinque extimam usque binas intermedias trium linearum longitudine excedentem ; unde cauda explicata nonnihil bifurca apparet. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricantes. Juxta maris littora versatur. *Ex museo D. Mauduyt.*

tes en augmentant un peu de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté qui est plus longue de trois lignes que les deux du milieu ; ce qui fait paroître la queue un peu fourchue, lorsqu'elle est étendue. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirâtres. On le trouve aux bords de la mer. *Du cabinet de M. Mauduyt.*

5. Le Courly marron.

Numenius splendidè castaneus ; pectore viridi ; rectricibus splendidè castaneis .... Numenius castaneus.

Arcuata minor, puniceo colore, pectore virescente. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 40. *hujus icon satis accurata Tab.* 18.

Cum præcedente magnitudine & crassitie circiter convenit. Caput, guttur, collum, dorsum, uropygium, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores splendido imbuuntur castaneo. Pectus eleganti tingitur viridi. Remiges eodem imbuuntur castaneo ac

Il est à peu près de la grosseur & de la grandeur du précédent. La tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont d'un marron brillant. La poitrine est d'un beau verd. Les plumes de l'aîle sont du même marron que celui du

reſte du corps. Les plus proches du dos ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que les plumes de l'aîle. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve ſur les bords du *Danube*.

reliquum corpus ipſum tingitur. Corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Cujus coloris ſint roſtrum & pedes, prorſus me latet. Juxta *Danubii* ripas verſatur.

** 6. Le Courly brun d'Amérique.

Numenius caſtaneo-fuſcus; capite, gutture & collo fuſcis, lineolis longitudinalibus albidis variegatis; uropygio, pennis ſcapularibus & tectricibus alarum ſuperioribus ſplendidè fuſcis, viridi colore variantibus; rectricibus ſuperne concoloribus, ſubtus penitùs fuſcis . . . . Numenius Americanus fuscus.

Ruſticola maritimâ minor. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 147.
Guarauna. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 91, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Guarauna Braſilienſibus, Ruſticola aquatica. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 204, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Jonſt. Avi. pag. 139. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59, *ſub titulo*, Guara.
Guarauna Braſilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°.* 7.
Guarauna Braſilienſibus Marcgravii; Ruſticula aquatica Braſilienſis. *Willugh. Ornith. pag.* 215. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIII.*
Les Braſiliens l'appellent Guarauna. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj. Barr.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *petit Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied neuf pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux

Cum *Numenio minori* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices æquat, & ad extremos

ungues duos pedes & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices, & ſex lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata octodecim lineas; pes tres pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & ſex lineas, intimus duos pollices & quatuor lineas; poſticus autem ſexdecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque protenſâ, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum & ſeptem pollicum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam pertingunt. Caput, guttur & collum veſtiunt plumulæ in medio fuſcæ, in utroque latere albidæ; quò fit ut partes iſtæ lineolis longitudinalibus albidis variegatæ appareant. Dorſum, pectus, ventrem, crurum partem ſupremam & latera obtegunt pen-

pieds neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces ſix lignes de long; ſa queue quatre pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix-huit lignes; ſon pied trois pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces ſix lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere ſeize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds ſept pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La tête, la gorge & le col ſont couverts de petites plumes brunes, dans leur milieu, & blanchâtres ſur les deux côtés; ce qui rend ces parties variées de petites lignes longitudinales blanchâtres. Le dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un marron-brun. Les plumes ſcapulaires, le croupion, & les couvertures

du deſſus & du deſſous de la queue ſont d'un brun brillant & changeant en verd, ſelon les différentes directions des rayons de lumiere. Les couvertures du deſſous des aîles ſont brunes. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un brun brillant & changeant en verd, comme les ſcapulaires : les grandes les plus éloignées du corps ſont de la même couleur du côté extérieur, & tout-à-fait brunes du côté intérieur. Les plumes de l'aîle ſont entiérement brunes, excepté en-deſſus du côté extérieur, où elles ſont d'un brun brillant & changeant en verd. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un brun brillant & changeant en verd en-deſſus, & tout-à-fait brunes en deſſous. Le bec eſt jaunâtre à ſon origine, & brun vers ſon extrémité. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un gris-brun ; & les ongles noirâtres. On le trouve au *Breſil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Réaumur* par *M. des Eſſars*.

næ caſtaneo-fuſcæ. Scapulares, uropygium, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores ſunt ſplendidè fuſcæ, & ſecundùm varios ad lucem objectus, viridi colore variantes. Pennæ alas ſubtus cooperientes ſunt fuſcæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſplendidè fuſcæ, & ſcapularium inſtar, viridi variantes : majores à corpore remotiores in latere exteriore concolores, in interiore penitùs fuſcæ. Remiges quoque fuſcæ, ſuperne tamen in latere exteriore ſplendidè fuſceſcunt & viridi colore variant. Corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conſtat rectricibus ſuperne ſplendidè fuſcis, viridi colore variantibus, ſubtus penitùs fuſcis. Roſtrum in exortu flavicans, versùs extremitatem fuſcum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque griſeo-fuſci ; ungues verò nigricantes. Habitat in *Braſilia* & *Cayana*, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. des Eſſars*.

7. Le Courly varié du Mexique.

Numenius superne purpureo, viridi & nigricante varius, infernè fuscus, rubro variegatus; capite anteriore nudo, albo-rubescente; collo fusco, albo, viridi & fulvescente vario; rectricibus viridibus, cupri puri colore variantibus; rostro cyaneo; pedibus nigricantibus . . . . . Numenius Mexicanus varius.

Corvus aquaticus. *Eus. Nieremb. pag.* 215.
Acacalotl, seu Corvus aquaticus. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 15. *Cap. IX. Jonst. Avi. pag.* 127.
Acacalotl, seu Corvus aquaticus Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 218.
Acacalotl, seu Corvus aquaticus Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 104. *N°.* 5.
Les Mexiquains l'appellent Acacalotl. *Fern.*

Crassitie præcedentem multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem tres circiter pedes æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque octo pollices longum est. Crura, pedesque, simul commensurati, tredecim pollicum & sex linearum longitudinem obtinent. Capitis anterior pars, à rostro scilicet ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo albo-rubescente obtegitur. Caput posterius & collum vestiunt pennæ fuscæ, albæ & virides, quibusdam ad fulvum vergentibus admixtis. Dorsum & uropygium purpureo, viridi & ni-

Il est beaucoup plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ trois pieds. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a huit pouces de long. Ses jambes & ses pieds sont, pris ensemble, longs de treize pouces six lignes. La partie antérieure de la tête, depuis le bec jusqu'au-delà des yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un blanc-rougeâtre. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes brunes, blanches & vertes, & de quelques-unes qui tirent sur le fauve. Le dos & le croupion sont variés de pourpre, de verd &

de noirâtre, mêlés confuſément enſemble, le tout étant fort brillant. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont variées des mêmes couleurs. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont couverts de plumes brunes, auxquelles ſont mêlées quelques plumes rouges. Les couvertures du deſſous de la queue ſont pareillement brunes, & mêlées de quelques plumes rouges. Le deſſous des aîles eſt d'un verd brillant & changeant, ſelon les différens jours auxquels il eſt expoſé. Les couvertures du deſſus des aîles ſont vertes. Les plumes de l'aîle ſont d'un verd brillant, & changeant en couleur de cuivre de roſette. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles. Les yeux ſont noirs: leur iris eſt d'un rouge de ſang. Le bec eſt bleu. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont noirâtres; & les ongles noirs. On le trouve au *Méxique*. Il ſe tient ſur les bords des Lacs, & ſe nourrit de *Poiſſons*.

gricante confuſè mixtis variegantur; omnes autem colores iſti ſunt valdè ſplendentes. Scapulares pennas & ſuperiores caudæ tectrices iidem colores variegant. Pectus, ventrem, crurum partem ſupremam & latera cooperiunt pennæ fuſcæ, pennis quibuſdam rubris interſertis. Inferiores caudæ tectrices fuſco quoque imbutæ, pennis quibuſdam rubris ſimiliter admixtis. Alæ ſubtus ſplendidè virides, & pro vario quo lucis radii incidunt modo, variantes. Superiores alarum tectrices virides. Remiges ſplendidè virides, cupri puri colore variantes. Corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Alam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Oculi ſunt nigri: ipſorum irides ſanguineæ. Roſtrum cyaneum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque nigricantes; ungues verò nigri. Habitat in *Mexico*. Juxta Lacuum ripas verſatur, & *Piſcibus* victitat.

** 8. Le grand Courly d'Amérique.

Numenius albidus ; capite anteriore nudo, nigro-cœruleſcente ; capite poſteriore, & collo griſeis ; uropygio nigro-vireſcente ; remigibus majoribus & rectricibus ſuperne nigro-vireſcentibus, ſubtus nigris ; roſtro fuſco-rubeſcente ; pedibus nigris . . . . Numenius Americanus major.

Numenius niger. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 6.
Tantalus ; Loculator. *Klein. Avi. pag.* 127. *Lit. C.*
Linn. Syſth. Nat. ed. 10. *Gen.* 75. *ſp.* 1.
Curicaca. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 88, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Curicaca Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Jonſt. Avi. pag. 131. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 57.
Curicaca Braſilienſium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 218. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.*
Raj. Syn. Avi. pag. 103. *N°.* 4.
Curiaca, Oiſeau de Riviere. *Des March. Tom. III. pag.* 326.
Pélican Américain. *Catesb. Tom. I. pag.* 81 ; *avec une très-bonne figure Pl.* 81.
Les Portugais l'appellent Masarino. *Marcgr. Piſon. Jonſt. Willugh. Raj. Klein.*
Les Anglois, Wood Pelican. *Catesb.*
Les Braſiliens, Curicaca. *Marcgr. Jonſt. Willugh, Raj.*

Ad *Anſeris* craſſitiem accedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem pollices & ſex lineas longum eſt ; cauda quatuor pollices & novem lineas ; pars crurum plumis denudata tres polli-

Il eſt preſqu'auſſi gros qu'une *Oye*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a neuf pouces ſix lignes de long ; ſa queue quatre pouces neuf lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces ; ſon pied

quatre pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds onze pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau d'un noir-bleuâtre. La partie poſtérieure de la tête & le col ſont couverts de plumes griſes. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, ainſi que les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſous de la queue, ſont blanchâtres. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir-verdâtre. Les couvertures du deſſous des

ces; pes quatuor pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & totidem lineas, extimus duos pollices & tres lineas, intimus duos pollices cum linea unica; poſticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum trium pedum & undecim pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo nigro-cœruleſcente obtegitur. Caput poſterius & collum pennis veſtiuntur griſeis. Quæ partem dorſi ſupremam, pectus, ventrem, crurum ſupremam partem & latera obtegunt, ſicut & ſcapulares, inferioreſque caudæ tectrices, ſunt albidæ. Dorſum infimum, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices ex nigro vireſcunt.

Pennæ

Pennæ alàs subtus obtegentes sunt candicantes. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ : majores à corpore remotiores nigro-viresçentes. Remiges majores superne ex nigro quoque viresçunt, subtus sunt penitùs nigræ : minores candicantes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus superne nigro-viresçentibus, subtus penitùs nigris. Oculi sunt nigri : ipsorum irides rufesçentes. Rostrum, quod versùs caput crassissimum, ex fusco rubesçit. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungues que nigri. *Piscibus* & *Animalibus aquaticis* victitat. Habitat in *Carolina*, *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

aîles sont blanchâtres. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps, sont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont en-dessus de cette derniere couleur, & tout-à-fait noires en-dessous : les moyennes sont blanchâtres. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs ; & leur iris est roussâtre. Le bec, qui est très-gros vers la tête, est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Il se nourrit de *Poissons* & d'*Animaux aquatiques*. On le trouve à *la Caroline*, au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

9. Le petit Courly d'Amérique.

Numenius albidus ; capite anteriore nudo, nigro ; capite posteriore, & collo grisèis ; uropygio nigro-viresçente ; re-

migibus majoribus & rectricibus ſuperne nigro-vireſcentibus, ſubtus nigris; roſtro fuſco-rubeſcente; pedibus pallidè rubris. . . . . NUMENIUS AMERICANUS MINOR.

Matuitui. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 88.
Curicacæ alia ſpecies, Matuitui dicta. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 191.
Jonſt. Avi. pag. 131.
Willugh. Ornith. pag. 218.
Les Braſiliens l'appellent MATUITUI. *Marcgr. Jonſt. Willugh.*

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Poule*. La partie antérieure de ſa tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau noire. Le derriere de la tête & le col ſont couverts de plumes griſes. Celles qui couvrent la partie ſupérieure du dos, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés, ſont blanchâtres. Les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſous des aîles & celles du deſſous de la queue ſont de la même couleur. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir-verdâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont blanches : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un noir-verdâtre. Les grandes plumes de l'aîle ſont en-deſſus de cette derniere couleur, & tout-à-fait noires en-deſſous :

Craſſitie *Gallinam* circiter æmulatur. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo nigrâ obtegitur. Caput poſterius & collum veſtiunt pennæ griſeæ. Quæ partem dorſi ſupremam, pectus, ventrem, crurum ſupremam partem & latera cooperiunt, ſunt albidæ. Scapulares, quæ alas ſubtus obtegunt, inferioreſque caudæ tectrices eodem colore imbutæ. Dorſi pars infima, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices ſunt nigro-vireſcentes. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori viciniores, candidæ : majores à corpore remotiores nigro-vireſcentes. Remiges majores ſuperne ex nigro quoque vireſcunt, ſubtus verò ſunt penitùs nigræ : minores candicantes. Ex minoribus autem corpori finitimæ lon-

gæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices superne nigro-virescentes, subtus penitùs nigræ. Oculi sunt nigri : ipsorum irides rufescentes. Rostrum fusco-rubescens. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri : ungues verò nigri. Præcedentis instar, *Piscibus* & *aquaticis Animalibus* victitat. Habitat in *Brasilia*.

les moyennes sont blanchâtres. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un noir-verdâtre en-dessus, & tout-à-fait noires en-dessous. Les yeux sont noirs : leur iris est roussâtre. Le bec est d'un brun-rougeâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle ; & les ongles noirs. Il se nourrit, comme le précédent, de *Poissons* & d'*Animaux aquatiques*. On le trouve au *Brésil*.

** 10. Le Courly blanc du Brésil.

Numenius albus ; capite anteriore nudo, pallidè rubro ; remigibus quatuor majoribus apice nigro-virescentibus ; rectricibus candidis ; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . Numenius Brasiliensis candidus.

Numenius albus. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 3.
Scolopax rostro arcuato, pedibus rubris, corpore albo, alarum apicibus viridibus. Scolopax alba. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *Sp.* 2.
Corlieu blanc. *Catesb. Tom. I. pag.* 82 ; *avec une figure exacte Pl.* 82.
Les Anglois l'appellent White Curlew. *Catesb.*

Crassitie *Numenium minorem nostratem* multùm superat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem unde-

Il est beaucoup plus gros que *notre petit Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied onze pouces trois lignes, & jus-

qu'à celui des ongles de deux pieds deux pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue trois pouces neuf lignes; la partie des ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds huit pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau d'un rouge pâle. Le derriere de la tête, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du

cim pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes & totidem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda tres pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & ſex lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum protenſâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum & octo pollicum; alæ verò complicatæ ferè ad extremitatem caudæ pertingunt. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obducitur. Caput poſterius, collum, univerſumque corpus veſtiunt pennæ

albæ. Scapulares, quæ alas superne & infernè obtegunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Remiges quatuor primores sunt candidæ, attamen in apice ex nigro obscurè virescunt : reliquæ omnes penitùs albent. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Oculorum irides eleganter griseæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque pallidè rubri. *Fœmina* à *mare* nullo modo discrepat. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Cayana* in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les quatre premieres plumes de l'aîle sont blanches, excepté leur extrémité, qui est d'un noir-verd obscur : toutes les autres sont entiérement blanches. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un rouge pâle. La *femelle* ne différe point du *mâle*. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

** 11. Le Courly brun du Brésil.

Numenius superne fuscus, infernè albus ; capite anteriore nudo, pallidè rubro ; capite posteriore & collo dilutè fuscis ; uropygio candido ; rectricibus fuscis ; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . . Numenius Brasiliensis fuscus.

Numenius fuscus. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 4.
Arquata cinerea. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 126.
Arquata Americana cinerea. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp.* 5.
Scolopax rostro arcuato, pedibus rubris, corpore fusco, cauda basi alba. Scolopax fusca. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 3.
Corlieu brun. *Catesb. Tom. I. pag.* 83 ; *avec une figure exacte Pl.* 83.

Les François de la Guiane l'appellent FLAMANT GRIS. *Barr.*
Les Anglois, BROWN CURLEW. *Catesb.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue trois pouces ſept lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatorze lignes; ſon pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds ſept pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes unum pollicem & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda tres pollices & ſeptem lineas; pars crurum plumis denudata quatuordecim lineas; pes duos pollices cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & ſex lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum ſeptem pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam ferè extre-

mam attingunt. Capitis anterior pars, ab exortu rostri ultra oculos usque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obtegitur. Caput posterius & collum pennis vestiuntur dilutè fuscis. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices sunt fuscæ. Dorsum infimum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices albicant. Pennæ alas subtus obtegentes sunt dilutè fuscæ. Remiges fusco saturatiore tinctæ. Corpori viciniores longæ sunt & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuscis cauda conflatur. Oculorum irides elegantèr griseæ. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò fusci. *Fœmina* cum *mare* satis benè convenit. Habitat in variis *Americæ* regionibus. A *Cayana* in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars.*

yeux, est dégarnie de plumes, & couverte seulement d'une peau d'un rouge pâle. La partie postérieure de la tête & le col sont couverts de plumes d'un brun clair. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont brunes. La partie inférieure du dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les couvertures du dessous des aîles sont d'un brun clair. Les plumes de l'aîle sont d'un brun plus foncé. Les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes brunes. L'iris des yeux est d'un joli gris. Le bec, la partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles bruns. La *femelle* ressemble assez bien au *mâle*. On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. des Essars.*

** 12. Le Courly rouge du Brésil.

Voyez Pl. XXIX. Fig. 1. & celui du moyen âge Fig. 2.

Numenius coccineus; capite anteriore nudo, pallidè rubro; remigibus binis majoribus apice nigro-chalybeis; rectricibus coccineis, scapis primâ medietate albis; rostro, pedibusque pallidè rubris. . . . . Numenius Brasiliensis coccineus.

Numenius ruber. *Klein. Avi. pag.* 109. *N°.* 5.
Numenius Indicus. *Clus. exot. Auctuar. pag.* 366, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Arquata phœnicea. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 126.
Arquata Americana phœnicea. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp.* 6.
Scolopax rostro arcuato; pedibus rubris, corpore sanguineo, alarum apicibus nigris. Scolopax rubra. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 77. *sp.* 1.
Guara. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 575.
Jonst. Avi. pag. 151.
Guara Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 203, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 139. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.
Guara Brasilienſibus Marcgravii. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 317. *N°. VIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 104. *N°. 6.*
Guara Brasilienſibus Marcgravii; Numenius Indicus Clusii. *Willugh. Ornith. pag.* 219. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LIV.*
Guara Brasilianis dicta. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. III.*
Charlet. Onomazt. pag. 116. *N°. III.*
Avis Brasiliana Guará dicta. *Mus. Worm. pag.* 308, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Ibis. *Moehr. Avi. Gen.* 80.
Ardea porphyrio. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 11.
Avis porphyrio, Amboinenſis; ſeu Ardea rubra, Carollina, Ibidis ſpecies. *Seb. Vol. I. pag.* 98. *hujus icon ſatis accurata Tab. LXII. fig.* 3.
Corlieu rouge. *Catesb. Tom. I. pag.* 84; *avec une figure exacte Pl.* 84.
Les François de la Guiane l'appellent Flamant rouge. *Barr.*
Les Anglois, Scarlet Curlew of Brasil. *Charlet.* Red-Curlew. *Catesb.*
Les Braſiliens, Guara. *Maregr. Jonst. Willugh. Raj. Charlet.*

Numenio

Numenio Brasilienſi candido paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem unum pedem novem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & decem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices & novem lineas longum eſt; cauda tres pollices & decem lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes duos pollices & octo lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum ſex lineis; extimus duos pollices, intimus unum pollicem & decem lineas; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & cum digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum protenſâ, connectitur. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt duorum pedum ſeptem pollicum & ſex linearum; alæ verò complicatæ caudam ferè extremam attingunt.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le *Courly blanc du Bréſil.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied neuf pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces dix lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces neuf lignes de long; ſa queue trois pouces dix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce; ſon pied deux pouces huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds ſept pouces ſix lignes de vol; & ſes ailes, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau d'un

rouge pâle. Le derriere de la tête, le col & tout le corps ſont couverts de plumes d'un rouge très-vif & très-éclatant. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Toutes les plumes de l'aîle ſont du même rouge que celui du corps ; mais les grandes ont leur tige blanche depuis leur origine juſque vers leur extrémité ; & les moyennes ont auſſi leur tige blanche, mais ſeulement depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur : de plus les deux premieres plumes de l'aîle ſont terminées d'un noir brillant comme l'acier poli, & cela dans l'eſpace de deux pouces du côté extérieur, & d'un pouce neuf lignes du côté intérieur. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes du même rouge que celui des plumes de l'aîle, & qui ont leur tige blanche depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur. Les yeux ſont noirs. Le bec, la partie des jambes

Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo pallidè rubrâ obtegitur. Capitis pars poſterior, collum, univerſumque corpus pennis veſtiuntur ſplendidiſſimè coccineis. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè obtegunt, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores eodem colore perluſtrantur. Remiges alarum omnes eodem imbuuntur coccineo ac corpus ipſum tingitur ; majores tamen ſcapis donantur ab ipſarum exortu versùs extremitatem uſque candidis ; minores verò ſcapis quidem albis prædítæ ſunt, ſed tantummodo ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque : binæ inſuper primores remiges ſunt in apice nigro-chalybeæ, idque in latere exteriore per ſpatium duorum pollicum, in interiore verò per unius pollicis & novem linearum intervallum. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices eodem imbutæ coccineo ac

ipsæ remiges, & quarum scapi ab ipsarum exortu mediam versùs longitudinem usque albent. Oculi sunt nigri. Rostrum, pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè rubri; ungues verò griseo-fusci.

qui est dégarnie de plumes & les pieds sont d'un rouge pâle; & les ongles gris-bruns.

Hæc Avis primùm exclusa coloris est in universo corpore saturatè fusci; hinc evadit grisea; deinde, ætate provectâ, alba efficitur, & tandem sensim atque sensim rubescit; ita tamen ut rubescere incipiat antequam griseus color penitùs deleatur; unde fit ut secundo ætatis anno griseo, albo & rubro sit variegata: & tandem, dum magìs magìsque senescit, splendidissimum illum colorem coccineum acquirit.

Cet Oiseau, en naissant, est entiérement d'un brun foncé; ensuite il devient gris; après quoi, à mesure qu'il avance en âge, il passe à la couleur blanche, & enfin peu à peu devient rouge; mais de façon que le rouge commence à paroître avant que le gris soit entiérement disparu; de sorte que dans la seconde année de son âge il est varié de gris, de blanc & de rouge: enfin en vieillissant il devient d'un rouge très-vif & très-éclatant.

Habitat in variis *Americæ* regionibus inter Tropicos positis, præsertim *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. des Essars*.

On le trouve en différens endroits de l'*Amérique*, entre les Tropiques, sur-tout au *Bréſil*, & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. des Essars*.

13. L'Ibis.

Numenius niger; capite anteriore nudo, rubro; rectricibus nigris; rostro, pedibusque rubris. . . . . Ibis.

Numenius holosericus. *Klein. Avi. pag.* 110. *N°.* 9.
Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris. Ibis nigra. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 18. *var.* β.

Gallinago ſylveſtris aquatica. *Gaz. Rup. Beſl. hujus icon non ſatis accurata Tab.* 19.
Muſ. Beſl. pag. 31. *N°.* 2. *hujus icon non ſatis accurata Tab. VIII. N°.* 2.
Jonſt. Avi. pag. 160.
Ibis. *Geſn. Avi. pag.* 567.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 312. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 313.
Jonſt. Avi. pag. 101. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
Moehr. Avi. Gen. 80.
Ibis nigra. *Bell. Obſ. pag.* 103.
Charlet. Exer. pag. 108. *N°. II.*
Charlet. Onomazt. pag. 102. *N°. II.*
Ibis nigra Bellonii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 98.
Ibis Bellonii. *Willugh. Ornith. pag.* 212. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.*
Ibis. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 199, *avec une figure peu exacte pag.* 200.
Eſpece de Cigogne noire. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 44 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.*
Les Grecs l'appellent Ἴβις. *Bel. Geſn. Aldrov.*
Les Egyptiens, LEHERAS *ou* JEHERAS. *Aldrov.*

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le *Coùrly*. La partie antérieure de ſa tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'une peau rouge. Le derriere de la tête, le col & tout le corps ſont couverts de plumes noires. Les plumes de l'aîle & celles de la queue ſont de la même couleur. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, &

Numenio paululùm craſſitie cedit. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubrâ obducitur. Capitis poſteriorem partem, collum & corpus univerſum veſtiunt pennæ nigræ. Remiges, ſicut & rectrices, eodem imbuuntur colore. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri ſunt coloris;

ungues verò nigri. Habitat in *Ægypto.*

les pieds sont rouges; & les ongles noirs. On le trouve en *Egypte.*

14. L'Ibis blanc.

Numenius sordidè albo-rufescens; capite anteriore nudo, rubro; lateribus rubro-purpureo & carneo colore maculatis; remigibus majoribus nigris; rectricibus sordidè albo-rufescentibus; rostro in exortu dilutè luteo, in extremitate aurantio; pedibus grisеis. . . . . Ibis candida.

Ardea capite lævi, corpore albo, rostro flavescente apice pedibusque nigris. Ibis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 18.

Ardea capite lævi, corpore albo, remigibus duabus primis margine exteriore fuscis. Ardea æquinoctialis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 19.

Ibis non ex toto nigra. *Prosp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag.* 199.

Ibis blanc. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag.* 61; *avec une figure assez exacte Pl.* 13.

Ciconiæ albæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes sex pollices & quatuor lineas æquat, & ad extremos ungues trés pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata quatuor pollices cum quinque lineis; pes septem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus duos pollices & octo lineas, intimus duos pollices cum tribus li-

Il n'est pas si gros que la *Cigogne blanche.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds six pouces quatre lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds six pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces cinq lignes; son pied sept pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces huit lignes, l'intérieur deux pouces trois lig-

nes ; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec juſqu'au-delà des yeux, eſt dégarnie de plumes, & couverte ſeulement d'un peau rouge & ridée. Le derriere de la tête, le col, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont d'un blanc ſale & rouſſâtre. Les côtés ſont de la même couleur, & variés de taches, dont les unes ſont d'un rouge-pourpré, & les autres de couleur de chair. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les moyennes ſont d'un blanc ſale & rouſſâtre. De celles-ci, les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La

neis; poſticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, tantummodo ad primum uſque articulum protenſâ, coadunatur. Alæ complicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Capitis anterior pars, ab exortu roſtri ultra oculos uſque, plumis denudatur, & cute tantummodo rubrâ & rugoſâ obtegitur. Caput poſterius, collum, dorſum, uropygium, pectus, venter, crurum ſuprema pars, pennæ ſcapulares, quæ alas ſuperne & infernè cooperiunt, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores ex ſordidè albo rufeſcunt. Latera eodem colore tinguntur, & maculis variegantur, aliis rubro-purpureis, alteris carneo colore imbutis. Remiges alarum majores ſunt nigræ : minores ſordidè albo-rufeſcentes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6

Echelle de 6. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Petit Courly ou Corlieu.

2. Courly verd.

Dessine et Gravé par Martinet.

Courly de Madagascar.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6
Echelle de 6. pouces.

Dessinée et Gravée par Martinet.

1. Courly rouge du Brésil.

2. Courly rouge du Brésil, du moyen âge.

sordidè albo-rufescentibus. Rostrum, quod in exortu sesquipollicis diametrum obtinet, estque in extremitate quasi truncatum, est in exortu dilutè luteum; qui color magìs magìsque fit saturatior, & tandem versùs rostri extremitatem aurantius evadit. Pars crurum plumis denudata rubra. Pedes sunt grisei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ægypto.*

queue est composée de douze plumes d'un blanc sale & roussâtre. Le bec, qui a à son origine un pouce & demi de diametre & est comme tronqué à son extrémité, est d'un jaune clair à son origine; cette couleur devient de plus en plus foncée, & est orangée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, est rouge. Les pieds sont gris; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Egypte.*

SECTIO VII.

Eæ quæ rostrum habent rectum, horizontaliter planum; ipsius apice ampliato, subrotundo, spathæformi.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Plateæ.*

LXXIX.

Genus Plateæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata;

SECTION VII.

Ceux qui ont le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout est plus large & arrondi en forme de spatule.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Spatule.*

LXXIX.

Le genre de la Spatule.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:

Le bec droit, plat horizontalement; & dont le bout eſt plus large & arrondi en forme de ſpatule.

Roſtrum rectum, horizontaliter planum; ipſius apice ampliato, ſubrotundo, ſpathæformi.

** La Spatule.

Platea criſtata, in toto corpore candida; oculorum ambitu & gutture nudis, nigris. . . . . Platea.

Platea candida. *Barr. Ornith Claſſ. III. Gen. XXIX. ſp.* 1.
Platea. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 48. *ſp.* 1.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 341.
Platea, Leucorodius Willughbeii. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 1.
Platea, ſive Pelecanus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 212. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 102. *N°.* 1.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Platea, ſive Pelicanus Aldrovandi; Leucorodius, ſeu Albardeola Willughbei. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 28. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 12.
Platalea corpore albo. Leucorodia. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *ſp.* 1.
Pelecanus. *Geſn. Avi. pag.* 665. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 666.
Moehr. Avi. Gen. 60.
Pelecanus, Platea, vel Platalea. *Geſn. icon. Avi. pag.* 92, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Pelicanus Geſneri; Platea Plinii; Platelea Ciceronis; Anſer Cochlearius; Cochlearia; Anſer platorynchos; Albardeola; Leucorodius.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 407.
Albardeola. *Muſ. Worm. pag.* 310.
Albardeola, Platea Plinii, Platelea Ciceronis, quam Pelecanum facit Ornithologus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 384. *hujus icon ſatis accurata pag.* 385; *& altera icon minùs accurata pag.* 386.
Platyrinchos. *Muſ. Beſl. pag.* 36. *N°.* 4. *hujus capitis icon ſatis accurata Tab. IX. N°.* 4.
Ardea alba. *Jonſt. Avi. pag.* 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 46, *ſub titulo*, Pelicanus, ſive Platea.
Ardea alba, Cochlearia, Plateola. *Charlet. Exer. pag.* 109. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 2.
Anas roſtro plano, apice dilatato, rotundatoque. *Faun. Suec. Linn. N°.* 87.

Πελεκάνος,

Πελεκάνος, Arist. *Schwenck. Klein.*
Pallette. *Hist. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag.* 23; *avec une figure exacte Pl.* 5.
Pale, Poche & Cueiller. *Bel. Hist. Nat. desOis. pag.* 194, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*
Pale, Poche, Cueiller, Truble. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 43 *a*, *dans laquelle est la même figure.*
Pélican. *Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag.* 173; *avec une figure passable pag.* 172. *N°.* 4.
Petit Héron, ou Bec à Cuiller. *Alb. Tom. II. pag.* 42; *avec une mauvaise figure Pl.* 66.
Les Hébreux l'appellent KAATH. *Gesn.*
Les Grecs, Πελεκάν. *Gesn. Schwenck.* Λευκοφαῖος. *Bel. Aldrov.* Λευκοφαῖος. *Jonst.*
Les Catalans, PELLICANO. *Bar.*
Les Italiens, BECQUAROVEGLIA. *Bel.* BECCAROVEGLIA. *Gesn. Aldrov. Marsil. Klein.*
Les Allemands, PELECAN. *Schwenck.* PELICAN. *Rzac.* LOEFFLER. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*
Les Allemands aux environs de Cologne, LEFLER. *Gesn. Aldrov.*
Les Siléſiens, LOEFFEL-GANS. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Worm. Best. Rzac.*
Les Suisses, SCHUFLER. *Aldrov.*
Les Hollandois, LEEPELAER. *Aldrov.*
Les Flamands, LEPELAER. *Willugh. Raj. Sibbald. Klein.*
Les Frisons, LEPLER. *Gesn. Aldrov.*
Les Illyriens, BUCACZ. *Gesn.*
Les Polonois, PELIKAN; PLASKONOS. *Rzac.*
Les Russiens, CALPETRE. *Klein.*
Les Suédois, PELEKAN. *Linn.*
Les Anglois, PELLICANE. *Raj.* SPOON-BILL. *Willugh. Raj. Alb.* WHITE AND SPOON-BILL'D HERON; SCHOVELER; MIRE-DRUMBEL. *Charlet.* SCHOVELARD; SCHOFLER. *Aldrov.*
Les Hollandois du Cap de Bonne Espérance, SLANGEN-VREETER. *Kolbe.*

Cum *Ardea vulgari* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem duos pedes & octo pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes & duos pollices. Rostrum ab ipsius ex-

Elle est à peu près de la grosseur du *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins

de la bouche a ſix pouces cinq lignes de long; il eſt large de ſept lignes vers le milieu de ſa longueur, & d'un pouce ſept lignes vers ſon extrémité, qui eſt la partie arrondie en forme de ſpatule. Sa queue a quatre pouces neuf lignes de long; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces ſix lignes; ſon pied quatre pouces ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne, l'extérieur deux pouces ſept lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend preſque juſqu'à la ſeconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend ſeulement juſqu'à la premiere articulation. Elle a quatre pieds quatre pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La gorge & le tour des yeux ſont dégarnis de plumes, & couverts ſeulement d'une peau noire. Le reſte de la tête, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous

tremitate ad oris angulos uſque ſex pollices & quinque lineas longum eſt; versùs mediam longitudinem ſeptem lineas latum, & versùs ipſius extremitatem, quæ pars eſt ſubrotunda & ſpathæformis, unius pollicis & ſeptem linearum latitudinem obtinens. Cauda quatuor pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata tres pollices cum ſex lineis; pes quatuor pollices & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & ſeptem lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; poſticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ferè ad ſecundum uſque articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & totidem pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Guttur & oculorum ambitus plumis denudantur, & tantum-

modo cute nigrâ obsiti sunt. Reliquum caput, collum & universum corpus vestiunt pennæ candidæ. Scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Pennæ in occipitio sunt strictissimæ, quatuor pollices & tres lineas longæ, elegantemque cristam, collo incumbentem, efformant. Remiges omnes sunt candidæ. (In quibusdam majores nigro terminantur). Secunda reliquas omnes longitudine excedit. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Rostrum in quibusdam griseo-fuscum; in aliis nigrum; in alteris versùs ipsius exortum griseo-fuscum, maculis nigris aspersum, & versùs extremitatem flavicans, maculis rubescentibus respersum. Mandibulæ superioris extremitas paululùm deorsum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obtegit. Supra mandibulam superiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedesque in aliis nigri, in alteris griseo-fusci; ungues verò nigri. *Piscibus* victitat, & in excelsarum arborum cacuminibus nidificat. *Ex museo Realmuriano.*

des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les plumes qui couvrent l'occiput, sont fort étroites, longues de quatre pouces trois lignes, & forment une jolie hupe, qui retombe sur le col. Toutes les plumes de l'aîle sont blanches. (Dans quelques-unes les plus grandes sont terminées de noir). La seconde est la plus longue de toutes. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un gris-brun dans quelques-unes; dans d'autres il est noir; & dans d'autres il est vers son origine d'un gris-brun semé de taches noires, & vers son extrémité il est jaunâtre, semé de taches rougeâtres. Le bout de la mandibule supérieure est un peu recourbé en-dessous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec supérieur regne tout autour une rainure parallele à sa circonférence. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont noirs dans les unes & d'un gris-brun dans d'autres : les ongles sont noirs. Elle se nourrit de *Poissons*, & fait son nid au sommet des grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Spatule couleur de rose.

Voyez Pl. XXX.

Platea roſea ; capite anteriore & gutture nudis, candicantibus ; collo ſupremo candido ; tectricibus caudæ ſuperioribus & inferioribus coccineis ; rectricibus roſeis. . . . .
Platea rosea.

Platea Americana, albo roſeoque colore mixta. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXIX. ſp.* 2.
Platea Braſilienſis. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 2.
Platea Braſilienſis Ajaia dicta Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 3.
Platea Braſilienſis, Ajaia dicta, Luſitanis Colherado, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 213.
Platalea corpore ſanguineo. Ajaja. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *ſp.* 2.
Ardea roſea, Spatula dicta. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 124.
Ajaia Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 204.
Jonſt. Avi. pag. 139.
Ayaya. *Joan. de Laët. Nov. Orb. pag.* 575.
Jonſt. Avi. pag. 150.
Les François de la Guiane l'appellent Spatule ; Espatule. *Barr.*
Les Portugais, Colherado. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj. Klein.*
Les Flamands, Lepelaer. *Marcgr. Jonſt.*
Les Braſiliens, Ajaia. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Elle n'eſt pas ſi groſſe que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds trois pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds huit pouces huit lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces cinq lignes de long ; il eſt large de huit lignes & demie vers le milieu de ſa

Præcedenti craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes tres pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues duos pedes octo pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius extremitate ad oris angulos uſque quinque pollices & totidem lineas longum eſt, versùs mediam longitudinem

octo cum semi lineas latum, & versùs ipsius extremitatem, quæ pars est subrotunda & spathæformis, unius pollicis & decem linearum latitudinem obtinens. Cauda tres pollices & novem lineas longa; pars crurum plumis denudata duos pollices & quatuor lineas; pes tres pollices cum sex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum linea una, extimus duos pollices & novem lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ferè ad secundum usque articulum extensâ, & ad digitum intimum membranâ alterâ, solummodo ad primum usque articulum protensâ, adnectitur. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est trium pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Capitis universa pars anterior, ab exortu rostri ultra oculos usque, sicut & guttur, plumis denudatur, & tantummodo cute candicante obsita est. Caput posterius & cervicis pars ad duas tertias longitudinis plumis candicantibus minutissimis tectum est. Pedes

longueur, & d'un pouce dix lignes vers son extrémité, qui est la partie arrondie en forme de spatule. Sa queue a trois pouces neuf lignes de long; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces quatre lignes; son pied trois pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces une ligne; l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend presque jusqu'à la seconde articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui s'étend seulement jusqu'à la premiere articulation. Elle a trois pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Toute la partie antérieure de la tête, depuis l'origine du bec jusqu'au-delà des yeux, & la gorge sont dégarnies de plumes, & couvertes seulement d'une peau blanchâtre. Le derriere de la tête, & le col depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, sont couverts de très-petites plumes blanches. Le

reſte du col & la poitrine ſont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de couleur de roſe, avec un peu de couleur de roſe plus foncé à la partie inférieure du col immédiatement au-deſſus de la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du deſſous des aîles ſont de couleur de roſe; il y a cependant vers le bas des côtés quelques plumes d'un rouge très-vif. Les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont de ce même rouge vif: les moyennes & les grandes, ainſi que toutes les plumes de l'aîle, ſont de couleur de roſe. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur. Le bec eſt d'un gris-blanc. Comme dans la précédente, le bout de la mandibule ſupérieure eſt un peu recourbé en-deſſous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec ſupérieur regne auſſi tout autour une rainure parallele à ſa circonférence. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve au *Bréſil* & dans *la Guiane*. Elle a été envoyée de

terius, collumque ab ipſius exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque veſtiunt minutiſſimæ plumulæ candidæ. Reliquum collum & pectus albicant, & aliquid roſei admixtum habent; qui color roſeus in parte colli inferiore immediatè ſupra pectus eſt paulò ſaturatior. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque alarum tectrices roſeo colore tinguntur; attamen versùs laterum partem infimam quædam extant pennæ ſplendidè coccineæ. Quæ caudam ſuperne & infernè cooperiunt, & tectrices alarum ſuperiores minimæ ſunt ſimiliter coccineæ: mediæ & majores, ſicut & remiges omnes, roſeæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Roſtrum cinereo-album. Præcedentis inſtar, mandibulæ ſuperioris extremitas paululùm deorſum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem obtegit. Supra mandibulam ſuperiorem in toto ambitu canaliculus ſimiliter extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt griſei; ungues verò ni-

gricantes. Habitat in *Brasilia & Guiana.* A *Cayana* in *museum Realmurianum* missa est à *D. Artur.*

Cayenne à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

3. La Spatule rouge.

Platea coccinea; capite anteriore & gutture nudis, candicantibus; torque nigro; collo supremo candido; rectricibus coccineis. . . . . Platea coccinea.

Platea incarnata. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 316. *N°. VII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 5.
Platea Americana Phœnicea. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXIX. sp.* 3.
Platea sanguinea tota. *Klein. Avi. pag.* 126. *N°.* 3.
Platalea corpore sanguineo. Tlauhquechul s. Platea Mexicana. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 73. *sp.* 2. *var.* β.
Ardea phœnicea, Spatula dicta. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 125.
Avis vivivora. *Eus. Nieremb. pag.* 214.
Tlauhquechul. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 49. *cap. CLXXVIII.*
Jonst. Avi. pag. 126.
Tlauhquechul, seu Platea Mexicana Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 213.
Tlauhquechul, seu Platea Mexicana Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 2.
Tlauquechul. *Charlet. Exer. pag.* 119. *N°. II.*
Charlet. Onomazt. pag. 116. *N°. II.*
Les François de la Guiane l'appellent Spatule rouge; Espatule rouge. *Barr.*
Les Portugais, Colherado. *Sloane. Raj.*
Les Flamands, Lepelaer. *Sloane. Raj.*
Les Anglois, American Scarlet Pelecan; American Scarlet Spoon-bill. *Sloane. Raj.* Scarlet Spoon-bill'd Bird of America. *Charlet.*
Les Mexiquains, Tlauhquechul. *Fern.*
Les Brasiliens, Aiaia. *Sloane. Raj.*

Cum præcedente crassitie convenit, & forsan illius est varietas. Caput anterius, ab exortu rostri ultra oculos

Elle est de la grosseur de la précédente, & en est peut-être une variété. La partie antérieure de la tête, depuis l'origine du

bec juſqu'au-delà des yeux, & la gorge ſont dégarnies de plumes, & couvertes ſeulement d'une peau blanchâtre & ridée. Le derriere de la tête, & le col depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur, ſont couverts de petites plumes blanches; il y a cependant une aſſez large bande noire, qui ſépare la tête du col, & forme une eſpece de collier. Le reſte du col & tout le corps, ainſi que les aîles & la queue, ſont d'un rouge très-vif. La prunelle des yeux eſt noire: leur iris eſt rouge. Le bec eſt gris. Le bout de la mandibule ſupérieure eſt un peu recourbé en-deſſous, & recouvre celui de la mandibule inférieure. Sur le demi-bec ſupérieur regne tout autour une rainure parallele à ſa circonférence. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont gris; & les ongles noirâtres. On la trouve dans *la Guiane* au *Mexique* & à *la Jamaïque*.

uſque, & guttur plumis denudantur, & tantummodo candicante & rugoſâ cute obſita ſunt. Capitis poſteriorem partem, collumque ab ipſius exortu versùs duas tertias longitudinis partes, veſtiunt plumulæ candidæ; attamen latiuſcula extat tænia nigra, caput à collo diſtinguens, & torquem quodammodo efformans. Reliquum collum, univerſumque corpus, ſicut & alas caudamque, tingit color ſplendidè coccineus. Oculorum pupilla nigra: ipſorum irides rubræ. Roſtrum griſeum. Mandibulæ ſuperioris extremitas nonnihil deorſum incurvatur, & mandibulæ inferioris extremitatem cooperit. Supra mandibulam ſuperiorem in toto ambitu canaliculus extat circumferentiæ parallelus. Pars crurum plumis denudata, pedeſque griſei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Guiana*, *Mexico* & *Jamaica*.

SECTIO VIII.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Spatule couleur de rose.

SECTIO VIII.

Eæ quæ rostro donantur crasso & longo.

In illa sectione tria continentur genera Avium, formâ rostri à se invicem discrepantium. Aliæ enim rostrum habent rectum, acutum; inter quas aliæ rostro donantur levi, ut *Ciconia:* alteræ mandibulâ superiore sulco longitudinali utrinque exaratâ præditæ sunt, ut *Ardea* : aliæ rostrum habent rectum, lateraliter planum, mandibulæ superioris apice adunco, ut *Scopus.*

LXXX.

Genus Ciconiæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Rostrum crassum, longum, rectum, acutum, leve.

SECTION VIII.

Ceux qui ont le bec gros & long.

Cette Section contient trois genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par la forme du bec. Les uns ont le bec droit & pointu; & parmi ceux-là les uns ont le bec lisse, comme la *Cigogne* : & les autres ont une rainure longitudinale de chaque côté sur la mandibule supérieure, comme le *Héron* : d'autres ont le bec droit, applati par les côtés, le bout de la mandibule supérieure étant crochu, comme l'*Ombrette.*

LXXX.

Le genre de la Cigogne.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec gros, long, droit, pointu & lisse.

** 1. La Cigogne brune.

Voyez Pl. XXXI.

Ciconia ſuperne fuſca, violaceo & viridi-aureo varians, infernè alba; gutture & collo fuſcis, maculis candicantibus variegatis; rectricibus fuſcis, violaceo & viridi colore variantibus . . . . . Ciconia fusca.

Ciconia nigra. *Geſn. Avi. pag.* 273, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Geſn. icon. Avi. pag. 122, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 310. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 311.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 236.
Muſ. Worm. pag. 306.
Jonſt. Avi. pag. 101. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Willugh. Ornith. pag. 211. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°.* 2.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 372.
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *ſp.* 5.
Ciconia nigra Willughbeii. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 2.
Ciconia fuſca Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 372.
Ardea nigra; pectore abdomineque albo. *Faun. Suec. Linn. N°.* 135.
Ardea nigra, pectore abdomineque albo. Ciconia nigra. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 8.
Ardea ventre ſubalbo, dorſo nigro. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 9.
Cigogne noire. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 45 *b*, *dans laquelle il y a une figure très-peu exacte.*
Alb. Tom. III. pag. 34; *avec une figure mal coloriée Pl.* 82.
Les Grecs l'appellent Πέλαργος μέλας. *Bel.*
Les Allemands, Schwartzer Storck. *Geſn. Aldrov.* Schwartzer Storch. *Schwenck. Rzac.* Braun-Schwartzer Storch. *Rzac.*
Les Polonois, Bocian czarny; Bocian snidy. *Rzac.*
Les Suédois, Odenswala. *Linn.*
Les Anglois, Black Stork. *Willugh. Alb.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'un *Dindon femelle*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue

Cum *Gallo-pavone fœmina* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam

duos pedes novem pollices & totidem lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices & ſeptem lineas longum eſt; cauda novem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices cum novem lineis; pes ſex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum totidem lineis, extimus duos pollices & octo lineas, intimus duos pollices cum quatuor lineis; poſticus autem tredecim cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quinque pedum & ſex pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Capitis ſuperior pars fuſca eſt, violaceo & viridi-aureo perluſtrata. Guttur & collum veſtiunt plumulæ

eſt de deux pieds neuf pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces ſept lignes de long; ſa queue neuf pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces neuf lignes; ſon pied ſix pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces trois lignes, l'extérieur deux pouces huit lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere treize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Elle a cinq pieds ſix pouces de vol; & ſes aîles, lorqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un brun mêlé d'un luſtre de violet & de verd-doré. La gorge & le col ſont couverts de petites plumes brunes, terminées chacune par une petite tache blanchâtre; il faut cependant en

excepter les plumes qui couvrent le bas du col, qui ſont d'un brun luſtré de violet, & terminées de brun-griſâtre. (Quelques-unes n'ont point au col & à la gorge de taches blanchâtres). Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, toutes les couvertures du deſſus des aîles & les plus petites du deſſous ſont d'un brun changeant en violet & en verd-doré. Toutes les couvertures du deſſus de la queue, ainſi que les grandes & les moyennes du deſſous des aîles, ſont pareillement brunes, mais ſans aucun brillant. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. L'aîle eſt compoſée de trente plumes d'un brun changeant en verd & en violet : le verd eſt plus apparent dans les dix premieres plumes, & le violet l'eſt davantage dans les vingt autres. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que les moyennes de l'aîle. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en

fuſcæ, minutâ maculâ candicante in apice præditæ; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt pennæ partem colli infimam obtegentes, quæ quidem fuſcæ ſunt, ſed violaceo perluſtratæ, & fuſco-griſeo terminatæ. (Quædam in collo & gutture maculis candicantibus deſtituuntur). Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne cooperientes omnes & tectrices alarum inferiores minimæ ſunt fuſcæ, violaceo & viridi-aureo colore variantes. Pennæ caudam ſuperne veſtientes, inferioreſque alarum tectrices majores & mediæ penitùs fuſcæ & nullomodo ſplendentes. Pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & tectrices caudæ inferiores albent. Alam componunt triginta remiges fuſcæ, viridi & violaceo colore variantes : viridis autem color in primoribus decem remigibus, violaceus verò in viginti reliquis magìs eſt conſpicuus. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus minoribus concolores. Binæ intermediæ lateralium

longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum griseo-virideſcens, attamen in extremitate candicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque in quibusdam obſcurè rubri, in aliis virideſcentes. Ungues lati ſunt & plani. Juxta fluviorum & ſtagnorum ripas verſatur; & *Ranis* maximè delectatur. *Ex muſeo Realmuriano.*

diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt d'un gris-verdâtre, excepté ſon bout, qui eſt blanchâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un rouge ſombre dans quelques-unes & verdâtres dans d'autres. Les ongles ſont larges & plats. Elle ſe tient ſur les bords des rivieres & des étangs; & mange beaucoup de *Grenouilles. Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 2. La Cigogne blanche.

Voyez Pl. XXXII.

Ciconia alba; oculorum ambitu nudo, nigro; remigibus nigricantibus; rectricibus candidis. . . . . Ciconia alba.

Ciconia. *Geſn. Avi. pag.* 262, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Geſn. icon. Avi. pag. 121, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 291.
Schwenck. Avi. Sil. pag. 234.
Jonſt. Avi. pag. 100. *hujus duæ icones non ſatis accuratæ Tab.* 50.
Charlet. Exer. pag. 108. *N°. I.*
Charlet. Onomazt. pag. 102. *N°. I.*
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 26. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 11.
Proſp. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
Ciconia alba. *Willugh. Ornith. pag.* 210. *hujus icon à Jonſtone mutuata Tab. LII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°. A.* 1.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 371.
Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *ſp.* 6.
Klein. Avi. pag. 125, *N°.* 1.

Ciconia; Crotaliſtria, Avis Hoſpita, peregrina, pietatis cultrix, Exul hyemis, Titulus tepidi temporis Petronio. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 274.

Ardea cirrata, alba, alis nigris, longiori gracilique roſtro. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 8.

Ardea alba, remigibus nigris. *Faun. Suec. Linn. N°.* 136.

Ardea alba, remigibus nigris, cute ſanguinea. Ciconia. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 7.

Ardea. *Moehr. Avi. Gen.* 81.

Ibis alba Herodoto. *Geſn.*

Cigogne. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 201; *avec une figure très-peu exacte pag.* 202.

Bel. Portr. d'Oiſ. pag. 45 *a*, *dans laquelle eſt la même figure.*

Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag. 61; *avec une figure paſſable Pl.* 13.

Cigogne ordinaire ou blanche. *Alb. Tom. II. pag.* 41; *avec une figure paſſable Pl.* 64.

Les Hébreux l'appellent CHASIDA. *Geſn. Aldrov.*

Les Chaldéens, CHARADITA; CHORATA. *Geſn.* CHAVARITA; DEIUTHA; MACHUAUTHA; MACUARTA. *Aldrov.*

Les Arabes, ZAKID. *Geſn.*

Les Perſes, CHASIDA. *Geſn.*

Les Grecs, Πελαργὸς. *Bel. Geſn. Aldrov. Schwenck. Jonſt. Raj. Charlet.* Πέλαγος: *& quelques-uns*, Κίκυφ; Κεκκφα. *Jonſt.*

Les Turcs, LEGLÉK. *Geſn. Aldrov.*

Les Eſpagnols, CIGUENNA. *Geſn. Aldrov.*

Les Catalans, SEGONYA; GANTA. *Barr.*

Les Italiens, CIGOGNA; ZIGOGNA. *Bel. Geſn. Aldrov. & le jeune*, CICOGNINO. *Aldrov.*

Les Allemands, STORCK. *Geſn. Aldrov. Schwenck.* STORCH. *Geſn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* WEISSER STORCH. *Rzac.* ELBIGER. *Schwenck.*

Les Saxons, EBEHER. *Geſn. Aldrov.*

Les Bas Saxons aux environs de Roſtock, ADEBAR *ou* ODEBOER. *Geſn. Aldrov.*

Les Illyriens, CZIAP. *Geſn. Aldrov.*

Les Polonois, BOCZAN. *Geſn. Aldrov.* BOCIAN; BOCIAN BIALY. *Rzac.*

Les Flamands, HOVARE. *Geſn. Aldrov.* OYEVAERT; OUWEWAER. *Aldrov.*

Les Suédois, STORCK. *Linn.*

Les Anglois, STORK. *Willugh. Charlet. Alb.* WHITE STORK. *Willugh. Raj.*

Elle eſt plus groſſe que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui

Præcedentem craſſitie ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extre-

mam tres pedes totidem pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes undecim pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſeptem pollices & novem lineas longum eſt; cauda octo pollices & tres lineas; pars crurum plumis denudata quinque pollices; pes octo pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & quinque lineas, extimus duos pollices cum novem lineis, intimus duos pollices & ſex lineas; poſticus autem ſexdecim cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extensâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum ſex pedum & trium pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Caput, guttur, collum, univerſumque corpus veſtiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris infimam partem obtegunt, ſex pollices

de la queue eſt de trois pieds trois pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſept pouces neuf lignes de long; ſa queue huit pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, cinq pouces; ſon pied huit pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces cinq lignes, l'extérieur deux pouces neuf lignes, l'intérieur deux pouces ſix lignes; & celui de derriere ſeize lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Elle a ſix pieds trois pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, ont juſqu'à ſix pouces de longueur, ſont larges de dix lignes, & ſe terminent en pointe. Les

couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, toutes celles du deſſous des aîles, les plus petites & les moyennes du deſſus, & les petites plumes ſcapulaires ſont pareillement blanches : les grandes ſcapulaires ſont d'un brun-noirâtre ; quelques-unes cependant ſont d'un noir changeant en violet. Les grandes couvertures du deſſus des aîles ſont auſſi d'un brun-noirâtre, excepté les quatre plus proches du corps, qui ſont d'un noir changeant en violet. L'aîle eſt compoſée de trente plumes noirâtres. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le tour des yeux eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau noire. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont rouges. Les ongles ſont larges & plats. Elle ſe tient, comme la précédente, ſur les bords des rivieres & des étangs ; & mange volontiers des *Grenouilles*, des *Limaçons*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longæ ſunt, decem lineas latæ, & in acumen deſinentes. Pennæ caudam ſuperne & infernè cooperientes, omnes iſtæ quæ alas ſubtus obtegunt, ſuperiores alarum tectrices minimæ & mediæ, ſicut & ſcapulares minores, ſimiliter albicant. Scapulares majores ſunt fuſco-nigricantes ; quædam tamen ex nigro violaceo colore variant. Tectrices alarum ſuperiores majores ex fuſco quoque nigricant ; quatuor tamen corpori viciniores ſunt nigræ, violaceo colore variantes. Triginta remigibus nigricantibus ala conflatur. Corpori finitimæ longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute nigrâ obtegitur. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque rubri. Ungues lati ſunt & plani. Præcedentis inſtar, juxta fluminum & ſtagnorum ripas verſatur ; & *Ranas*, *Limaces*, &c. libenter devorat. *Ex muſeo Realmuriano.*

3. LA

3. La Cigogne d'Amérique.

Ciconia alba ; oculorum ambitu nudo, coccineo ; tectricibus caudæ superioribus nigris ; remigibus nigro-virescentibus ; rectricibus candidis . . . . Ciconia Americana.

Ciconia Americana. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 3.
Ciconia Americana, Maguari Brasilienſibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 211.
Raj. Syn. Avi. pag. 97. *N°.* 3.
Maguari Brasilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 204.
Jonſt. Avi. pag. 139.
Les Braſiliens l'appellent Maguari. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Cum præcedente magnitudine circiter convenit. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque novem pollices longum eſt ; collum unum pedem. Cauda brevis eſt, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Pars crurum plumis denudata, pedeſque eamdem ac in præcedente longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ nonnihil ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque productâ, coadunatur. Caput, guttur, collum, univerſumque corpus obtegunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam cooperiunt, reliquas

Elle eſt à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a neuf pouces de long ; ſon col un pied. Sa queue eſt courte, & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des aîles, lorſqu'elles ſont pliées. La partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont longs comme dans la précédente. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. La tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie in-

férieure du col, ſont un peu plus longues que les autres. Les couvertures du deſſus de la queue ſont noires. Celles du deſſous de la queue, toutes celles du deſſous des aîles, les plus petites & les moyennes du deſſus & les petites plumes ſcapulaires ſont blanches. Les grandes ſcapulaires, les grandes couvertures du deſſus des aîles & les plumes de l'aîle ſont d'un noir qui a un certain luſtre de verd. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, à peu près auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le tour des yeux eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un rouge très-vif. Entre le bec & la gorge eſt un eſpace couvert d'une peau de la même couleur. La prunelle des yeux eſt noire : leur iris eſt d'un blanc-argenté. Le bec eſt d'un verd-jaunâtre depuis ſon origine juſqu'à la moitié de ſa longueur, & de là juſqu'à ſon extrémité il eſt d'un cendré-bleu. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont rouges. Les ongles ſont larges & plats. On la trouve en *Amérique* & ſur-tout au *Bréſil*.

longitudine paululùm antecellunt. Superiores caudæ tectrices nigricant. Pennæ caudam ſubtus obtegentes, quæ alas infernè cooperiunt, ſuperiores alarum tectrices minimæ & mediæ, minoreſque ſcapulares ſunt candidæ. Scapulares majores, tectrices alarum ſuperiores majores, ſicut & remiges, ſunt nigro-vireſcentes. Remiges corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, ad majorum remigum extremitates circiter extenduntur. Duodecim rectricibus candidis cauda conſtat. Oculorum ambitus plumis denudatur, & tantummodo cute coccineâ obtegitur. Roſtrum inter & guttur ſpatium extat cute concolore obſitum. Oculorum pupilla nigra : ipſorum irides albo-argenteæ. Roſtrum ab ipſius exortu mediam versùs longitudinem uſque ex viridi flavicat, à medietate ad extremitatem ex cinereo cœruleſcit. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque rubri. Ungues lati ſunt & plani. Habitat in *America*, præſertim in *Braſilia*.

*. 4. La Cigogne du Brésil.

Ciconia alba; capite anteriore nudo, cinereo-albicante; remigibus nigro-rubescentibus; rectricibus nigris. . . . Ciconia Brasiliensis.

Jabiru-Guacu. *Pison. Hist. Nat. pag.* 87, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Jabiru-Guacu Petiguaribus; Nhandu Apoa Tupinambis. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 200. *hujus icon non satis accurata pag.* 201.
Jonst. Avi. pag. 137. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.
Raj. Syn. Avi. pag. 96. *N°.* 5.
Jabiru-Guacu Petiguaribus, Nhandu Apoa Tupinambis, Belgis Scur-Vogel, Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Mycteria Americana. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 74. *Sp.* 1.
Les Flamands l'appellent Scur-Vogel. *Marcgr. Pison. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Petivares, Jabiru-Guacu. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Toupinambous, Nhandu Apoa. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum *Ciconia alba* crassitie circiter convenit. Rostrum, quod sola est hujus Avis pars à me observata, ab ipsius apice ad oris angulos usque tredecim pollices longum est. Mandibula inferior majorem obtinet crassitiem quàm superior, & quodammodo sursum recurvatur. Cauda brevis est, & alarum complicatarum extremitates non excedit. Crura octo pollices longa sunt; pedes tredecim pollices & sex lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur mem-

Elle est à peu près de la grosseur de la *Cigogne blanche*. Son bec, qui est la seule partie de cet Oiseau que j'ai vue, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche treize pouces de long. Le demi-bec inférieur est plus épais que le supérieur & en quelque façon recourbé en en-haut. Sa queue est courte; & ne s'étend pas au-delà de l'extrémité des aîles, lorsqu'elles sont pliées. Ses jambes ont huit pouces de long; ses pieds treize pouces six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une mem-

brane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, & avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Le devant de la tête eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau écailleuſe d'un cendré mêlé d'un peu de blanc. Le reſte de la tête eſt noir. Le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Celles qui couvrent le bas de la partie inférieure du col, ſont aſſez longues, & pendent en en-bas. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont pareillement blanches. Les plumes de l'aîle ſont d'un noir qui a un certain luſtre de rouge. Les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, à peu près auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes noires. Les yeux ſont noirs. Le bec eſt rouge, excepté ſon origine, qui eſt noirâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont cendrés. Les ongles ſont larges & plats. On la trouve au *Bréſil*.

branâ paululùm ultra primum articulum extenſâ, & digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum articulum uſque protenſâ, coadunatur. Caput anterius plumis denudatur, & tantummodo cute obtegitur ſquamoſâ cinereâ, aliquo albore mixtâ. Reliquum caput nigrum. Collum, univerſumque corpus veſtiunt pennæ albæ. Quæ colli inferioris partem infimam obtegunt, ſunt longiuſculæ, & deorſum dependentes. Scapulares, alas ſuperne & infernè cooperientes, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores ſimiliter albicant. Remiges alarum nigræ, rubini colore tranſplendentes. Corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates circiter attingunt. Duodecim rectricibus nigris cauda conflatur. Oculi ſunt nigri. Roſtrum rubrum, attamen in exortu nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque cinerei. Ungues lati ſunt & plani. Habitat in *Braſilia*.

5. La Cigogne de la Guiane.

Ciconia in toto corpore candida; capite & collo supremo nudis & nigris. . . . . Ciconia Guianensis.

Arquata Americana, cinerea maxima, vertice calvo & rugoso. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. IX. sp.* 10.
Grus incurvato rostro, vertice calvo & rugoso. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 133.
Jabiru Brasilienſibus, Belgis vulgò Negro. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 200, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Jonst. Avi. pag. 137. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.
Jabiru Brasilienſibus Marcgravii; Belgis vulgò Negro. *Willugh. Ornith. pag.* 201. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Jabiru Brasilienſium Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 96. *N°.* 4.
Les Flamands l'appellent Negro. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Brasiliens, Jabiru. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*
Les Indiens de la Guiane, Aouarou. *Barr.*

Crassitie *Cignum* antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pedes & duos circiter pollices explet, & ad extremos ungues quinque pedes & tres pollices. Rostrum, quod duorum pollicum & sex linearum latitudinem obtinet, ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim pollices longum est; cauda novem circiter pollices; pars crurum plumis denudata sex pollices & totidem lineas; pes undecim pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices: latera-

Elle est plus grosse qu'un *Cigne*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quatre pieds deux pouces, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds trois pouces. Son bec qui est large de deux pouces six lignes, a depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche onze pouces de long; sa queue environ neuf pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six pouces six lignes; son pied onze pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de

tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend un peu au-delà de la premiere articulation, &avec le doigt intérieur par une autre membrane, qui ne s'étend que juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête & la partie du col qui en eſt la plus voiſine, ſont dégarnies de plumes, & couvertes ſeulement d'une peau noire. Le reſte du col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les plumes de l'aîle & celles de la queue, ainſi que toutes leurs couvertures, ſont de la même couleur. Les yeux ſont noirs. Le bec eſt de la même couleur. Le demi-bec ſupérieur eſt un peu plus épais que l'inférieur, & un peu courbé en en-bas vers ſon extrémité. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirâtres. On la trouve dans la *Guiane* & au *Bréſil*.

les paulò ſunt breviores; poſticus autem omnium breviſſimus. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ paululùm ultra primum articulum extensâ; & cum digito intimo membranâ alterâ, ſolummodo ad primum uſque articulum productâ, connectitur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt. Caput & pars colli ipſi finitima plumis denudantur, & tantummodo cute nigrâ obteguntur. Reliquum collum, univerſumque corpus pennis veſtiuntur albis. Remiges, rectriceſque, ſicut & ipſarum tectrices omnes, eodem imbuuntur colore. Oculi ſunt nigri. Roſtrum ſimiliter nigrum. Mandibula ſuperior paulò majorem obtinet craſſitiem quàm inferior, & verſùs extremitatem paululùm deorſum incurvatur. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricant. Habitat in *Guiana* & *Braſilia*.

** 6. La Grue.

Voyez Pl. XXXIII.

Ciconia cinerea; capite ſuperiore pennis nigris, in occipite raris, pilorum æmulis, obſito; vertice nigro, occipitio rubro; maculâ triangulari infra occipitium ſaturatè cinerea;

genis ponè oculos & collo superiore candidis ; remigibus nigris ; rectricibus primâ medietate saturatè cinereis, alterâ nigricantibus . . . . GRUS.

Ardea vertice papilloso. *Faun. Suec. Linn. N°.* 131.
Ardea vertice nudo papilloso, fronte remigibus occipiteque nigris, corpore cinereo. Grus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 4.
Ardea rostro rubro, robusto, quadrangulo. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 10.
Grus. *Gesn. Avi. pag.* 528. *hujus icon minimè accurata pag.* 529.
Gesn. icon. Avi. pag. 19, *in qua eadem icon.*
Schwenck. Avi. Sil. pag. 284.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 324. *hujus icon satis accurata pag.* 329.
Jonst. Avi. pag. 114. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 54.
Willugh. Ornith. pag. 200. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLVIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°. A.* 1.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°. I.*
Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°. I.*
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Rzac. Hist. nat. Pol. pag. 281.
Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag. 383.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 6. *hujus icon satis accurata Tab. I.*
Prosper. Alp. Ægypt. Vol. I. pag. 199.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *sp.* 1.
Moehr. Avi. Gen. 79.
Grus nostras. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 1.
Grue. *Bel. Hist. nat. desOis. pag.* 187; *avec une mauvaise figure pag.* 188.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 41 *b*, *dans laquelle est la même figure.*
Kolbe. Descrip. du C. de B. Esp. Tom. III. pag. 172.
Alb. Tom. II. pag. 41 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 65.
Les Grecs l'appellent Γέρανος. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Raj. Charlet. Marsil.* Γερανὸς. *Jonst.* Κλαρος. *Gesn. Schwenck.*
Les Polyrheniens, Σέρτης. *Jonst.*
Les Toscans, Συρισὴς. *Jonst.*
Les Portugais, EMA. *Gesn. Aldrov.*
Les Espagnols, GRULLA. *Gesn. Aldrov.* GRUZ. *Aldrov.*
Les Catalans, GRUA ; GABILAN. *Barr.*
Les Italiens, GRU ; GRUA. *Bel. Gesn. Aldrov.*
Les Allemands, KRAN. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* KRANE ; KRANCH. *Gesn. Aldrov.* KRANICH. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac. Ils appellent le jeune* JUNGER KRANICH. *Schwenck.*
Les Flamands, KRANE. *Aldrov.*
Les Suisses, KRYE. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, GERZAB. *Geſn. Aldrov.*
Les Polonois, ZORAW. *Geſn. Aldrov. Rzac.*
Les Suédois, TRANA. *Linn.*
Les Anglois, CRANE. *Geſn. Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.*

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi groſſe que la *Cigogne brune*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de trois pieds un pouce, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds neuf pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces deux lignes de long; ſa queue ſept pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces ſix lignes; ſon pied huit pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derriere dix lignes & demie. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a cinq pieds huit pouces de vol; & lorſque ſes aîles ſont pliées, leurs grandes plumes s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie antérieure du deſſus de la tête eſt garnie de petites plumes noires, qui reſſemblent à des poils. Le derriere de la

Ciconiæ fuſcæ paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tres pedes & unum pollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes novem pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices & lineas binas longum eſt; cauda ſeptem pollices; pars crurum plumis denudata tres pollices & ſex lineas; pes octo pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; poſticus autem decem cum ſemi lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quinque pedum & octo pollicum; alis verò complicatis, extremitates majorum remigum caudam extremam attingunt. Capitis ſuperioris pars anterior nigris obſita eſt plumu-

lis

lis pilorum æmulis. Caput posterius sive occipitium cute obtegitur rubrâ, quibusdam pariter plumulis nigris, pilorum æmulis, sed rarissimis, obsitâ. Infra occipitium macula extat triangularis saturatissimè cinerea, supra collum superius per duorum pollicum longitudinem producta. Genæ ponè oculos, & colli superior pars sunt candidæ. Spatium rostrum inter & oculum, genas infra oculos, guttur, collumque inferiùs & ad latera tingit color cinereus saturatissimus. Partem colli corpori finitimam, dorsum, uropygium, pectus, ventrem, latera & crurum partem supremam vestiunt pennæ eleganter cinereæ. Inferiores caudæ tectrices, pennæ alas subtus obtegentes, scapularesque concolores. Superiores caudæ tectrices cinereo tinguntur nonnihil saturatiore. Tectrices alarum superiores minimæ, sicut & mediæ, eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur: majores corpori finitimæ sunt in latere exteriore concolores, in interiore nigricantes: majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha eodem imbuta colore. Remiges alarum

tête ou l'occiput est couvert d'une peau rouge, garnie de même de quelques petites plumes noires, en forme de poils, mais très-clair-semées. Au-dessous de l'occiput est une tache triangulaire d'un cendré très-foncé, qui s'étend sur le dessus du col dans la longueur de deux pouces. Les joues derriere les yeux, & la partie supérieure du col sont blanches. L'espace contenu entre le bec & l'œil, les joues au-dessous des yeux, la gorge, la partie inférieure & les côtés du col sont d'un cendré très-foncé. La partie du col la plus voisine du corps, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes d'un joli cendré. Les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les plumes scapulaires sont de la même couleur. Les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré un peu plus foncé. Les plus petites & les moyennes du dessus des aîles sont du même cendré que le dos : les grandes les plus proches du corps sont de la même couleur du côté extérieur, & noirâtres du côté intérieur : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est

de cette derniere couleur. Les plumes de l'aîle ſont pareillement noires ; il faut cependant en excepter quelques-unes des moyennes, ſçavoir les plus proches du corps, qui ſont d'un joli cendré du côté extérieur, & noires du côté intérieur & à leur bout. Elles ſe terminent en pointe ; & de celles-là les quatre plus proches du corps ſont très-longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'à cinq pouces au-delà du bout de la queue. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré foncé depuis leur origine juſque vers les deux tiers de leur longueur ; & de là juſqu'à leur extrémité elles ſont noirâtres. Le bec eſt d'un noir-verdâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. Elle ſe nourrit de grains. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ſimiliter nigræ ; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt minores quædam, corpori ſcilicet viciniores, in latere exteriore eleganter cinereæ, in latere interiore & apice nigræ. Quæ remiges in acumen deſinunt ; ex iſtis autem quatuor corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, ad quinque pollicum diſtantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caudam componunt duodecim rectrices ab ipſarum exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque ſaturatè cinereæ, indeque ad extremitatem nigricantes. Roſtrum ex nigro virideſcit. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Granis victitat. *Ex muſeo Realmuriano.*

7. La Grue des Indes Orientales.

Ciconia cinerea, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs ; capite & collo ſupremo rubris, capite pennis raris nigris, pilorum æmulis, obſito ; vertice & maculis ad aures nudis, candidis ; remigibus majoribus nigris ; rectricibus cinereis . . . Grus Orientalis Indica.

Ardea capite nudo collarique papilloſo, corpore cinereo, remigibus nigris. Antigone. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 6.
Grus Indica major. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 5.

Grande Grue des Indes. *Edwards. Tom. I. pag. XLV ; avec une figure exacte Pl.* 45.

Les Anglois l'appellent GREATER INDIAN CRANE. *Edwards.*

Magnitudine & craſſitie præcedentem paululùm antecellit ; & proportione ſervatâ, roſtro longiori donatur. Alæ complicatæ caudam ferè extremam attingunt. Capitis verticem obtegit cutis candida, plumis penitùs denudata. In utroque capitis latere macula extat ſimiliter candida, plumis quoque deſtituta, & versùs aures poſita. Reliquum caput, guttur & partem colli ſupremam obveſtit cutis rubra : quæ cutis in toto baſis roſtri ambitu, ſub gutture & capitis poſteriore parte plumulis obſita eſt rariſſimis nigris, pilorum æmulis ; pars autem colli ſuprema plumis penitùs denudatur. Reliquam colli longitudinem cooperiunt pennæ albæ, gradatim versùs ipſarum extremitatem procedendo, magìs magìſque cineraſcentes. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt eleganter cinereæ. Pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes eodem imbuuntur

Elle eſt un peu plus grande & plus groſſe que la précédente ; & a proportionnellement le bec plus long. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent preſque juſqu'au bout de la queue. Le ſommet de la tête eſt couvert d'une peau blanche, entiérement dégarnie de plumes. De chaque côté de la tête eſt une tache de la même couleur, pareillement dénuée de plumes, & placée vers les oreilles. Le reſte de la tête, la gorge & le haut du col ſont couverts d'une peau rouge : cette peau eſt garnie tout autour de la bâſe du bec, ſous la gorge & à la partie poſtérieure de la tête de petites plumes noires, en forme de poils clair-ſemés, tandis que le haut du col reſte entiérement nud. Le reſte de la longueur du col eſt couvert de plumes blanches, qui par degrés deviennent cendrées vers leur extrémité. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un joli cendré. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aî-

les & les côtés ſont de la même couleur, mais plus claire. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les moyennes ſont cendrées. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux eſt rougeâtre. Le bec eſt d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont rouges ; & les ongles blancs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On la trouve dans les *Indes Orientales*.

colore, ſed dilutiore. Remiges alarum majores ſunt nigræ : minores cinereæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Oculorum irides rubeſcentes. Roſtrum flavo-virideſcens. Pars crurum plumis denudata, pedeſque rubri ; ungues verò candidi. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum uſque articulum productâ. Habitat in *India Orientali*.

8. La Grue du Mexique.

Ciconia cinerea ; capite ſuperiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obſito ; remigibus majoribus nigris ; rectricibus cinereis . . . . Grus Mexicana.

Grus Indica. *Willugh. Ornith. pag.* 201.
Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°.* 2.
Grus Indica Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 2.
Toquil-coyotl. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 44. *Cap. CXLVIII.*
Les Mexiquains l'appellent Toquil-coyotl : *& quelques-uns*, Coceayauhqui. *Fern.*

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi grande ni ſi groſſe que la *nôtre* ; mais elle a le bec plus long.

Magnitudine & craſſitie paululùm *Grui noſtrati* cedit ; ſed roſtro longiori do-

natur. Alæ complicatæ caudæ extremitatem pertingunt; cauda autem valdè brevis est. Partem capitis superiorem obtegit cutis rubra, rugosa, plumulis rarissimis nigris, pilorum æmulis, obsita. Reliquum caput, guttur, collum, universumque corpus vestiunt pennæ cinereæ. Scapulares, alas superne & infernè vestientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores idem tingit color. Remiges alarum majores sunt nigræ : minores cinereæ. Ex minoribus autem corpori finitimæ longæ sunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ. Oculorum irides luteæ. Cujus coloris sint rostrum, pedesque, prorsùs me latet. Habitat in *Mexico*.

Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue, qui est très-courte. La partie supérieure de la tête est couverte d'une peau rouge, raboteuse, & garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes cendrées. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont noires : les moyennes sont cendrées. De ces dernieres, les plus proches du corps sont longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux est jaune. J'ignore quelle est la couleur du bec & des pieds. On la trouve au *Mexique*.

9. La Grue du Japon.

Ciconia alba; capite superiore rubro, pennis raris nigris, pilorum æmulis, obsito; collo inferiore & remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis .... Grus Japonensis.

Grus Japponensis. *Jonst. Avi. pag.* 116. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 54.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 2.

Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°.* 2.

Grus Japonenſis alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 365. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 364.

Grus Japonenſis Charletoni. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 4.

Elle reſſemble aſſez à la *nôtre* par ſa forme & ſa grandeur. La partie ſupérieure de ſa tête eſt couverte d'une peau rouge, garnie de petites plumes noires, en forme de poils clair-ſemés. La partie inférieure du col eſt noire. Le deſſus du col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle ſont noires : les moyennes ſont blanches. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd obſcur. On la trouve au *Japon.*

Formâ & magnitudine cum *Grue noſtrate* ſatis benè convenit. Partem capitis ſuperiorem obtegit cutis rubra, raris plumulis nigris, pilorum æmulis obſita. Collum inferius nigrum eſt. Partem colli ſuperiorem, univerſumque corpus veſtiunt pennæ albæ. Scapulares, alas ſuperne & infernè cooperientes, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Remiges alarum majores nigro tinguntur colore : minores ſunt candidæ. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & in acumen deſinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda conflatur. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt obſcurè virides. Habitat in *Japonenſi* Regno.

10. La Grue d'Amérique.

Ciconia alba ; capite ſuperiore pennis nigris, pilorum æmulis, in occipite raris, obſito, vertice nigro, occipitio & tæniâ

infra oculos rubris; maculâ triangulari infra occipitium nigrâ; marginibus alarum pallidè roseis; remigibus majoribus nigris; rectricibus candidis . . . . . GRUS AMERICANA.

Ardea vertice temporibusque nudis papillosis, fronte nucha remigibusque primariis nigris, corpore albo. Grus Americana. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 5.

Grande Grue de la Baye deHudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXII; avec une figure exacte Pl.* 132.

Grue blanche de l'Amérique. *Catesb. Tom. I. pag.* 75; *avec une figure exacte de la tête & du col Pl.* 75.

Les Anglois l'appellent HOOPING CRANE. *Catesb.* HOOPING-CRANE FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Gruem nostratem magnitudine & crassitie multùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem quatuor pedes duos pollices & sex lineas explet, & ad extremos ungues quinque pedes duos pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & septem lineas longum est; cauda septem pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & octo lineas; pes decem pollices cum tribus lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum linea unica: laterales paulò sunt breviores; posticus autem pollicis unius longitudinem non multùm excedit. Trium digitorum anticorum medius

Elle est beaucoup plus grande & plus grosse que la *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de quatre pieds deux pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de cinq pieds deux pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces sept lignes de long; sa queue sept pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces huit lignes; son pied dix pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces une ligne: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a guères plus d'un pouce de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte d'une peau rouge, laquelle eſt entiérement garnie, ſur le devant de la tête & de chaque côté entre le bec & l'œil, de petites plumes noires en forme de poils, ſi épaiſſes que la peau rouge ne paroît point du tout : au contraire ſur l'occiput la peau rouge eſt très-apparente, & il n'y a que fort peu de ces plumes noires en forme de poils clair-ſemés. De chaque côté de la tête s'étend une bande d'une peau rouge, garnie de même de quelques poils noirs clair-ſemés ; laquelle bande part des coins de la bouche, paſſe par-deſſous les yeux, & s'étend juſque vers le col, en ſe terminant en pointe. Au-deſſous de l'occiput eſt une grande tache triangulaire noire. Les côtés de la tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & celles du deſſous des aîles ſont de la même couleur. Les petites plumes qui couvrent le bord de l'aîle, depuis ſon origine juſque vers le pli qui répond à celui du poignet, ſont

cum extimo digito connectitur membranâ ad primum uſque articulum extenſâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput ſuperius obtegit cutis rubra, in parte capitis anteriore & utrinque roſtrum inter & oculum plumulis penitùs obſita nigris, pilorum æmulis, & ita denſis ut cutis rubra nullomodo ſit conſpicua : contrà verò in occipitio cutis rubra valdè apparet, rariſſimiſque plumulis nigris, pilorum æmulis, obſita eſt. In utroque capitis latere tænia protenditur cute rubrâ conflata, raris quibuſdam pilis nigris ſimiliter obſita ; quæ tænia ab oris angulis orta, & infra oculos ducta, versùs collum uſque protenditur, & in acumen deſinit. Infra occipitium majuſcula extat macula triangularis nigra. Caput ad latera, guttur, collum, univerſumque corpus veſtiunt pennæ albæ. Scapulares, caudam ſuperne & infernè cooperientes, alarumque tectrices inferiores eodem colore tinguntur. Plumulæ alarum margines, ab ipſarum exortu versùs articulum carpo humano reſpondentem uſque, cooperientes ſunt pallidè roſeæ. Superiores

res alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, candidæ : majores à corpore remotiores nigræ. Pennæ nigræ, pennæque candidæ alam notham variegant. Remiges novem primores sunt nigræ : decima in latere exteriore concolor, in interiore alba : reliquæ omnes penitùs albicant. Corpori viciniores sunt valdè flexibiles, longæ & in acumen desinentes, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Rostrum ex fusco flavicat, obscuriùs tamen in medio quàm in utraque extremitate. Utriusque mandibulæ extremitas, serræ instar, dentata est, idque per spatium circiter sesquipollicis. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Habitat in variis *Americæ Septentrionalis* regionibus.

d'un couleur de rose pâle. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont blanches : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est variée de plumes noires & de plumes blanches. Les neuf premieres plumes de l'aîle sont noires : la dixiéme est de la même couleur du côté extérieur, & blanche du côté intérieur : toutes les autres sont entiérement blanches. Les plus proches du corps sont très-fléxibles, longues & pointues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un brun-jaunâtre, plus obscur dans le milieu qu'aux deux extrémités. Le bout des deux mandibules est dentelé comme une scie dans l'espace d'environ un pouce & demi. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On la trouve en différens endroits de l'*Amérique Septentrionale*.

11. La Grue de la Baye de Hudson.

Ciconia superne rufescens, marginibus pennarum fuscis, infernè cinereo-rufescens; vertice rubescente, pennis nigris, pilorum æmulis, obsito; genis & gutture candidis; occipite,

collo & uropygio cinereis; tæniâ transversâ in alis cinereo-albâ; remigibus majoribus fusco-nigricantibus, scapis albis; rectricibus saturatè cinereis . . . . . GRUS FRETI HUDSONIS.

Ardea syncipite nudo papilloso, corpore cinereo, alis extus testaceis. Ardea Canadensis. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 3.

Grue brune & cendrée. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXIII; avec une figure exacte Pl.* 133.

Les Anglois l'appellent BROWN AND ASH-COLOUR'D CRANE. *Edwards.*

Elle est beaucoup moins grosse que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds huit pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue environ six pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces neuf lignes; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces: les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere n'a guères que neuf lignes de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà de la moitié de

Præcedenti multùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes octo pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda sex circiter pollices; pars crurum plumis denudata, duos pollices cum novem lineis; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices: laterales paulò sunt breviores; posticus autem novem linearum longitudinem non multùm excedit. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum usque articulum productâ, coadunatur. Alæ complicatæ nonnihil ultra mediam caudæ longitudinem extenduntur.

Summum caput obtegit cutis rubescens, raris quibusdam plumulis nigris, pilorum æmulis, obsita. Genæ & guttur albicant. Caput superius sive occipitium, collumque cinereo tinguntur colore. Dorsi pars suprema pennis vestitur rufescentibus, fusco marginatis. Dorsum infimum & uropygium sunt cinerea. Pennæ caudam superne cooperientes, inferioresque alarum tectrices concolores. Pectus, venter, crurum suprema pars & latera ex cinereo rufescunt; qui color cinereo-rufescens, versùs tectrices caudæ inferiores procedendo, magìs magìsque fit dilutior; inferiores autem caudæ tectrices sunt candicantes. Pennæ scapulares, superiores alarum tectrices minimæ & mediæ rufescentes, fusco fimbriatæ: superiores alarum tectrices majores à corpore remotiores fusco-nigricantes: majores corpori viciniores cinereo-albæ, unde fit in utraque ala tænia transversa concolor. Remiges alarum majores ex fusco nigricant, & scapo donantur candido: minores rufescunt. Ex minoribus autem corpori finitimæ sunt valdè flexibiles, longæ & in acu-

la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert d'une peau rougeâtre, garnie de quelques petites plumes noires, en forme de poils clair-semés. Les joues & la gorge sont blanches. Le derriere de la tête ou l'occiput, & le col sont cendrés. La partie supérieure du dos est couverte de plumes roussâtres, bordées de brun. La partie inférieure du dos & le croupion sont cendrés. Les couvertures du dessus de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés sont d'un cendré-roussâtre; cette couleur devient de plus en plus claire en approchant des couvertures du dessous de la queue, qui sont blanchâtres. Les plumes scapulaires, les petites & les moyennes couvertures du dessus des aîles sont roussâtres, & bordées de brun: les grandes couvertures du dessus des aîles les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre: les grandes les plus proches du corps sont d'un gris-blanc; ce qui forme sur chaque aîle une bande transversale de cette couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun-noirâtre, & ont leur tige blanche: les moyennes sont roussâtres. De

ces dernieres, les plus proches du corps ſont très-fléxibles, longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, bien au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré foncé. Le bec eſt noirâtre, excepté le bout du demi-bec inférieur, qui eſt d'un couleur de chair pâle. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. On la trouve en été à la *Baye de Hudſon.*

men deſinentes, & dum ala complicatur, non parùm ultra majorum remigum extremitates protenduntur. Duodecim rectricibus ſaturatè cinereis cauda conſtat. Roſtrum nigricat; attamen mandibulæ inferioris extremitas pallidè carneo colore tingitur. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Æſtate in *Freto Hudſonis* habitat.

** 12. La Grue de Numidie, appellée vulgairement Demoiselle de Numidie.

Ciconia cinereo-cœruleſcens; vertice dilutè cinereo; capite & collo ſupremo nigris; faſciculis pennarum candidis, ab utriuſque oculi angulo ortis, retrorſum pendulis; pennis longis nigris in collo inferiore deorſum dependentibus; remigibus majoribus, rectricibuſque apice nigricantibus.... Grus Numidica Virgo Numidica vulgo dicta.

Ardea ſuperciliis albis, retrorſum longè criſtatis. Virgo. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 2.
Grus Numidiæ. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 6.
Otus plumbeus. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXVII.*
Scops. *Moehr. Avi. Gen.* 84.
Demoiſelle de Numidie. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. II. pag.* 3; *avec une figure paſſable Pl.* 35.
Edwards. Tom. III. pag. CXXXIV; avec une figure exacte Pl. 134.
Grue de Numidie. *Alb. Tom. III. pag.* 35; *avec une figure mauvaiſe & mal coloriée Pl.* 83.
Les Grecs l'appellent Ανθροποειδης. *Hiſt. de l'Acad.*
Les Anglois, Numidian Crane. *Alb.* Demoiselle of Numidia. *Edwards.*

Crassitie *Grui vulgari* cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes totidem pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes & sex pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda decem pollices cum sex lineis; pars crurum plumis denudata tres pollices; pes septem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices cum linea una, intimus duos pollices & tres lineas; posticus autem novem tantummodo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & novem pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ quartam longitudinis caudæ partem non multùm excedunt. Vertex capitis cinereo diluto tingitur. Reliquum caput, guttur & collum supremum nigra sunt. Colli infima pars superiùs & ad latera, dorsum, uropygium, pectus, venter, latera

Elle n'est pas si grosse que la *Grue ordinaire.* Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds trois pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds six pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue dix pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, trois pouces; son pied sept pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces une ligne, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere neuf lignes seulement. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a quatre pieds neuf pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà du quart de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est d'un cendré-clair. Le reste de la tête, la gorge & le haut du col sont noirs. Le bas du col dans sa partie supérieure & sur les côtés, le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés & le haut des jambes sont couverts de plumes d'un joli cendré-bleu. Les sca-

pulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. De l'angle extérieur de chacun des yeux part un petit faiſceau de plumes blanches, longues de trois pouces ſix lignes, très-flexibles, qui pendent en arriere, & flottent au moindre mouvement de tête que ſe donne l'Oiſeau. Le bas de la partie inférieure du col eſt couvert de plumes noires, longues, ſe terminant en pointe, très-fléxibles, dont quelques-unes ont juſqu'à neuf pouces de longueur, & pendent ſur la poitrine. Les grandes plumes de l'aîle ſont cendrées depuis leur origine juſque vers la moitié de leur longueur; le reſte eſt noirâtre : les moyennes ſont d'un joli cendré-bleu. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont longues & pointues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, juſqu'à l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré-bleu, terminées de noirâtre. L'iris des yeux eſt d'un rouge vif. Le bec eſt verdâtre à ſon origine, jaune vers le milieu de ſa longueur, & rouge à ſon extrémité. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les

& crurum pars ſuprema pennis veſtiuntur eleganter cinereo-cœruleſcentibus. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè obtegunt, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores eodem imbuuntur colore. Ab utriuſque oculi exteriori angulo faſciculus oritur pennis conflatus candidis, trium pollicum & ſex linearum longitudinem obtinentibus, valdè flexibilibus, retrorſum dependentibus, & minimo capitis hujus Avis motu fluctuantibus. Colli inferioris infima pars pennis obſita eſt nigris, longis, in acumen deſinentibus, valdè flexibilibus, quarum quædam novem pollicum longitudine pollent, & pectori incumbunt. Remiges alarum majores ſunt ab ipſarum exortu mediam versùs longitudinem uſque cinereæ, à medietate ad apicem nigricantes : minores eleganter cinereo-cœruleſcentes. Ex minoribus autem corpori viciniores longæ ſunt & acutæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœruleſcentes, apice tamen nigricantes. Oculorum irides coccineæ. Roſtrum in exortu

Dessiné et Gravé par Martinet.

Cigogne brune.

né et Gravé par Martinet.

Cigogne blanche.

Dessiné et Gravé par Mâtinet.

Grue.

virideſcens, versùs mediam longitudinem luteum, in extremitate rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Habitat in *Numidia. Ex muſeo Realmuriano.*

ongles ſont noirs. On la trouve en *Numidie. Du cabinet de M. de Reaumur.*

LXXXI.

Genus Ardeæ.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti; tres ſcilicet antici, poſticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Roſtrum craſſum, longum, rectum, acutum:
Mandibula ſuperior ſulco longitudinali utrinque exarata.

In omnibus hujus generis Avibus trium digitorum anticorum medii unguis interiùs eſt, ferræ inſtar, dentatus. Mandibulæ binæ ſunt ſimiliter in utroque latere versùs ipſarum extremitatem nonnihil denticulatæ; & mandibulæ ſuperioris apex eſt utrinque paululùm emarginatus. Omnes corpore donantur lateraliter compreſſo.

LXXXI.

Le genre du Héron.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec gros, long, droit & pointu:
Une rainure longitudinale de chaque côté ſur la mandibule ſupérieure.

Tous les Oiſeaux de ce genre ont l'ongle de celui du milieu des trois doigts antérieurs intérieurement dentelé comme une ſcie. Il ont auſſi les deux mandibules un peu dentelées de chaque côté vers leur extrémité; & le bout de la mandibule ſupérieure a de chaque côté une petite échancrure. Ils ont tous le corps applati par les côtés.

** 1. Le Héron.

Voyez Pl. XXXIV.

Ardea ſuperne cinerea, infernè alba; medio vertice cinereo-nigricante; occipitio nigro; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario; pectore & ventre ſupremo maculis longitudinalibus cinereo-nigricantibus variegatis; rectricibus cinereis, versùs apicem fuſceſcentibus; roſtro ſuperiùs flavo-virideſcente, infernè flavicante, apice nigricante; pedibus vireſcentibus . . . . Ardea.

Ardea occipite criſta pendula, dorſo cœruleſcente, ſubtus albida, pectore maculis oblongis nigris. Ardea cinerea. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 10.

Ardea. *Geſn. Avi. pag.* 207.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 365.
Muſ. Worm. pag. 306.
Moehr. Avi. Gen. 81.

Ardea ſubcœrulea. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 223.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 364.

Ardea pulla, ſive cinerea. *Geſn. Avi. pag.* 211. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 212.

Ardea, vel Ardeola pulla vel cinerea. *Geſn. icon. Avi. pag.* 117, *in qua eadem icon.*

Ardea pella, pulla, cinerea, Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 122. *N°.* 1.

Ardea cinerea. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 271.

Ardea cinerea major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 377. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 378.
Jonſt. Avi. pag. 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Charlet. Exer. pag. 109. *N°.* 1.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 1.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 8. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 2.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 364.

Ardea cinerea major Jonſtoni. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 5.

Ardea cinerea criſtata. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 55. *ſp.* 3.

Ardea criſtâ dependente. *Faun. Suec. Linn. N°.* 133.

Pella Ariſtoteli. *Geſn.*

Héron. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 42 *a*, *dans laquelle il y a une figure peu exacte.*

Héron

Héron ordinaire. *Alb. Tom. III. pag.* 32 ; *avec une figure mal coloriée Pl.* 78.

Héron cendré. *Bel. Hist. Nat. des Ois. pag.* 189 ; *avec une figure peu exacte pag.* 190.

Les Hébreux l'appellent SCHALACH. *Gesn.*

Les Chaldéens, SCHALENUNA. *Gesn.*

Les Arabes, BABGACH. *Gesn.*

Les Perses, AUKOH. *Gesn.*

Les Grecs, Ἐρωδιὸς. *Bel. Gesn. Aldrov. Schwenck. Jonst. Charlet.* Πελλὸς. *Bel. Aldrov. Schwenck. Worm.*

Les Turcs, BALAKZEL. *Gesn. Aldrov.*

Les Portugais, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Espagnols, GARZA. *Gesn. Aldrov.*

Les Catalans, AGRO ; CAPU D'AIGUA ; BERNARD PISCAIRA. *Barr.*

Les Italiens, AIRON ; ANGHIRON. *Bel. Gesn. Aldrov.* AIRON NEGRO. *Aldrov.*

Les Savoyards, AIRON *ou* HEYRON. *Gesn. Aldrov.*

Les Suisses, REIGEL. *Gesn. Aldrov. Schwenck.*

Les Allemands, REIGER. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Rzac.* REIHER. *Gesn. Aldrov. Schwenck.* RAYER ; HEER-GANSS. *Gesn. Aldrov.* HERR-GANSS. *Schwenck.*

Les Siléſiens, REGER ; BLAWER REGER ; ASCHENFARBENER REGER. *Schwenck.*

Les Hollandois, REIGHER. *Aldrov.*

Les Flamands, RIEGHER. *Gesn. Aldrov.* BLAUWER REIGEL ; GRAUWER REIGEL. *Gesn. Aldrov.* GRAUER REIGEL. *Schwenck.*

Les Frisons, RARG. *Gesn. Aldrov.*

Les Illyriens, CZIEPIE. *Gesn. Aldrov.*

Les Polonois, CZAPLA. *Rzac.* ZORAW. *Gesn. Aldrov.*

Les Suédois, HAEGER. *Linn.*

Les Anglois, HERON. *Gesn.* COMMON HERON. *Charlet. Sibbald. Alb.* ASH-COLOURED HERON. *Charlet.*

Grui fuscæ crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & decem pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes totidem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices

Il n'est pas si gros que la *Grue brune*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de deux pieds dix pouces, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds trois pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces cinq lig-

nes de long ; ſa queue ſix pouces huit lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois pouces trois lignes ; ſon pied cinq pouces ſix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces huit lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces dix lignes ; & celui de derriere un pouce onze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. Le milieu du deſſus de la tête, depuis le bec juſque vers l'occiput, eſt d'un cendré-noirâtre. L'occiput eſt noir. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure & les côtés du col ſont d'un cendré clair. La partie ſupérieure du dos & les plumes ſcapulaires ſont d'un cendré beaucoup plus foncé. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du deſſus de la queue & les côtés ſont d'un cendré un peu plus clair, mais moins que celui du deſſus du col. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement

& totidem lineas longum eſt ; cauda ſex pollices & octo lineas ; pars crurum plumis denudata tres pollices cum totidem lineis ; pes quinque pollices & ſex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum octo lineis, extimus tres pollices, intimus duos pollices & decem lineas ; poſticus autem unum pollicem & undecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo coadunatur membranâ ad primum uſque articulum productâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Medius vertex, à roſtro ſcilicet verſùs occipitium uſque, ex cinereo nigricat. Occipitium nigrum eſt. Reliquum caput ſuperius, collumque ſuperiùs & ad latera ſunt dilutè cinerea. Dorſi ſuprema pars & ſcapulares pennæ cinereo quidem tinguntur colore, ſed multò ſaturatiore. Dorſum infimum, uropygium, ſuperiores caudæ tectrices & latera tingit color cinereus nonnihil dilutior, minùs tamen quàm in collo ſuperiore

dilutus. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-virideſcente obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, inferioresque caudæ tectrices candore nitent. Secundùm colli inferioris longitudinem pennæ in medio positæ sunt in latere interiore nigræ : quæ sequuntur, idque secundùm eamdem directionem versùs infimum ventrem usque, interiùs ex cinereo nigricant ; unde fit à gutture versùs imum ventrem usque tænia longitudinalis per totam colli longitudinem nigra, & in medio pectore, medioque ventre supremo cinereo-nigricans. Crurum suprema pars extrorsum grisea, introrsum candida. Pennæ alas subtus obtegentes cinereæ. Margines alarum ad articulum carpo humano respondentem, rufescunt, dein in reliqua longitudine albicant. Superiores alarum tectrices minores eodem imbuuntur cinereo ac dorsum ipsum tingitur : majores corpori viciniores sunt cinereæ quidem, sed paulò dilutiùs : majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha similiter nigra. Vi-

d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre & les couvertures du dessous de la queue sont d'un beau blanc. Tout le long de la partie inférieure du col les plumes du rang du milieu ont leur côté intérieur noir : celles qui suivent la même direction jusque vers le bas-ventre, ont leur côté intérieur d'un cendré-noirâtre ; ce qui forme depuis la gorge jusque vers le bas-ventre une bande longitudinale, qui est noire dans toute la longueur du col ; & d'un cendré-noirâtre sur le milieu de la poitrine & du haut du ventre. Le haut des jambes est gris en-dehors & blanc en-dedans. Les couvertures du dessous des aîles sont cendrées. Le bord de l'aîle, préciſément sur le pli qui répond à celui du poignet, est roussâtre ; ensuite il est blanc dans le reste de sa longueur. Les petites couvertures du dessus des aîles sont du même cendré que celui du dos : les grandes les plus proches du corps, sont d'un cendré un peu plus clair : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est de cette derniere couleur. L'aîle est composée de vingt-sept plumes : les vingt premieres sont noirâtres : les trois suivantes

ſont d'un cendré-noirâtre d'autant plus foncé, que la plume eſt plus éloignée du corps : & les quatre plus proches du corps ſont cendrées. Ces dernieres ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré qui brunit un peu vers le bout de chaque plume. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un jaune-verdâtre, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre ; l'inférieur eſt jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres & les ongles noirâtres. Il ſe tient ſur les bords des lacs & des rivieres, & ſe nourrit de *Poiſſons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait ſon nid dans les grands arbres. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

ginti ſeptem remigibus ala conflatur : viginti primores nigricant : tres proximè ſequentes ſunt cinereo-nigricantes, idque eò ſaturatiùs, quò remix fit à corpore remotior : quatuor tandem corpori finitimæ cinereæ. Quæ noviſſimè dictæ ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ, versùs ipſarum apicem paululùm fuſceſcentes. Mandibula ſuperior eſt flavo-virideſcens, attamen in apice nigricans ; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virideſcentes ; ungues verò nigricantes. Lacuum & fluminum ripas frequentat, & *Piſcibus*, *Ranis*, &c. victitat. In excelſis arboribus nidificat. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 2. LE HÉRON HUPÉ.

Voyez Pl. XXXV.

Ardea criſtata, ſuperne cinerea, infernè alba ; medio vertice candido ; vertice ad latera, & criſtâ nigris ; collo inferiore maculis longitudinalibus nigris vario ; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis ; tæniâ tranſversâ in ſummo pectore nigrâ ; faſciâ utrinque longitudinali in pectore & ventre nigrâ ; rectricibus cinereis ; roſtro fuſco-flavicante ; pedibus virideſcentibus.... ARDEA CRISTATA.

Ardea cinerea major. *Willugh. Ornith. pag.* 203. *hujus icon non satis accurata Tab. XLIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 98. *N°. A.* 1.

Alia Ardeæ species. *Gesn. icon. Avi. pag.* 117, *in qua capitis & colli icon non satis accurata.*

Alia quædam Ardea. *Gesn. Avi. pag.* 219. *capitis & colli eadem icon pag.* 220.

Alia quædam Ardea ex Ornithologo. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 383.

Ardea. *Jonst. Avi. hujus icon non satis accurata Tab.* 52.

Héron. *Alb. Tom. I. pag.* 59; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 67.

Les Grecs l'appellent. Ἐρωδιὸς *Raj.*

Les Anglois, Common Heron. *Willugh. Raj.* Crested Heron. *Alb.*

Crassitie præcedentem paulùm antecellit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pedes & sesquipollicem æquat, & ad extremos ungues tres pedes septem pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque sex pollices longum est; cauda sex pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices cum undecim lineis; pes quinque pollices & decem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices cum novem lineis, extimus tres pollices & totidem lineas, intimus duos pollices & decem lineas; posticus autem viginti quinque lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum

Il est un peu plus gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce six lignes, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds sept pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a six pouces de long; sa queue six pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux pouces onze lignes; son pied cinq pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derriere vingt-cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds quatre pouces de vol;

& ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le ſynciput eſt couvert de plumes blanches, dont quelques-unes ſont fort longues, & qui, étant couchées les unes ſur les autres, couvrent le milieu du ſommet de la tête, & s'étendent juſqu'à l'occiput. Le deſſus de la tête eſt couvert de plumes d'un beau noir, dont quelques-unes ſont fort longues & fort étroites, & forment une belle hupe, qui retombe en arriere. La partie ſupérieure & les côtés du col ſont d'un gris-blanc. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un très-joli cendré : quelques-unes des plumes ſcapulaires, ſçavoir les ſupérieures, ſont très-longues & très-étroites : les inférieures ſont fort larges, & marquées de petites lignes tranſverſales noirâtres, peu apparentes. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. Les joues & la gorge ſont blanches. La partie inférieure du col eſt de la même couleur, & marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales noires, placées ſur le côté intérieur de cha-

articulum uſque protenſâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quinque pedum & quatuor pollicum ; alæ verò complicatæ caudam extrema attingunt. Synciput veſtiunt pennæ candidæ, quarum quædam ſunt longiſſimæ, quæque, aliæ aliis incumbentes, medium verticem cooperiunt, & ad occipitium uſque protenduntur. Caput ſuperius obtegunt pennæ ſplendidè nigræ, quarum quædam longiſſimæ ſunt & ſtrictiſſimæ, elegantemque criſtam, retrorſum propendentem, efficiunt. Collum ſuperiùs & ad latera ex cinereo albicat. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt eleganter cinereæ. Ex ſcapularibus quædam, ſuperiores ſcilicet, longiſſimæ ſunt & ſtrictiſſimæ : inferiores verò maximâ latitudine pollentes, & lineolis tranſverſis nigricantibus, non multùm conſpicuis, inſignitæ. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & tantummodo cute viridi-flavicante tectum. Genæ & guttur albent. Pars colli inferior ſimiliter albicat, & utrinque macularum

longitudinalium nigrarum in latere interiore cujusque pennæ collocatarum, serie insignitur. Pennæ colli inferioris partem infimam cooperientes longissimæ sunt & strictissimæ, pectusque ferè universum obtegunt : pennæ autem istæ pleræque sunt cinereo-albæ. In summo pectore lata extat tænia transversa splendidè nigra, utrinque versùs dorsum usque producta. Reliquum pectus & venter albicant, & in utroque latere fasciâ longitudinali splendidè nigrâ donantur : quæ fasciæ binæ à suprà dicta tænia transversa nigra oriuntur, & in imo ventre inter se connectuntur. Crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices sunt candidæ. Pennæ alas subtus & latera obtegentes cinereo tinguntur colore. Margines alarum ab articulo carpo humano respondente ad ipsarum extremitates usque albæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, cinereæ : majores à corpore remotiores nigræ. Ala notha similiter nigra. Alam componunt viginti octo remiges, omnes subtus cinereæ ; superne verò majores sunt nigræ : proximè sequentes cique plume. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont très-longues & très-étroites, & couvrent presque toute la poitrine : la plûpart de ces plumes sont d'un gris-blanc. Sur le haut de la poitrine est une large bande transversale d'un beau noir, qui s'étend de chaque côté jusque vers le dos. Le reste de la poitrine & le ventre sont blancs, & bordés de chaque côté d'une bande longitudinale d'un beau noir : ces bandes partent toutes deux de la bande transversale noire, dont nous avons parlé ci-dessus, & vont se réunir au bas-ventre. Le haut des jambes est blanc, ainsi que les couvertures du dessous de la queue. Les couvertures du dessous des aîles & les côtés sont cendrés. Le bord de l'aîle est blanc depuis le pli qui répond à celui du poignet jusqu'à son extrémité. Les petites couvertures du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont cendrées : les grandes les plus éloignées du corps sont noires. L'aîle bâtarde est de cette derniere couleur. L'aîle est composée de vingt-huit plumes, toutes cendrées en-dessous ; mais en-dessus les grandes sont noires : les suivantes sont d'un cendré-noirâtre d'autant plus

foncé, que la plume eſt plus éloignée du corps : les ſix plus proches du corps ſont cendrées. Ces dernieres plumes ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux eſt d'un jaune-rouſſâtre : les paupieres ſont d'un verd-jaunâtre. Le bec eſt d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres ; & les ongles noirs. Il ſe tient ſur les bords des lacs & des rivieres, & ſe nourrit de *Poiſſons*, de *Grenouilles*, &c. Il fait ſon nid ſur le ſommet des grands arbres : ſes œufs ſont d'un bleu pâle & verdâtre. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

nereo-nigricantes, idque eò ſaturatiùs, quò remix fit à corpore remotior : ſex corpori viciniores cinereæ. Quæ nuper deſcriptæ remiges ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Oculorum irides flavo-rufeſcentes : palpebræ viridi-flavicantes. Roſtrum ex fuſco flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virideſcentes ; ungues verò nigri. Juxta lacuum & fluviorum ripas verſatur, & *Piſcibus*, *Ranis*, &c. victitat. In excelſarum arborum cacuminibus nidificat : ova ponit pallidè cœruleo-virideſcentia. *Ex muſeo Realmuriano.*

** 3. Le Héron huppé de Cayenne.

Ardea criſtata, dilutè cinerea ; capite ſuperiore in medio cinereo, ad latera nigro ; criſtâ cinereâ ; collo albo, inferiùs maculis longitudinalibus nigro-cinereis vario ; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis longiſſimis candidis ; rectricibus dilutè cinereis ; roſtro flavo-vireſcente ; pedibus cinereis .... Ardea Cayanensis cristata.

Ardea Braſilienſis Cocoi dicta Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 209. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*
Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°.* 15.
Cocoi Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 209. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 210.

Jonſt.

Jonst. Avi. pag. 143. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.
Cocoi secundus. *Pison. Hist. Nat. pag.* 89, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Heron bleu. *Alb. Tom. III. pag.* 32; *avec une figure mal coloriée Pl.* 79.
Second Crabier. *Du Tertre. Hist. des Antil. Tom. II. pag.* 273; *avec une figure peu exacte pag.* 246. *N°.* 13.
Les Anglois l'appellent Blew Heron. *Alb.*
Les Brasiliens, Cocoi. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*

Cum præcedente crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam tres pedes & pollicem unum explet, & ad extremos ungues tres pedes decem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos quinque pollices & novem lineas longum est; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices; pes sex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices & decem lineas; posticus autem duos pollices cum linea unica. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & pollicis unius interyallo distant; alæ verò com-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce, & jusqu'à celui des ongles de trois pieds dix pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a cinq pouces neuf lignes de long; sa queue cinq pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, quatre pouces; son pied six pouces six lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces dix lignes; & celui de derriere deux pouces une ligne. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a cinq pieds un pouce de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est cendré. Les côtés du

deſſus de la tête ſont noirs. Les plumes qui couvrent l'occiput, ſont cendrées, très-longues, très-étroites, & forment une jolie hupe : quelques-unes ont juſqu'à cinq pouces ſix lignes de long, & pendent en arriere ſur le col. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau cendrée. Les joues, la gorge & le col ſont d'un beau blanc : la partie inférieure du col eſt marquée de chaque côté d'un rang de taches longitudinales d'un cendré-noir, placées ſur le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues, très-étroites, très-flexibles & d'un beau blanc. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont d'un joli cendré clair. Les ſcapulaires ſupérieures ſont très-longues, très-étroites & flexibles. Les plumes de l'aîle ſont du même cendré que celui du reſte du corps. Les plus proches du corps ſont très-longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle.

plicatæ ad caudæ extremitatem pertingunt. Summum caput cinereum eſt. Caput ſuperius ad latera nigrum. Pennæ occipitium obtegentes cinereæ ſunt, longiſſimæ, ſtrictiſſimæ, elegantemque criſtam efformant : ex illis quædam quinque pollicum & ſex linearum longitudinem obtinent, & retrorſum ſupra collum propendent. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & tantummodo cute cinereâ obductum. Genæ, guttur & collum albore nitent : pars colli inferior utrinque macularum longitudinalium cinereo-nigricantium, in latere interiore cujuſlibet pennæ collocatarum, ſerie inſignitur. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis, ſtrictiſſimis, valdè flexibilibus & candidis. Dorſum, uropygium, pectus, ventrem, latera, ſcapulares pennas, alas ſuperne & infernè veſtientes, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores tingit color dilutè cinereus elegans. Scapulares ſuperiores longiſſimæ ſunt, ſtrictiſſimæ & valdè flexibiles. Remiges alarum eodem imbuuntur cinereo ac reliquum cor-

pus ipsum tingitur. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cinereæ. Oculorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum ex flavo virescit. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinerei; ungues verò fusci. Habitat in *Brasilia* & *Cayana*, unde in *museum Realmurianum* missa à *D. Artur.*

La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. L'iris des yeux est de couleur d'or. Le bec est d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont cendrés; & les ongles bruns. On le trouve au *Brésil* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

4. Le Héron cendré.

Ardea cinerea, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; collo inferiore & pectore albis, maculis longitudinalibus nigris variegatis; rectricibus cinereis. . . . . Ardea cinerea.

Ardea minor alia rostro arcuato. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 402, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Ardea minor alia rostro arcuato Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 10.
Ardea rostro maximè arcuato. *Jonst. Avi. pag.* 104.

Hæc est Ardeæ species minor. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè cinereæ. Ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color

Celui-ci est de la petite espece. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré foncé. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont de la

même couleur, mais plus claire. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col & la poitrine ſont de la même couleur, & variées de taches longitudinales noires. Les plumes de l'aîle ſont cendrées. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que celles de l'aîle. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

cinereus quidem, ſed dilutior. Guttur albicat. Collum inferius & pectus ſimiliter albent, maculiſque longitudinalibus nigris variegantur. Remiges alarum ſunt cinereæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Cujus coloris ſint roſtrum, pedeſque, prorſus me latet. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

5. Le Héron cendré du Mexique.

Ardea criſtata, cinerea; fronte albo & nigro varia; capite ſuperiore & criſtâ purpuraſcentibus; alis albo, cinereo & cyaneo variis; rectricibus cinereis; roſtro nigro; pedibus fuſco, nigro & flaveſcente variegatis.... Ardea Mexicana cinerea.

Xoxouqui-hoactli. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 40. *cap. CXXVI.*
Xoxouhqui-hoactli. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 14. *cap. VI.*
Xoxouhqui-hoactli, Hoacton, ſeu Ardea cinerea minor Mexicana criſtata. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 21.
Les Mexiquains l'appellent Xoxouqui-hoactli *ou* Xoxouhqui-hoactli. *Fern.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur

Præcedentem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longi-

tùdo ab apice rostri ad extremos ungues duos pedes & tres circiter pollices æquat. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque septem pollices longum est; pes, simul cum digitis, novem pollices. Capitis pars anterior sive frons albo & nigro promiscuè variegatur. Reliquum caput superius est purpureum. In capitis vertice septem extant pennæ similiter purpureæ, cristam efficientes. Guttur, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, tectrices caudæ superiores & inferiores, & pennæ alas subtus obtegentes cinereo tinguntur colore. Margines alarum, ad articulum carpo humano respondentem, albent. Superiores alarum tectrices, sicut & remiges, cinereo & cyaneo variegantur. Remiges corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conflatur. Rostrum nigrum. Pedes fusco, nigro & flavescente variegati. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum

depuis le bout du bec jusqu'à celui des ongles est d'environ deux pieds trois pouces. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a sept pouces de long; son pied, joint avec les doigts, neuf pouces. Le devant de la tête ou le front est varié confusément de blanc & de noir. Tout le reste du dessus de la tête est pourpre. Sur le sommet de la tête sont sept plumes de la même couleur, qui forment une hupe. La gorge, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont cendrés. Le bord de l'aîle, sur le pli qui répond à celui du poignet, est blanc. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes de l'aîle, sont variées de cendré & de bleu. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. Le bec est noir. Les pieds sont variés de brun, de noir & de jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt

extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve dans les marais du *Mexique*.

uſque articulum protensâ, coadunatur. In paludibus *Mexicanis* habitat.

6. Le Héron cendré d'Amérique.

Ardea ſuperne dilutè cinerea, infernè alba; remigibus partim nigris, partim candidis; rectricibus dilutè cinereis; roſtro cyaneo, apice nigro; pedibus cœruleis. . . . Ardea Americana cinerea.

Héron ou Calidris leucophæa. *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag* 287. (*ed.* 1725).

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Corneille*. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces ſix lignes de long. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un cendré clair. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un bleu d'azur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus des aîles ſont du même cendré que celui du dos, & mêlées de quelques plumes noires. Les plumes de l'aîle ſont en partie noires

Cum *Cornice* craſſitie circiter convenit. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & ſex lineas longum eſt. Caput, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt dilutè cinereæ. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & tantummodo cute cyaneâ obductum. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, & pennæ caudam ſubtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices eodem imbuuntur cinereo ac dorſum ipſum tingitur, quibuſdam tamen pennis nigris interſertis. Remiges ſunt partim nigræ partim candidæ. Corpori ſini-

timæ majorem obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè cinereæ. Rostrum cyaneum, attamen in extremitate nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cœrulei; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum usque articulum protensâ. Habitat in *America*.

& en partie blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un cendré clair. Le bec est d'un bleu d'azur, excepté son extrémité, qui est noire. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bleus; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Amérique*.

7. Le Héron de la Baye de Hudson.

Ardea cristata, superne cinereo-fuscescens, infernè albâ; collo inferiore & pectore maculis longitudinalibus nigris, rufescente mixtis, variis; capite superiore & cristâ nigris; collo superiore fusco, colore saturatiore transversim striato; pennis in colli inferioris ima parte strictissimis longissimis; rectricibus fuscis; rostro superiùs nigro, infernè aurantio; pedibus nigricantibus. . . . . Ardea Freti Hudsonis.

Héron cendré de l'Amérique Septentrionale. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXV; avec une figure exacte Pl.* 135.

Les Anglois l'appellent Ash-colour'd Heron from North-America. *Edwards.*

Ardeam cristatam nostratem crassitie paululùm antecellit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam ex-

Il est un peu plus gros que *notre Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ

trois pieds deux pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds onze pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces ſept lignes & demie de long; ſa queue environ quatre pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces neuf lignes; ſon pied ſix pouces une ligne; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces onze lignes, l'extérieur quatre pouces deux lignes, l'intérieur quatre pouces; & celui de derriere deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes noires, dont quelques-unes ont quatre pouces de longueur, & forment une belle hupe. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge & les côtés de la tête ſont blancs. La partie ſupérieure du col eſt brune, & rayée tranſverſalement d'une

tremam tres pedes duos pollices & ſex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes undecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices & ſeptem cum ſemi lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & novem circiter lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices & novem lineas; pes ſex pollices cum linea unica; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & undecim lineas, extimus quatuor pollices cum lineis binis, intimus quatuor pollices; poſticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Alæ complicatæ ad extremitatem caudæ pertingunt. Partem capitis ſuperiorem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam quatuor pollicum longitudine pollent, elegantemque criſtam efficiunt. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute flavo-virideſcente obducitur. Caput ad latera, gut-

turque

turque albicant. Pars colli ſuperior fuſca eſt, coloreque ſaturatiore tranſverſim ſtriata. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices ex cinereo fuſceſcunt. Partem colli inferiorem & pectus obtegunt pennæ candidæ, majuſculis maculis longitudinalibus nigris, rufeſcente mixtis, inſignitæ. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis, ſtrictiſſimis, pectori incumbentibus. Venter & tectrices caudæ inferiores albicant. Crurum ſuprema pars rufeſcit. Pennæ alas ſubtus cooperientes, ſicut & latera, ſunt cinereo-cœruleſcentes. Margines alarum, ab ipſarum exortu ad articulum carpo humano reſpondentem uſque, veſtiunt plumulæ fuſcæ, rufeſcente fimbriatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, dorſi inſtar, cinereo imbuuntur colore, attamen nonnihil dilutiore: majores à corpore remotiores ſunt fuſcæ, cinereo-fuſceſcente marginatæ. Remiges alarum minores concolores: majores penitùs fuſcæ. Remiges corpori viciniores maximam obtinent

couleur plus foncée. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un cendré-brunâtre. La partie inférieure du col & la poitrine ſont couvertes de plumes blanches, marquées de grandes taches longitudinales noires, mêlées de rouſſâtre. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent ſur la poitrine. Le ventre eſt blanc, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue. Le haut des jambes eſt rouſſâtre. Les couvertures du deſſous des aîles & les côtés ſont d'un cendré-bleuâtre. Le bord de l'aîle, depuis ſon origine juſqu'au pli qui répond à celui du poignet, eſt couvert de petites plumes brunes, bordées de rouſſâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont du même cendré que le dos, mais un peu plus clair: les grandes les plus éloignées du corps ſont brunes, & bordées de cendré-brunâtre. Les moyennes plumes de l'aîle ſont de la même couleur: les grandes ſont tout-à-fait brunes. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée,

preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes. Le demi-bec ſupérieur eſt noir; l'inférieur eſt orangé. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes eſt jaunâtre. Les pieds & les ongles ſont noirâtres. On le trouve à la *Baye de Hudſon.*

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices fuſcæ. Mandibula ſuperior nigra, inferior aurantia. Pars crurum plumis denudata flavicat. Pedes, ungueſque nigricant. Habitat in *Freto Hudſonis.*

8. Le Héron tacheté.

Ardea ſuperne cinereo-fuſceſcens, maculis rufis varia, infernè cinereo-alba; pectore maculis rufis, albis & nigris aſperſo; remigibus apice albis; rectricibus cinereo-fuſceſcentibus; roſtro roſeo; pedibus vireſcentibus . . . . Ardea nævia.

Ardeæ cinereæ tertium genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 383. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 382.
Ardeæ cinereæ tertium genus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 204. *Raj. Syn. Avi. pag.* 98. *N°.* 2.
Ardeæ cinereæ congener. *Jonſt. Avi. pag.* 103.

Il eſt preſqu'auſſi gros que le *Héron ordinaire.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds neuf pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de long; ſa queue ſix pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, un pouce; ſon pied environ cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs,

Ad *Ardeæ vulgaris* craſſitiem accedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & novem pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque quatuor pollices longum eſt; cauda ſex pollices; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes quinque circiter pollices; trium digitorum anticorum medius cum

ungue tres pollices : laterales paulò sunt breviores ; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudæ extremitatem attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices sunt cinereo-fuscescentes, qualibet tamen penna maculâ rufâ terminata. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute nudâ solummodo obtegitur. Guttur, pars colli inferior, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices ex cinereo albicant. Pectus eodem imbuitur colore, sed in tota superficie maculis aspergitur, aliis rufis, aliis albis, nigris alteris. Crurum suprema pars ex cinereo-albo paululùm ad rufescentem inclinat colorem. Remiges alarum ex cinereo fuscescunt, & unaquæque maculâ terminatur candidâ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala

joint avec l'ongle, trois pouces : les latéraux sont un peu plus courts ; & celui de derriere est le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent, jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un cendré-brunâtre, chaque plume étant terminée par une tache rousse. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau nue. La gorge, la partie inférieure du col, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un gris-blanc. La poitrine est de la même couleur, & toute parsemée de taches, les unes rousses, les autres blanches & les autres noires. Le haut des jambes est d'un gris-blanc tirant un peu sur le roussâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un cendré-brunâtre, & terminées chacune par une tache blanche. Les plus proches du corps sont fort lon-

gues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré-brunâtre. La prunelle des yeux eſt noire : leur iris eſt jaune. Le bec eſt de couleur de roſe. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-fuſceſcentibus cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipſorum irides luteæ. Roſtrum roſeo colore imbutum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque vireſcentes. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

** 9. Le Héron gris.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 1.

Ardea ſuperne griſeo-fuſca, infernè alba, griſeo mixta; vertice fuſco; tæniâ ſupra oculos albido & fuſco variâ; gutture albo; collo inferiore griſeo, pennis tæniâ longitudinali fulveſcente in medio notatis; uropygio cinereo-albo; rectricibus griſeo-cinereis, lateralibus albo in apice marginatis : roſtro ſuperiùs & apice nigro, infernè fuſco; pedibus griſeo-fuſcis. . . . . Ardea grisea.

Il n'eſt guères plus gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied huit pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces neuf lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces ſept lignes de long; ſa queue quatre pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, neuf lignes;

Craſſitie *Cornicem* non multùm excedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem octo pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & ſeptem lineas longum eſt; cauda quatuor pollices cum lineis binis; pars cru-

rum plumis denudata novem lineas; pes duos pollices cum novem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum usque productâ, coadunatur. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum unius pollicis & quatuor linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Caput superius fuscum est: ex pennis tamen occipitium obtegentibus quædam viridi-aureo colore variant. Collum superiùs & ad latera vestiunt pennæ griseæ, tæniâ ad fulvum vergente & secundùm scapi longitudinem ductâ notatæ. Dorsi suprema pars & scapulares pennæ minores sunt griseo-fuscæ. Majores pennæ scapulares griseo-cinereæ. Dorsum infimum, uropygium, superiores caudæ tectrices & latera ex cinereo albent. In utroque capitis latere tænia ex-

son pied deux pouces neuf lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur vingt-cinq lignes; & celui de derriere un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds un pouce quatre lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. La partie supérieure de la tête est brune : quelques-unes des plumes de l'occiput sont changeantes en une couleur de verd-doré. La partie supérieure & les côtés du col sont couverts de plumes grises, marquées chacune d'une bande tirant sur le fauve, & qui s'étend selon la longueur de leur tige. La partie supérieure du dos & les petites plumes scapulaires sont d'un gris-brun. Les grandes plumes scapulaires sont d'un gris-cendré. La partie inférieure du dos, le croupion, les couvertures du dessus de la queue & les côtés sont d'un gris-blanc. De chaque côté de la tête est une bande longitudinale, variée de brun & de blanchâtre, qui

s'étend depuis les narines juſqu'au-deſſus des yeux. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau blanchâtre. Les joues ſont variées de blanc & de brun. La gorge eſt blanche. La partie inférieure du col eſt couverte de plumes, qui ſont d'un blanc tirant ſur le fauve dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige, & griſes ſur les deux côtés. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes aſſez longues, qui couvrent une partie de la poitrine, & ſont tout-à-fait blanches. La poitrine & le haut du ventre ſont d'un blanc mêlé de gris. Le bas-ventre & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc ſans aucun mêlange d'autre couleur. Le haut des jambes eſt garni extérieurement de plumes blanches dans leur milieu ſelon la longueur de leur tige, & griſes ſur les côtés; & il eſt couvert intérieurement de plumes tout-à-fait blanches. Les petites couvertures du deſſous des aîles ſont griſes, & marquées chacune d'une bande blanche, qui s'étend ſelon la longueur de leur tige : les grandes ſont d'un gris-blanc & terminées de blanc : de ces dernieres, les

tat longitudinalis fuſco & candicante varia, à naribus ſupra oculos uſque protenſa. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute albidâ tantummodo tegitur. Genæ albo & fuſco variegantur. Guttur albicat. Partem colli inferiorem obtegunt pennæ in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem albo-fulveſcentes, in utroque latere griſeæ. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiuſculis, pectus partim obtegentibus, & penitùs candidis. Pectus & venter ſupremus albent, & aliquid griſei admixtum habent. Venter imus, inferioreſque caudæ tectrices albicant, nullo altero colore admixto. Crurum partem ſupremam exteriùs veſtiunt pennæ in medio ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem albæ, ad latera griſeæ; interiùs verò illam cooperiunt pennæ penitùs candidæ. Inferiores alarum tectrices minores ſunt griſeæ, tæniâ candidâ, ſecundùm ipſarum ſcapi longitudinem ductâ, inſignitæ : majores cinereo-albæ, albo terminatæ : ex majoribus autem corpori finitimæ marginibus exterio-

ribus candidis quoque præditæ sunt. Superiores alarum tectrices minimæ ex griseo fuscescunt, & tæniâ albo-fulvescente, secundùm ipsarum scapi longitudinem ductâ, notantur : minores sunt griseæ : majores ex griseo cinereæ, maculâ candidâ terminatæ. Alam notham componunt pennæ tectricibus alarum majoribus superioribus concolores, & insuper exteriùs albo fimbriatæ. Viginti quatuor remigibus griseo-cinereis ala constat : octodecim primores (decimâ tamen exceptâ) maculâ albâ in apice præditæ sunt : sex reliquæ, à decima nona scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, sunt immaculatæ. Quæ sex novissimè dictæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cauda conflatur : binæ intermediæ sunt griseo-cinereæ : laterales omnes eodem imbutæ colore, & insuper albo in apice marginatæ : quæ margo alba eò majorem obtinet latitudinem, quò rectrix fit exterior. Mandibula superior nigra, attamen ad latera candicans : inferior fusca, exceptâ ex-

plus proches du corps sont aussi bordées extérieurement de blanc. Les plus petites couvertures du dessus des aîles sont d'un gris-brun, & ont chacune une bande d'un blanc-fauve, qui s'étend selon la longueur de leur tige : les moyennes sont grises : les plus grandes sont d'un gris-cendré, & terminées par une tache blanche. Les plumes de l'aîle bâtarde sont de la même couleur que ces dernieres couvertures, & de plus bordées extérieurement de blanc. L'aîle est composée de vingt-quatre plumes d'un gris-cendré : les dix-huit premieres (si l'on en excepte la dixieme) sont terminées chacune par une tache blanche : les six autres, sçavoir depuis la dix-neuviéme jusqu'à la vingt-quatriéme inclusivement, sont sans taches. Ces six dernieres sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont d'un gris-cendré : toutes les latérales sont de la même couleur, & de plus bordées de blanc par le bout : cette bordure est d'autant plus large que la plume est plus extérieure. Le demi - bec supérieur est noir, excepté sur ses côtés, où il est

blanchâtre : l'inférieur eſt brun, excepté ſon extrémité, qui eſt noire. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un gris-brun. On le trouve ſur les bords des rivieres & des étangs. *Du cabinet de M. l'Abbé Aubry.*

tremitate nigrâ. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque griſeo-fuſci. Fluviorum & ſtagnorum ripas frequentat. *Ex muſeo D. Aubry.*

10. Le Héron huppé de Virginie.

Ardea criſtata, fuſca; collo inferiore & pectore rufeſcentibus, maculis longitudinalibus fuſcis variis; remigibus nigris; rectricibus fuſcis; roſtro ſuperne & infernè fuſco, ad latera fuſco-flavicante; pedibus fuſcis . . . . . Ardea Virginiana cristata.

Ardea occipite criſtato, dorſo cinereo, femoribus rufis, pectore maculis oblongis nigris. Herodias. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 11.

Ardea criſtata maxima Americana. *Klein. Avi. pag.* 125. *N°.* 14.

Grand Héron huppé. *Catesb. append. pag.* 10; *avec une aſſez bonne figure de la tête & du col. Pl.* 10. *fig.* 1.

Les Anglois l'appellent Largest Crested Heron. *Catesb.*

Il eſt plus grand & plus gros que toutes les autres eſpeces de *Héron* connues. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui des ongles eſt de plus de cinq pieds. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a près de huit pouces de long. La tête eſt couverte de plumes brunes : celles qui partent de l'occiput, ſont étroites & fort longues, quelques-unes ayant juſqu'à cinq pouces de longueur, & forment une belle

Omnium *Ardearum* hactenus cognitarum hæc eſt maxima & craſſiſſima ſpecies. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad extremos ungues quinque pedes & amplius explet. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octo ferè pollices longum eſt. Caput obtegunt pennæ fuſcæ : quæ ab occipitio oriuntur, ſtrictiſſimæ ſunt & longiſſimæ, quædam enim quinque pollicum longitudinem obti-

nent

nent, elegantem efformant criſtam, quam Avis ad libitum erigere aut contrahere poteſt. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute obtegitur fuſco-flavicante. Guttur & pars colli ſuperior rufeſcunt. Collum inferius & pectus eodem imbuuntur colore, maculis longitudinalibus fuſcis vario. Dorſum, uropygium, ſcapulares pennas, ventrem, latera, crurum partem ſupremam, tectrices caudæ ſuperiores & inferiores, & pennas alas ſuperne & infernè cooperientes fuſcus tingit color. Remiges alarum ſunt nigræ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuſcis cauda conſtat. Roſtrum ſuperne & infernè fuſcum, ad latera verò fuſco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Habitat in *Virginia*, ibique lacuum & fluviorum ripas frequentat,

hupe, que l'Oiſeau peut redreſſer ou abaiſſer à volonté. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un brun-jaunâtre. La gorge & la partie ſupérieure du col ſont rouſſâtres. La partie inférieure du col & la poitrine ſont de la même couleur, & variées de taches longitudinales brunes. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, celles du deſſus & du deſſous des aîles, & les côtés ſont bruns. Les plumes de l'aîle ſont noires. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes. Le bec eſt brun en-deſſus & en-deſſous, & d'un brun-jaunâtre ſur ſes côtés. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Virginie*, où il ſe tient ſur les bords des lacs & des rivieres, & ſe nourrit de

Poiſſons, de *Grenouilles*, de *Lézars*, &c.

& *Piſcibus*, *Ranis*, *Lacertis*, &c. victitat.

II. Le Héron hupé du Mexique.

Ardea criſtata, ſuperne (nigro-vireſcens, *mas*) (fuſca, albo varia, *fœmina*), infernè alba, (fuſco variegata, *fœmina*); vertice & criſtâ nigris; tæniâ ab oculo ad oculum, & collo candidis; alis ſuperne cinereo-vireſcentibus; rectricibus cinereis; roſtro ſuperne & infernè nigro, ad latera flaveſcente; pedibus dilutè flavis .... Ardea Mexicana cristata.

Avis ſicca. *Euſ. Nieremb. pag.* 222. (*Mas.*)
Avis ſicca, Hoactli, ſeu Tobactli. *Willugh. Ornith pag.* 300. (*Mas*).
Hoactli, ſeu Avis ſicca. *Raj. Syn. Avi. pag.* 179. *N°.* 8. (*Mas*).
Hoactli, ſeu Tobactli, id eſt, Avis ſicca. *Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag.* 26. *cap. LIII.* (*Mas*).
Jonſt. Avi. pag. 128. (*Mas*).
Hoacton. *Euſ. Nieremb. pag.* 225. (*Fœmina*).
Fern. Hiſt. Nov. Hiſp. pag. 13. *cap. I.* (*Fœmina*).
Willugh. Ornith. pag. 302. (*Fœmina*).
Les Eſpagnols du Mexique appellent le mâle Martinete Pescador. *Fern. Willugh.*
Les Mexiquains, le mâle, Hoactli; Tobactli; & *la femelle*, Hoacton. *Nieremb. Fern. Willugh. & quelques-uns* Xoxouhqui-hoactli. *Nieremb. Fern.*

Il eſt de la groſſeur d'une *Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds trois pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long; ſa queue environ ſix pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, ſon pied & celui du mi-

Cum *Gallina* craſſitie convenit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem duos pedes & tres pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & novem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices longum eſt; cauda ſex circiter pollices; pars crurum plumis denudata, pes, triumque digito-

rum anticorum medius cum ungue, simul commensurati, unum pedem. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Capitis verticem obtegunt pennæ nigræ, quarum quædam maximâ longitudine pollent, elegantemque cristam efficiunt. Caput anterius cingit tænia candida, ab oculo ad oculum producta. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & tantummodo cute flavicante coopertum. Guttur, collum, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam subtus obtegentes, inferioresque alarum tectrices albicant. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex nigro splendidè viresçunt. Tectrices alarum superiores sunt cinereæ, & aliquid viridis admixtum habent. Remiges cinereæ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereæ. Oculi magni sunt &

lieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, le tout pris ensemble, un pied. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Le sommet de la tête est couvert de plumes noires, dont quelques-unes sont fort longues, & forment une belle hupe. Le devant de la tête est entouré d'une bande blanche, qui s'étend d'un œil à l'autre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont blancs. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un noir-verd assez brillant. Les couvertures du dessus des aîles sont d'un cendré sur lequel est une légere teinte de verd. Les plumes de l'aîle sont cendrées. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes cendrées. Les yeux sont

grands & noirs : leur iris eſt jaune; & les paupieres ſont rouges. Le bec eſt noir deſſus & deſſous, & jaunâtre ſur ſes côtés. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune clair.

La *femelle* différe du *mâle* en ce que le deſſus de ſon corps eſt d'un brun varié de blanc, & le deſſous d'un blanc varié de brun. Du reſte elle lui reſſemble aſſez bien. Elle fait ſon nid, & éleve ſes Petits dans les roſeaux.

On les trouve au *Mexique*, où ils ſe tiennent ſur les bords des lacs, & ſe nourriſſent de *Poiſſons*.

nigri : ipſorum irides luteæ; palpebræ verò rubræ. Roſtrum ſuperne & infernè nigrum, ad latera verò flaveſcens. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt dilutè flavi.

Fœmina à *mare* diſcrepat corpore ſuperiore fuſco, albo variegato, & corpore inferiore albo, fuſco vario. In reliquis cum illo ſatis benè convenit. In arundinetis nidificat, & Sobolem educat.

Habitant in *Mexico*, ibique lacuum ripas frequentant, & *Piſcibus* victitant.

12. LE HÉRON POURPRÉ.

Ardea ſuperne caſtaneo-purpurea, infernè cineraſcens; vertice cinereo-nigricante; collo ſuperne cinereo, lineolis nigricantibus vario, collo inferiore & pectore maculis obſcurè flavis aſperſis; rectricibus caſtaneo-purpureis; roſtro ſuperiùs flavo-virideſcente, in exortu & infernè flavicante; pedibus griſeo-fuſcis . . . . ARDEA PURPURASCENS.

Ardea cinerea flaveſcens, nova ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 20. *hujus icon minùs accurata Tab.* 8.
Ardea cinerea flaveſcens, nova ſpecies, Marſilli. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 12.

Il eſt à peu près de la grandeur & de la groſſeur du *Héron ordinaire*; mais il a la tête plus groſſe, & le bec plus allongé. Le ſommet de la tête eſt d'un cendré-noirâtre. La partie ſu-

Magnitudine & craſſitie cum *Ardea vulgari* circiter convenit; capite tamen craſſiori & roſtro magìs elongato donatur. Vertex capitis ex cinereo nigricat. Pars colli ſu-

perior cinereo tingitur colore, lineolis nigricantibus vario. Collum inferius & pectus sunt quoque cinerea, maculis obscurè flavis eleganter aspersa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavescente coopertum. Dorsum, uropygium, scapulares pennas, superioresque caudæ tectrices tingit color castaneo-purpureus. Venter, crurum suprema pars & latera cinereo imbuuntur; qui color, versùs imum ventrem procedendo, magìs magìsque fit dilutior. Pennæ caudam subtus obtegentes sunt quoque dilutè cinereæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur: majores à corpore remotiores sunt fusco-nigricantes. Remiges alarum ex fusco similiter nigricant. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneo purpureis cauda conflatur. Mandibula superior in exortu flavicans, in reliqua longi-

périeure du col est d'un cendré varié de petites lignes noirâtres. La partie inférieure du col & la poitrine sont pareillement cendrées, & joliment parsemées de taches d'un jaune obscur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. Le ventre, le haut des jambes & les côtés sont cendrés: cette couleur devient de plus en plus claire, en approchant vers le bas-ventre. Les couvertures du dessous de la queue sont de même d'un cendré clair. Les petites du dessus des aîles, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos: les grandes les plus éloignées du corps sont d'un brun-noirâtre. Les plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-pourpré. Le demi-bec supérieur est jaunâtre à son origine, & d'un jaune-verdâtre dans le reste

de ſa longueur; le demi-bec inférieur eſt entiérement jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un gris-brun. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve ſur les bords du *Danube*.

tudine flavo-virideſcens, mandibula inferior penitùs flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque griſeo-fuſci. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum uſque productâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas verſatur.

13. Le Héron pourpré du Mexique.

Ardea caſtaneo-purpurea, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs; capite dilutè ſpadiceo, vertice nigro; remigibus ſaturatè ſpadiceis; rectricibus caſtaneo-purpureis .... Ardea Mexicana purpurascens.

Ardea Mexicana; ſeu Avis Xoxouquihaactli. *Seb. Vol. I. pag.* 100. *hujus icon non ſatis accurata Tab. LXIV. fig.* 2.
Crex. *Moehr. Avi. Gen.* 82.

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ un pied, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; ſa queue environ trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes; ſon pied un pouce huit lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pou-

Cornicem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem circiter explet, & ad extremos ungues tredecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & tres lineas longum eſt; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem cum octo lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pol-

lices & totidem lineas, extimus unum pollicem & decem cum semi lineas, intimus unum pollicem cum novem lineis; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Vertex capitis nigro tingitur colore. Reliquum caput est dilutè spadiceum. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute nudâ obtegitur. Pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, alas superne vestientes, superioresque caudæ tectrices sunt castaneo-purpureæ. Guttur, collum inferius, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes idem tingit color, sed dilutior. Remiges alarum sunt saturatè spadiceæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cas-

ces deux lignes, l'extérieur un pouce dix lignes & demie, l'intérieur un pouce neuf lignes; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête est d'un rouge-bai clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau nue. La partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un marron-pourpré. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont de la même couleur, mais plus claire. Les plumes de l'aîle sont d'un rouge-bai foncé. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un marron-

pourpré. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On le trouve au *Mexique*.

taneo-purpureæ. Cujus coloris ſint roſtrum & pedes, prorſus me latet. Habitat in *Mexico*.

** 14. Le Héron pourpré huppé.

Voyez Pl. XXXVI. Fig. 2.

Ardea criſtata, ſuperne obſcurè olivacea, infernè caſtaneo-purpuraſcens; vertice & criſtâ ſplendidè nigris; collo ſupremo rufo, triplici tæniâ nigrâ notato; colli inferioris imâ parte maculis longitudinalibus nigris variâ; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis; faſciâ longitudinali à pectore ad anum nigrâ; rectricibus ſaturatè cinereis, ſuperne ad olivaceum, infernè ad cœruleſcentem colorem vergentibus; roſtro ſuperiùs dilutè fuſco, infernè flavicante, apice nigricante; pedibus vireſcentibus . . . .
Ardea criſtata purpuraſcens.

Il eſt beaucoup moins gros que le *Héron ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds dix pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces huit lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue cinq pouces deux lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces cinq lignes; ſon pied quatre pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces ſept lig-

Ardeæ vulgari multùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes decem pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues tres pedes quatuor pollices & octo lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda quinque pollices cum lineis binis; pars crurum plumis denudata duos pollices & quinque lineas; pes quatuor pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius, cum ungue, quatuor pollices

&

& septem lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; posticus autem duos pollices & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum & sesquipollicis intervallo distant; alæ verò complicatæ ad caudæ extremitatem usque protenduntur. Partem capitis superiorem obtegunt pennæ splendidè nigræ : quæ capitis verticem cooperiunt, longæ sunt & strictissimæ, elegantemque cristam efficiunt : ex illis autem pennis binæ quatuor pollicum & novem linearum longitudinem obtinent. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute obducitur flavicante. In utroque capitis latere exigua extat tænia nigra, ab oris angulis orta, & ad occipitium usque obliquè producta. Guttur albicat. Collum ab ipsius exortu, idque caput versùs, ad mediam longitudinem usque rufum, tribus notatum tæniis longi-

nes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derriere deux pouces huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds un pouce six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est couverte de plumes d'un noir brillant : celles du sommet de la tête sont longues & très-étroites, & forment une jolie hupe : deux de ces plumes ont jusqu'à quatre pouces neuf lignes de longueur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. De chaque côté de la tête est une petite bande noire, qui part des coins de la bouche, & monte obliquement jusqu'à l'occiput. La gorge est blanche. Le col depuis son origine vers la tête jusqu'à la moitié de sa longueur est roux, & marqué de trois bandes longitudinales noires, dont une placée au milieu, qui part de l'occiput & s'étend sur la partie supérieure du col, & une autre de chaque côté, qui

part des coins de la bouche, & s'étend tout le long des côtés du col. Le reſte de la longueur du col eſt cendré en-deſſus, cette couleur tirant un peu ſur l'olivâtre, roux ſur les côtés, & d'un blanc-rouſſâtre en-deſſous : cette derniere couleur eſt variée de taches longitudinales noires, qui occupent le côté intérieur de chaque plume. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues & très-étroites, dont l'extrémité eſt d'un blanc ombré d'une légere teinte de rouſſâtre. La partie ſupérieure du dos eſt d'un olivâtre ſombre, mais brillant. Les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur ; cependant les ſupérieures, qui ſont très-longues & très-étroites, & finiſſent en pointe, ſont terminées de roux ; & les inférieures, qui ſont aſſez larges, ſont d'un cendré-foncé. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue, ſont de cette derniere couleur. La poitrine eſt d'un marron-pourpré très-brillant. Le ventre eſt de la même couleur ; mais il eſt marqué d'une large bande noire, qui s'étend ſur ſon milieu depuis la poitrine juſqu'à l'anus. Les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc mêlé

tudinalibus nigris, unâ ſcilicet in medio poſitâ, ab occipitio ortâ, & ſupra partem colli ſuperiorem productâ, utrinque autem alterâ, ab oris angulis ortâ, & ſecundùm colli latera protenſâ. Collum in reliqua longitudine ſuperne cinereum, cinereo colore paululùm ad olivaceum vergente, ad latera rufum, infernè albo-rufeſcens : qui noviſſimus color maculis variegatur longitudinalibus nigris, cujuſlibet pennæ latus interius occupantibus. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis & ſtrictiſſimis, in extremitate albis & aliquâ rufeſcentis mixturâ adumbratis. Dorſi ſuprema pars eſt obſcurè quidem, attamen ſplendidè olivacea. Scapulares pennæ concolores ; ſuperiores tamen, quæ longiſſimæ ſunt, ſtrictiſſimæ & in acumen deſinentes, rufo terminantur ; inferiores verò, quæ latiuſculæ, ſunt ſaturatè cinereæ. Dorſum infimum, uropygium, ſuperioreſque caudæ tectrices ſimiliter tingit color ſaturatè cinereus. Pectus ſplendidiſſimo imbuitur caſtaneo-purpuraſcente. Venter eodem tingitur colore ; latâ autem

insignitur fasciâ nigrâ, in ipsius medio à pectore ad anum usque protensâ. Pennæ caudam subtus obtegentes albent, & aliquid rufi admixtum habent, nigroque terminantur. Crurum suprema pars est rufa. Latera ex cinereo ad violaceum inclinant, sed non ita quàm in dorso, splendidè. Inferiores alarum tectrices minores ex rufo ad castaneum vergunt : majores saturatè cinerascunt. Margines alarum sunt dilutè rufæ. Superiores alarum tectrices minores sunt obscurè quidem, sed splendidè olivaceæ ; qui color supra quarumdam pennarum margines & quarumdam aliarum extremitatem paululùm rufi admixtum habet : majores corpori finitimæ cinereæ, in interiore cujuslibet pennæ latere nonnihil ad cœrulescentem inclinantes colorem : majores à corpore remotiores cinereo-nigricantes. Remiges majores ex cinereo similiter nigricant : minores sunt in latere exteriore ex cinereo ad olivaceum vergentes, in interiore saturatè cinereæ ; ex istis tamen excipiendæ sunt quatuor corpori viciniores in utroque latere ex cinereo ad olivaceum inclinantes. Quæ

d'un peu de roux, & terminées de noir. Le haut des jambes est roux. Les côtés sont d'un cendré tirant sur l'olivâtre, mais moins brillant que celui du dos. Les petites couvertures du dessous des aîles sont d'un roux tirant sur le marron : les grandes sont d'un cendré foncé. Le bord de l'aîle est d'un roux très-clair. Les petites couvertures du dessus des aîles sont d'un olivâtre sombre, mais brillant ; cette couleur est mêlée d'un peu de roux sur les bords de quelques plumes & sur le bout de quelques autres : les grandes les plus proches du corps sont d'un cendré qui tire un peu sur le bleuâtre sur le côté intérieur de chaque plume : les grandes les plus éloignées du corps sont d'un cendré-noirâtre. Les grandes plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur : les moyennes sont du côté extérieur d'un cendré tirant sur l'olivâtre, & du côté intérieur d'un cendré foncé ; il faut cependant en excepter les quatre plus proches du corps, dont le cendré tire sur l'olivâtre des deux côtés. Ces quatre dernieres plumes sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La

queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré foncé, tirant ſur l'olivâtre en-deſſus & ſur le bleuâtre en-deſſous. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un brun clair, excepté ſon bout, qui eſt noirâtre ; l'inférieur eſt jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres; & les ongles noirâtres. On le trouve ſur les bords des rivieres & des étangs, où il ſe nourrit de *Poiſſons. Du cabinet de Madame de Bandeville.*

quatuor noviſſimè dictæ remiges maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus ſaturatè cinereis, ſuperne ad olivaceum, infernè ad cœruleſcentem colorem vergentibus. Mandibula ſuperior dilutè fuſca, attamen in extremitate nigricans; inferior flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque vireſcentes; ungues verò nigricantes. Juxta fluminum & ſtagnorum ripas verſatur, ibique *Piſcibus* victitat. *Ex muſeo D. de Bandeville.*

** 15. LE HÉRON BLANC.

Ardea in toto corpore alba; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo viridi; roſtro croceo-flavicante; pedibus nigris .... ARDEA CANDIDA.

Ardea alba tota; capite lævi. *Faun. Suec. Linn. N°.* 132.

Ardea capite lævi, corpore albo, roſtro rubro. Ardea alba. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 17.

Ardea alba. *Geſn. Avi. pag.* 213, *in qua hujus icon non ſatis accurata. Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 389. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 390.

Jonſt. Avi. hujus icon à Geſnero mutuata Tab. 51.

Linn. Syſth. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *ſp.* 2.

Ardea alba; Albardeola. *Geſn. icon. Avi. pag.* 118, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*

Ardea alba major. *Willugh. Ornith. pag.* 205. *hujus icon ſatis accurata Tab. XLIX.*

Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°. A.* 4.

Marsil. Danub. Tom. V. pag. 12. *hujus icon satis accurata Tab.* 4.
Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag. 478.
Ardea alba major Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 122. *N°.* 2.
Ardea alba major cristâ carens. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 364.
Ardea alba maxima. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 314. *N°. II. hujus icon non satis accurata Tab.* 266.
Ardea alba cirrata Jonstoni. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 6.
Ardea alia alba. *Charlet. Exer. pag.* 109. *N°.* 2.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 2.
Ardea candida. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 224.
Aztatl, seu Ardea candens. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 14. *cap. V.*
Guira-tinga. *Joan. de Laët. Nov. orb. pag.* 575.
Guira-tinga Brasilienſibus. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 210.
Jonst. Avi. pag. 144.
Raj. Syn. Avi. pag. 101. *N°.* 17.
Guira-tinga Brasilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 189. *N°.* 1.
Guira-tinga Brasilienſibus, Garza Lusitanis, Ardeæ ſpecies Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 210.
Quiratinga. *Jonst. Avi. pag.* 150.
Héron blanc. *Bel. Hist. Nat. des Oiſ. pag.* 191.
Les Grecs l'appellent Ἐρωδιὸς λευκος, *ou* Λευκερώδιος. *Gesn. Schwenck. Klein.*
Les Catalans, AGRO BLANC. *Barr.*
Les Italiens, AIRON BIANCO. *Gesn.* GIRONE; GARZA BIANCHA. *Gesn. Aldrov.* GARZETTA BIANCA. *Charlet.*
Les Vénitiens, AIRON BIANCO. *Marsil.* GARZA. *Willugh. Marsil.*
Les Allemands, WYSSER REIGER. *Gesn. Aldrov.* WEISSER REGER; WEISSER REIGEL. *Schwenck.*
Les Saxons, REIGER. *Gesn. Aldrov.*
Les Anglois, WHITE HERON. *Gesn. Aldrov.* GREAT WHITE HERON. *Willugh. Raj.*
Les Anglois de la Jamaïque, WHITE GAULDING. *Browne.* LARGEST WHITE GAULDING. *Sloane. Raj.*
Les Portugais du Brésil, GARZA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Brasiliens, GUIRA-TINGA. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj.*
Les Mexiquains, AZTATL. *Fern.*

Cum *Ardea crista* circiter crassitie convenit. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tres pedes unum pollicem & septem lineas explet, & ad

Il est à peu près de la grosseur du *Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de trois pieds un pouce sept lignes, & jusqu'à celui des on-

gles de quatre pieds deux pouces deux lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces trois lignes de long; ſa queue ſix pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre pouces cinq lignes; ſon pied dix pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces trois lignes, l'extérieur trois pouces huit lignes, l'intérieur trois pouces trois lignes; & celui de derriere deux pouces ſix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds dix pouces ſept lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps ſont couverts de plumes d'un blanc de neige. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau verte. Les plumes de l'aîle ſont blanches. Les plus proches du corps ſont très-longues, & s'é-

extremos ungues quatuor pedes duos pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices & tres lineas longum eſt; cauda ſex pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & quinque lineas; pes decem pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & tres lineas, extimus tres pollices cum octo lineis, intimus tres pollices & totidem lineas; poſticus autem duos pollices & ſex lineas. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt quatuor pedum decem pollicum & ſeptem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, univerſumque corpus veſtiunt pennæ niveo candore nitentes. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè cooperiunt, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute viridi tectum.

Remiges alarum albent. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Rostrum croceo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Juxta maris littora degit. *Ex museo Realmuriano.*

tendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est d'un jaune de safran. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 16. L'Aigrette.

Ardea cristata, in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, viridi; rostro nigro; pedibus nigro-virescentibus . . . . Egretta.

Ardea alba minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 389. *hujus icon pessima pag.* 391.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 393. *hujus icon satis accurata, si cristam haberet, pag.* 394.
Willugh. Ornith. pag. 205.
Marsil. Danub. Tom. V. pag. 14. *hujus icon accurata. Tab.* 5.
Ardea alba minor, seu Garzetta Gesneri & Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 99. *N°.* 5.
Ardea alba minor secunda, Garzetta etiam dicta Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206.
Ardea alba minor cristata. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 364.
Ardea alba maxima. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 124.
Ardea Americana, alba maxima Sloan. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen.* 1. *sp.* 16.
Leucorodios, seu Ardea alba minor alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 392. *hujus icon non satis accurata pag.* 395.
Garzetta. *Gesn. Avi. pag.* 214.
Garzetta Italorum. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 3.
Garzetta bianca. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Egretta Gallorum. *Jonst. Avi. pag.* 104.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 4.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 4.

Aigrette. *Geſn. Avi. pag.* 795.

Aigrette Gallorum. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 392, *in qua hujus icon à Bellonio mutuata.*

Aigrette. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 195 ; *avec une mauvaiſe figure pag.* 196. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 43 *b*, *dans laquelle eſt la même figure.* *Du Tertre. Hiſt. des Antil. Tom. II. pag.* 277.

Les Italiens l'appellent AGROTI. *Bel. Aldrov.* GARZETTA. *Geſn. Aldrov. Jonſt.*

Les Boulonnois, GARZETTA ; GARZA BIANCA. *Aldrov.*

Les Anglois, EGRET, *ou* RED LEGG'D HERON ; CRYALL. *Charlet.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur d'une *Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds ſix pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces trois lignes de long ; ſa queue quatre pouces ſix lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre pouces ; ſon pied cinq pouces ſix lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces ſix lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur un pouce onze lignes ; & celui de derriere dix-huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds dix pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſ-

Craſſitie *Gallinam* circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem & undecim pollices explet, & ad extremos ungues duos pedes ſex pollices & totidem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor pollices & tres lineas longum eſt ; cauda quatuor pollices & ſex lineas ; pars crurum plumis denudata quatuor pollices ; pes quinque pollices & ſex lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices cum ſex lineis, extimus duos pollices & totidem lineas, intimus unum pollicem & undecim lineas ; poſticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius digito extimo membranâ, ad primum articulum uſque productâ, coadunatur. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum decem

pollicum

pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, guttur, collum, universumque corpus pennis vestiuntur candidissimis. Scapulares, alas superne & infernè cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores tingit idem color. Ab occipitio quædam oriuntur pennæ quinque circiter pollicum longitudinem obtinentes, strictissimæ & valdè flexibiles, elegantem cristam efficientes; unde *Egrettæ* nomen. Scapulares superiores sunt quoque longissimæ, strictissimæ & flexibiles. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute viridi obducitur. Remiges alarum albicant. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides pallidè flavæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque nigro-viresçentes; ungues verò nigri. Juxta maris littora versatur. *Ex museo Realmuriano.*

qu'au bout de la queue. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un beau blanc. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. De l'occiput partent quelques plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & fléxibles, qui forment une jolie aigrette; d'où l'Oiseau a tiré son nom. Les supérieures des scapulaires sont pareillement très-longues, étroites & flexibles. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est d'un jaune pâle. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un noir-verdâtre; & les ongles noirs. On la trouve sur les bords de la mer. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

17. Le Héron blanc du Brésil.

Ardea in toto corpore alba ; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo , roſtroque croceis; pedibus nigris . . . . Ardea Brasiliensis candida.

Alia Ardeæ ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 220.
Jonſt. Avi. pag. 150.
Ardea nivea *Muſ. Worm. pag.* 307.

Il eſt à peu près de la groſſeur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ deux pieds onze pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a cinq pouces de long; ſa queue eſt de la même longueur; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, eſt longue d'environ quatre pouces; ſon pied de ſix pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, de quatre pouces: les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Tout ſon corps eſt cou-

Præcedentem craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & undecim circiter pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quinque pollices longum eſt; cauda eâdem longitudine pollet; pars crurum plumis denudata quatuor circiter pollices longa; pes ſex pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices: laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Alæ complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. In univerſo corpore pennis veſtitur albis. Spatium roſtrum inter &

oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute croceo colore imbutâ tectum. Remiges alarum candidæ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum croceo colore tinctum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Habitat in *Brasilia*.

vert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau de couleur de safran. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. La prunelle des yeux est noire : leur iris est de couleur d'or. Le bec est de couleur de safran. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. On le trouve au *Brésil*.

18. Le Héron blanc de la Caroline.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo, rostroque rubris; pedibus viridibus . . . . Ardea Carolinensis candida.

Ardea alba minor Carolinienſis. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 10.
Petit Héron blanc. *Catesb. Tom. I. pag.* 77; *avec une figure exacte Pl.* 77.
Les Anglois l'appellent Little White Heron. *Catesb.*

Cornici crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam octodecim circiter pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem novem pollices & sex lineas. Ros-

Il n'est pas si gros qu'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ dix-huit pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied neuf pouces six lignes. Son bec depuis sa

pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long; ſa queue environ trois pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied deux pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur ſeize lignes; & celui de derriere treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Tout ſon corps eſt couvert de plumes blanches. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau rouge. Les plumes de l'aîle ſont blanches. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes blanches. L'iris des yeux eſt jaune. Le bec eſt rouge. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verds. On le trouve en été à *la Caroline*. Il

trum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & decem lineas longum eſt; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes duos pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus ſexdecim lineas; poſticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Univerſum corpus pennis veſtitur candidis. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute rubrâ obtegitur. Remiges alarum albicant. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices candidæ. Oculorum irides luteæ. Roſtrum rubrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virides. Æſtate habi-

tat in *Carolina*. Juxta fluviorum & stagnorum ripas versatur, paludesque frequentat. *Piscibus*, *Ranis*, &c. victitat.

se tient sur les bords des rivieres & des étangs, & dans les marais. Il se nourrit de *Poissons*, de *Grenouilles*, &c.

19. Le Héron blanc du Mexique.

Ardea in toto corpore alba; spatio rostrum inter & oculos nudo luteo; rostro purpureo; pedibus pallidè purpurascentibus . . . . Ardea Mexicana candida.

Ardea Mexicana minima candidissima, Hoitzilaztatl dicta Hernandezii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 22.
Hoitzilaztatl. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 27. *cap. LXII.*
Les Mexiquains l'appellent Hoitzilaztatl. *Fern.*

Ad *Columbæ* crassitiem accedit, aut saltem eam non superat. In toto corpore pennis vestitur albis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo coopertum. Remiges alarum candidæ. Corpori finitimæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus albis cauda conflatur. Rostrum purpureum. Pars crurum plumis denudata, pedesque eodem imbuti colore, sed pallidiore; ungues verò fusci. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad pri-

Il est tout au plus de la grosseur d'un *Pigeon*. Tout son corps est couvert de plumes blanches. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Les plumes de l'aîle sont blanches. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. Le bec est pourpre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont de la même couleur, mais plus pâle; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une

membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve au *Mexique*, où il ſe tient ſur les bords des lacs, & s'y nourrit de *Poiſſons*.

mum articulum uſque protenſâ. Habitat in *Mexico*, ibique lacuum ripas frequentat, & *Piſcibus* victitat.

20. LE PETIT HÉRON BLANC.

Ardea alba; vertice & pectore croceis; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo, roſtroque luteis; pedibus flavo-croceis.... ARDEA CANDIDA MINOR.

Ardea vertice croceo. *Jonſt. Avi. pag.* 104.
Ardea minor alia vertice croceo. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 393. *hujus icon ſatis accurata pag.* 396.
Ardea alba minor tertia Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206. *Raj. Syn. Avi. pag.* 99. *N°.* 6.

Il eſt moins grand que l'*Aigrette*; mais il eſt plus gros. Le ſommet de la tête eſt de couleur de ſafran. Le reſte de la tête, la gorge, le col, le dos, le croupion, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont couverts de plumes blanches. Les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue ſont de la même couleur. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. La poitrine eſt de couleur de ſafran, mais plus pâle que le ſommet de la tête. Les plumes de l'aîle ſont blanches. Les plus proches du

Egrettæ magnitudine cedit; illam tamen craſſitie ſuperat. Vertex capitis croceo imbuitur colore. Reliquum caput, guttur, collum, dorſum, uropygium, ventrem, crurum partem ſupremam & latera veſtiunt pennæ albæ. Scapulares, quæ alas ſuperne & infernè cooperiunt, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores concolores. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & cute luteâ ſolummodo coopertum. Pectus croceo tingitur colore, ſed quàm in capitis vertice pallidiore. Remiges alarum albicant. Corpori viciniores maximam ob-

tinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus candidis cauda constat. Oculorum irides luteæ. Rostrum, quod quidem breviusculum, similiter luteum. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavo-crocei : digiti tamen, qui longissimi, fusci sunt, & annulis candicantibus circumdati; ungues verò fusci. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes blanches. L'iris des yeux est jaune. Le bec, qui est assez court, est de la même couleur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un jaune de safran : cependant les doigts, qui sont fort longs, sont bruns, & entourés d'anneaux blanchâtres ; les ongles sont bruns. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

21. Le Héron noir.

Ardea nigricans ; tectricibus alarum superioribus cinereo-cœrulescentibus ; rectricibus nigricantibus ; rostro, pedibusque nigris . . . . Ardea nigra.

Ardea nigra. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 224.
Klein. Avi. pag. 123. *N°.* 3.
Les Allemands l'appellent Schwartzer Reger. *Schwenck.*

Magnitudine & crassitie *Ardeam vulgarem* æmulatur. Per universum corpus pennis vestitur nigricantibus. Scapulares, alas subtus obtegentes, tectricesque caudæ superiores & inferiores sunt

Il est de la grandeur & de la grosseur du *Héron ordinaire*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Les scapulaires, les couvertures du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont

de la même couleur. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau noire. Les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un cendré-bleuâtre. Les plumes de l'aîle ſont noirâtres. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Siléſie.*

quoque nigricantes. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute nigrâ obducitur. Superiores alarum tectrices ex cinereo cœruleſcunt. Remiges nigricant. Corpori viciniores longiſſimæ ſunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum uſque productâ, coadunatur. Habitat in *Sileſia.*

22. LE HÉRON NOIR A COLLIER.

Ardea nigricans; collo torque albo cincto; rectricibus nigricantibus; roſtro luteo, in medio & apice maculâ nigrâ ſuperne & infernè notato; pedibus nigris . . . . ARDEA NIGRA TORQUATA.

Ardeæ congener. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 412, *in qua hujus icon ſatis accurata.*

Ardeæ congener Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.*

Ardeæ congener Aldrovandi, ſeu nigra. *Raj. Syn. Avi. pag.* 102. *N°.* 19.

Ardea nigra. *Jonſt. Avi. pag.* 105. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.

Ardea nigra Aldrovandi. *Charlet. Exer. pag.* 110. *N°.* 8.
Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°.* 8.

Ardea nigra Jonſtoni. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 4.

Cum

Cum *Numenio* crassitie circiter convenit. Rostro donatur, proportione servatâ, quàm aliarum *Ardearum* rostrum multò breviore. In toto corpore pennis vestitur nigricantibus. Collum tamen cingit torquis albus. Remiges alarum nigricant. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Rostrum luteum, binis superne & infernè notatum maculis nigris, unâ scilicet mediam versùs longitudinem positâ, alterâ in extremitate collocatâ. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

Il est à peu près de la grosseur du *Courly*. Son bec est proportionnellement beaucoup plus court que celui des autres *Hérons*. Tout son corps est couvert de plumes noirâtres. Le col est cependant entouré d'un collier blanc. Les plumes de l'aîle sont noirâtres. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Le bec est jaune, & marqué dessus & dessous de deux taches noires, l'une placée vers le milieu de sa longueur, & l'autre à son extrémité. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

** 23. Le Héron du Brésil.

Ardea nigricans, flavescente punctulata; capite & collo superiore fuscis, nigro punctulatis; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & fuscis vario; rectricibus nigricantibus; rostro nigro; pedibus fuscis . . . . Ardea Brasiliensis.

Ardea ſubfuſca major, collo & pectore albo undatis. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 478.

Ardea ſylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 125.

Ardea Americana, ſylvatica, coloris ferruginei. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 14.

Soco Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 199, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*

Jonſt. Avi. pag. 136. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 58.

Soco Braſilienſibus Marcgravio. *Willugh. Ornith. pag.* 209. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°.* 14.

Cocoi tertius. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 90, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Les François de la Guiane l'appellent Onouré des bois. *Barr.*

Les Anglois de la Jamaïque, Clucking-Hen. *Browne.*

Les Braſiliens, Soco. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Héron pourpré huppé*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds un pouce ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a ſix pouces de long; ſa queue cinq pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied quatre pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces neuf lignes, l'extérieur trois pouces, l'intérieur deux pouces neuf lignes; & celui de derriere deux pouces trois lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Ardeam criſtatam purpuraſcentem craſſitie circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes & octo pollices explet, & ad extremos ungues tres pedes & ſeſquipollicem. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ſex pollices longum eſt; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & novem lineas, extimus tres pollices, intimus duos pollices cum novem lineis; poſticus autem duos pollices & tres lineas. Trium digitorum anticorum medius ad exti-

mum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum quatuor pedum intervallo distant; alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Caput, collumque superiùs & ad latera fusco tinguntur colore, quem punctula nigra variegant. Guttur & collum inferius alba sunt, maculis longitudinalibus, aliis nigris, alteris fuscis, variegata. Dorsum, uropygium, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, tectricesque caudæ superiores & inferiores nigricant, & flavescente in tota superficie punctulantur. Pennæ alas subtus obtegentes sunt quoque nigricantes, maculis candidis variæ. Superiores alarum tectrices minores, sicut & majores corpori finitimæ, dorso concolores : majores à corpore remotiores nigricantes & immaculatæ. Remiges similiter nigricant. Corpori viciniores maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conbrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a quatre pieds de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure & les côtés du col sont d'un brun varié de petits points noirs. La gorge & la partie inférieure du col sont d'un blanc varié de taches longitudinales, les unes noires, & les autres brunes. Le dos, le croupion, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, & les couvertures du dessus & du dessous de la queue sont d'un noirâtre tout pointillé de jaunâtre. Les couvertures du dessous des aîles sont pareillement noirâtres, & variées de taches blanches. Les petites du dessus, ainsi que les grandes les plus proches du corps, sont de la même couleur que le dos : les grandes les plus éloignées du corps sont noirâtres & sans taches. Les plumes de l'aîle sont de cette derniere couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. Les yeux sont noirs : leur iris est de couleur d'or. Le bec est

noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. On le trouve au *Bréſil* & dans *la Guiane*. Il a été envoyé de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

flatur. Oculi ſunt nigri : ipſorum irides aureo colore imbutæ. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. Habitat in *Braſilia* & *Guiana*. A *Cayana*, in *muſeum Realmurianum* miſſa à *D. Artur*.

** 24. LE BUTOR.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 1.

Ardea ſuperne rufeſcente & nigro varia, infernè dilutè fulva; maculis longitudinalibus nigricantibus variegata; vertice nigricante; collo ſuperne nigricante, infernè fuſco tranſverſim ſtriato; pennis in colli inferioris ima parte longiſſimis; uropygio fulvo, nigricante tranſverſim ſtriato; rectricibus binis intermediis nigricantibus, rufeſcente marginatis, lateralibus fulvis, maculis nigricantibus variegatis; roſtro fuſco, infernè virideſcente; pedibus viridi-flavicantibus . . . . BOTAURUS.

Ardea vertice nigro; pectore pallido maculis longitudinalibus nigricantibus. *Faun. Suec. Linn. N°.* 134.

Ardea capite læviuſculo, ſupra teſtacea maculis tranſverſis, ſubtus pallidior maculis oblongis fuſcis. Ardea ſtellaris. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 16.

Ardea pallida, pennis in dorſo fulvis. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. I. ſp.* 2.

Ardea Stellaris minor. *Jonſt. Avi. pag.* 104. *hujus duæ icones Tab.* 50, *una ſub titulo*, Ardea minor, *non ſatis accurata, altera ſub titulo*, Ardea, *ab Aldrovando mutuata.*

Ardea Stellaris minor, quam Botaurum, vel Butorium Recentiores vocant. *Geſn. Avi. pag.* 214. *hujus icon non ſatis accurata pag.* 215.

Ardea Stellaris Plinio & Ariſtoteli. *Geſn. icon. Avi. pag.* 120, *in quâ hujus icon non ſatis accurata.*

Ardea Stellaris. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 225.

Willugh. Ornith. pag. 207. *hujus icon non ſatis accurata Tab. L; & inſuper altera icon à Jonſtono mutuata Tab. LII.*

Raj. Syn. Avi. pag. 100. *N°. A.* 11.
Sibbald. Scot. illustr. Part. II. Lib. III. pag. 18.
Mus. Worm. pag. 307.
Linn. Syst. Nat. ed. 6. *Gen.* 55. *sp.* 4.
Klein. Avi. pag. 123. *N°.* 4.

Ardea Stellaris Willughbeji. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 16. *hujus icon pessima Tab.* 6.

Ardea Stellaris, Asterias. *Charlet. Exer. pag.* 110. *N°.* 5.
Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 5.

Ardea Asterias, sive Stellaris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 403. *hujus icon non satis accurata pag.* 405.

Botaurus Ornithologis; aliis Butio; Ardea Stellaris Gesnero; Ardea palustris vel Arundinum. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 273.

Botaurus Ornithologorum; Ardea Stellaris Gesneri; Ardea palustris vel Arundinum; Butio. *Rzac. Auct. Hist. nat. Pol. pag.* 368.

Taurus Plinii. *Willugh.*

Grus crispa. *Jonst. Avi. hujus icon satis accurata Tab.* 54.

Mos Kuw. *Jonst. Avi. hujus icon non satis accurata Tab. XXVII.*

Ἀστερίας ἐρῳδιός, Arist. *Klein.*

Ὀ'κνός Aristotelis. *Jonst. Raj.*

Butor. *Alb. Tom. I. pag.* 60; *avec une figure mal coloriée Pl.* 68.
Bel. Hist. nat. desOis. pag. 192, *dans laquelle il y a une très-mauvaise figure.*

Butor, nommé par aucuns de nom corrompu Pittouër. *Bel. Portr. d'Ois. pag.* 42 *b*, *dans laquelle est la même figure.*

Les Bretons l'appellent GALERAND. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Grecs, Ἀστερίας. *Gesn. Aldrov.* Ἐρῳδιὸς ἀστερίας. *Bel. Schwenck.* Ὀ'κνός. *Bel. Schwenck. Aldrov.*

Les Turcs, GELVÆ. *Gesn.* GELVE. *Aldrov.*

Les Portugais, GAZOLA. *Gesn.*

Les Italiens, TRUMBOTTO. *Bel.* TROMBONE. *Gesn. Aldrov.* AIGERON. *Bel. Gesn.*

Les Boulonnois, TERRABUSO *ou* TERRABUSA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Ferrarois, TERRABUSO *ou* TERRABUSA. *Bel. Gesn. Aldrov.*

Les Allemands, US-RIND; MEER-RIND; LOS-RIND; PICKART; ROS-TRUMM; ROS-DUMP; ROS-DUMPF; MOS; MOSS-OCHS; MOSS-KOU; MOSS-REIGEL; ROS-REIGEL. *Gesn. Aldrov.* MOSS-OCHSE; MOOS-KUH; MOS-REIGEL. *Schwenck.* MOSZ-REIGEL. *Rzac.* ROHR-REIGEL; ROHR-TRUMEN. *Schwenck. Rzac.*

Les Bas Allemands, DOMP-HORN *ou* DOMPS-HORN. *Gesn. Aldrov.*

Les Siléſiens, ROR-DUMMEL. *Gesn. Aldrov.* ROHR-DRUMMEL. *Schwenck. Rzac.*

Les Saxons, WASSER-OCHSZ. *Gesn. Aldrov.*

Les Autrichiens, ERDBOULL. *Gesn. Aldrov.*

Les Bavarois, HORTYBEL. *Geſn. Aldrov.*
Les Hollandois, ROER-DRUM. *Worm.* PITTOOR. *Aldrov.*
Les Friſons, REI-DOMMEL; ROS-DAM. *Geſn. Aldrov.*
Les Polonois, BAK. *Rzac.* BUNCK. *Geſn. Aldrov.*
Les Illyriens, BUKACZ; FAUSER. *Geſn.* BUBACZ; FUSER. *Aldrov.*
Les Suédois, ROER-DRUM. *Linn.*
Les Anglois, BITTERN. *Willugh. Raj. Sibbald. Alb.* BITTORN. *Charlet.* BITTOUR. *Raj.*
Les Anglois Septentrionaux, MIRE-DRUM. *Willugh. Raj.*
Les Ecoſſois, BUTTOUR. *Sibbald.*

Il n'eſt pas ſi gros que le *Héron ordinaire.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds cinq pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds deux pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; ſa queue quatre pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces ſix lignes, l'extérieur quatre pouces trois lignes, l'intérieur trois pouces neuf lignes; & celui de derriere deux pouces dix lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. L'ongle du doigt de derriere eſt le plus grand & le plus fort de

Ardeæ vulgari craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & quinque pollices æquat, & ad extremos ungues tres pedes duos pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices & novem lineas longum eſt; cauda quatuor pollices & ſex lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes quatuor pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & ſex lineas, extimus quatuor pollices cum tribus lineis, intimus tres pollices & novem lineas; poſticus autem duos pollices & decem lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque protenſâ. Digiti poſtici unguis magnitudine & validitate reliquos

omnes antecellit; octodecim enim linearum longitudine pollet. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum decem pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis superior pars nigricat. Caput ad latera rufescit: color autem rufescens tæniâ terminatur longitudinali fuscâ, ab exortu mandibulæ inferioris ortâ, & secundùm maxillæ inferioris longitudinem versùs collum usque productâ. Partem colli superiorem obtegunt pennæ rufescentes, nigricante transversim striatæ. Dorsi suprema pars, pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices rufescente & nigro variegantur. Dorsum infimum & uropygium fulva sunt, nigricante transversim striata. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo tectum. Guttur ex albo rufescit, & tæniâ longitudinali rufâ in medio insignitur. Pars colli inferior est dilutè fulva, quibusdam variegata maculis rufis, & fusco transversim striata. Pennæ quibus obsita est colli inferioris pars infi-

tous; il a jusqu'à dix-huit lignes de longueur. Il a trois pieds dix pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noirâtre. Les côtés de la tête sont roussâtres: cette couleur est terminée par une bande longitudinale brune, qui part de l'origine du demi-bec inférieur, & s'étend tout le long de la mâchoire inférieure jusque vers le col. La partie supérieure du col est couverte de plumes roussâtres, rayées transversalement de noirâtre. La partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de roussâtre & de noir. La partie inférieure du dos & le croupion sont d'un fauve rayé transversalement de noirâtre. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. La gorge est d'un blanc-roussâtre, & marquée dans son milieu d'une bande longitudinale rousse. La partie inférieure du col est d'un fauve clair, varié de quelques taches rousses, & rayé transversalement de brun. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont assez larges, & beaucoup plus

longues que les autres. La poitrine & le ventre ſont d'un fauve clair, varié de taches longitudinales noirâtres. Les côtés ſont fauves, & rayés tranſverſalement de noirâtre. Le haut des jambes eſt d'un fauve très-clair, varié en-dehors ſeulement de quelques bandes noirâtres, tranſverſales & en zigzags. Les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un fauve très-clair & ſans taches. Celles du deſſous des aîles ſont rouſſâtres, & variées de taches brunes. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles, ſçavoir celles qui couvrent le pli qui répond à celui du poignet, ſont d'un fauve foncé, varié de bandes noires tranſverſales & en zigzags : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont rouſſâtres, & rayées pareillement de bandes noires tranſverſales & en zigzags : enfin les grandes les plus éloignées du corps ſont rayées tranſverſalement de larges bandes alternativement noires & d'un fauve foncé. Les grandes plumes de l'aîle ſont rayées tranſverſalement des mêmes couleurs, & terminées de noir : les moyennes ſont fauves, & marquées de larges bandes noires tranſverſales & en zigzags, avec

ma, ſunt latiuſculæ, & reliquis multò longiores. Pectus & venter fulvo tinguntur diluto, & maculis longitudinalibus nigricantibus variegantur. Latera fulva, nigricante tranſverſim ſtriata. Crurum ſuprema pars diluti ſſimè fulva, quibuſdam tæniis nigricantibus tranſverſis & undatis extrorſùm ſolummodo variegata. Inferiores caudæ tectrices dilutiſſimè fulvæ & immaculatæ. Pennæ alas ſubtus obtegentes rufeſcentes, maculis fuſcis variæ. Tectrices alarum ſuperiores minimæ, iſtæ ſcilicet quæ articulum carpo humano reſpondentem obtegunt, ſaturatè fulvæ, tæniis nigris tranſverſis & undatis variæ : mediæ, ſicut & majores corpori finitimæ, rufeſcentes, tæniis ſimiliter nigris tranſverſis & undatis ſtriatæ : majores tandem à corpore remotiores latis tæniis alternatim nigris & ſaturatè fulvis tranſverſim ſtriatæ. Remiges alarum majores iiſdem coloribus tranſverſim ſtriantur, nigroque terminatur : minores ſunt fulvæ, latis inſignitæ tæniis nigris tranſverſis & undatis, maculis aliis nigris in fulvo colore diſſeminatis. Remiges cor-

pori

pori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cauda constat : binæ intermediæ nigricant, & in tota circumferentia rufescente marginantur : laterales omnes sunt fulvæ, maximâ macularum nigricantium irregularium copiâ variegatæ. Oculorum irides in aliis avellaneo-flavicantes, in alteris avellaneo-rubescentes. Mandibula superior fusca ; inferior fusco-virideſcens. Pars crurum plumis denudata, pedesque viridi-flavicantes ; ungues verò fusci. Paludes frequentat, ibique humi nidificat. Uno incubitu quinque ova ponit ex candicante ad cinereum aut viride vergentia. *Ex museo Realmuriano.*

d'autres taches noires répandues sur le fauve. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes : les deux du milieu sont noirâtres, & bordées de roussâtre dans toute leur circonférence : toutes les latérales sont d'un fauve varié d'une grande quantité de taches noirâtres irrégulieres. L'iris des yeux est de couleur de noisette-jaunâtre dans quelques-uns & rougeâtre dans d'autres. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un brun-verdâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre ; & les ongles bruns. Il se tient ordinairement dans les marais, & y fait son nid par terre. Il pond à chaque couvée cinq œufs d'un blanchâtre tirant sur le cendré ou sur le verd. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

25. Le Butor de la Baye de Hudson.

Ardea superne rufescens, nigricante transversim striata, infernè candicans, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro aspersis, varia; vertice nigricante ; collo inferiore albo, maculis longitudinalibus rufescentibus, nigro marginatis, vario ; pennis in colli inferioris ima parte longissimis ; rectricibus

rufescentibus, nigricante transversim striatis; rostro superiùs & apice nigricante, infernè luteo; pedibus flavis . . . .
BOTAURUS FRETI HUDSONIS.

Butor de la Baye de Hudson. *Edwards. Tom. III. pag. CXXXVI; avec une figure exacte Pl.* 136.
Les Anglois l'appellent BITTERN FROM HUDSON'S-BAY. *Edwards.*

Il n'est pas tout-à-fait si gros que le *nôtre*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ deux pieds trois pouces, & jusqu'à celui des ongles de deux pieds sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces six lignes de long; sa queue environ trois pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi trois pouces trois lignes de long, l'extérieur deux pouces cinq lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere deux pouces. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Le sommet de la tête est couvert

Botauro nostrati paululùm crassitie cedit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam duos pedes & tres circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & sex lineas longum est; cauda tres pollices & totidem circiter lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices cum totidem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet; extimus duos pollices & quinque lineas longus, intimus duos pollices cum quatuor lineis; posticus autem duos pollices. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum membranâ, ad primum articulum usque protensâ, adnectitur. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis pennis obtegitur ni-

gris, longiusculis, tactu molliſſimis. Caput ad latera rufeſcit. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute luteâ obtegitur. Guttur albicat. Collum ſuperius fuſcum eſt. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt rufeſcentes, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Partem colli inferiorem cooperiunt pennæ albæ, maculâ longitudinali rufeſcente, nigro marginatâ, versùs ipſarum extremitatem variæ. Pectus, venter, crurum ſuprema pars & tectrices caudæ inferiores candicant, & majuſculis variegantur maculis longitudinalibus rufeſcentibus, minutis aliis maculis nigris aſperſis, & nigro quoque fimbriatis. Latera penitùs candicant. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt albo-flavicantes, nigricante tranſverſim ſtriatæ. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis ſcapularibus concolores : majores à corpore remotiores & pennæ alam notham conſtituentes nigræ, rufeſcente terminatæ. Remiges quinque ſexve primores ſuperne nigræ, in-

de plumes noires, aſſez longues & douces au toucher. Les côtés de la tête ſont rouſſâtres. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. La gorge eſt blanche. La partie ſupérieure du col eſt brune. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un rouſſâtre, rayé tranſverſalement de noirâtre. La partie inférieure du col eſt couverte de plumes blanches, variées vers leur extrémité d'une tache longitudinale rouſſâtre, bordée de noir. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanchâtre varié d'aſſez grandes taches longitudinales rouſſâtres, parſemées d'autres petites taches noires, & bordées de la même couleur. Les côtés ſont tout-à-fait blanchâtres. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un blanc-jaunâtre, rayé tranſverſalement de noirâtre. Les petites du deſſus, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les plumes ſcapulaires : les grandes les plus éloignées du corps, ainſi que les plumes de l'aîle bâtarde, ſont noires,

& terminées de roussâtre. Les cinq ou six premieres plumes de l'aîle sont noires en-dessus & cendrées en-dessous : les suivantes sont de la même couleur, mais elles sont de plus terminées de roussâtre : les plus proches du corps sont roussâtres, & rayées transversalement de noirâtre. Ces dernieres sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de la même couleur que ces dernieres plumes de l'aîle. Le demi-bec supérieur est noir, excepté ses bords qui sont jaunes jusque vers son extrémité; le demi-bec inférieur est jaune depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur, le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles gris-bruns. On le trouve à la *Baye de Hudson.*

fernè cinereæ : proximè sequentes eodem imbutæ colore, sed insuper rufescente terminatæ : corpori viciniores rufescentes, nigricante transversim striatæ. Quæ novissimè dictæ sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus proximè dictis concolores. Mandibula superior nigra, attamen ad margines versùs extremitatem usque lutea; inferior ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque lutea, in reliqua longitudine nigra. Pars crurum plumis denudata, pedesque flavi; ungues verò griseo-fusci. Habitat in *Freto Hudsonis.*

26. Le petit Butor.

Ardea rufescens, fusco striata; gutture & collo inferiore candidis; rectricibus albicantibus; rostro superiùs obscurè fusco, infernè flavo; pedibus fuscis . . . . Botaurus minor.

Ardea viride-flavescens, Nova species. *Marsil. Danub. Tom. V. pag.* 22. *hujus icon satis accurata Tab.* 9.

Ardea viride-flavescens, Nova species Marsili. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 13.

Præcedenti multùm craſſitie cedit. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque ad trium pollicum longitudinem accedit, ſed eam non penitùs explet. Partes capitis & colli ſuperiores, pectus, venter, latera, uropygium, caudæ tectrices ſuperiores & inferiores, & pennæ alas ſuperne veſtientes rufeſcunt, lineoliſque fuſcis ſtriantur. Dorſum & ſcapulares pennæ concolores; attamen lineæ fuſcæ majorem obtinent latitudinem, ipſarumque major extat copia. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute flavâ tectum. Guttur & collum inferius ſunt candida. Crurum partem ſupremam veſtiunt pennæ ex albido fuſceſcentes. Remiges alarum fuſceſcunt, & tæniis tranſverſis fuſcis variegantur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ quidem valdè brevis, duodecim conſtat rectricibus albicantibus. Oculi ſunt nigri: ipſorum irides albidæ. Mandibula ſuperior obſcurè fuſca; inferior

Il eſt beaucoup plus petit que le précédent. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche n'a pas tout-à-fait trois pouces de long. Les parties ſupérieures de la tête & du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le croupion, les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue, & celles du deſſus des aîles ſont d'un rouſſâtre rayé de petites lignes brunes. Le dos & les plumes ſcapulaires ſont de la même couleur; mais les lignes brunes ſont plus larges & en plus grand nombre. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. La gorge & la partie inférieure du col ſont blanches. Le haut des jambes eſt couvert de plumes d'un blanchâtre rembruni. Les plumes de l'aîle ſont rouſſâtres, & variées de bandes tranſverſales brunes. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui eſt très-courte, eſt compoſée de douze plumes blanchâtres. Les yeux ſont noirs: & leur iris eſt blanchâtre. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un brun obſcur; l'inférieur eſt jaune. La partie des

jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns : les doigts tirent cependant un peu ſur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve ſur les bords du *Danube*.

flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci : digiti tamen nonnihil ad flaveſcentem inclinant colorem. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum uſque protensâ, coadunatur. Juxta *Danubii* ripas verſatur.

27. Le Butor rayé.

Ardea lineolis fuſcis, nigris & rufeſcentibus ſtriata; collo inferiore & pectore albicantibus; rectricibus fuſco, nigro & rufeſcente ſtriatis; roſtro ſuperiùs fuſco, infernè flavo; pedibus griſeis, lineolis atris notatis . . . . . Botaurus striatus.

Ardea fuſca, Nova ſpecies. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 24. *hujus icon ſatis accurata Tab.* 10.

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles, celles du deſſus & du deſſous de la queue, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont rayés de petites lignes brunes, noires & rouſſâtres, mêlées confuſément enſemble. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaune. La gorge, la partie inférieure du col &

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne cooperientes, caudæ tectrices ſuperiores & inferiores, venter, crurum ſuprema pars & latera lineolis ſtriantur fuſcis, nigris & rufeſcentibus confuſè mixtis. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute flavâ obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus candicant. Re-

miges alarum iisdem variegantur coloribus ac dorsum ipsum tingitur. Corpori finitimæ maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices lineolis fuscis, nigris & rufescentibus striatæ. Mandibula superior fusca; inferior flava. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque grisei : attamen digiti nonnihil ad flavescentem colorem inclinant. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. *Danubii* ripas frequentat.

la poitrine sont blanchâtres. Les plumes de l'aîle sont variées des mêmes couleurs que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes rayées de petites lignes brunes, noires & roussâtres. Le demi-bec supérieur est brun; l'inférieur est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris : les doigts tirent cependant un peu sur le jaunâtre. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve sur les bords du *Danube*.

28. Le grand Butor.

Ardea cristata, superne cinereo-fusca, infernè rufa; vertice & cristâ nigris; collo ad latera rufo, tæniâ longitudinali nigrâ notato, inferiore albo, maculis longitudinalibus nigris & albo-rufescentibus vario; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; rectricibus cinereo-fuscis; rostro flavicante; pedibus fuscis . . . . Botaurus major.

Ardea maxima, luteſcens, maculis nigris sagittatis densissimè aspersa. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 1.

Ardea cristata, maculosa, fusca. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 3.

Ardea Stellaris major. *Gesn. Avi. pag.* 218. *hujus icon minùs accurata pag.* 219.

Gesn. icon. Avi. pag. 119, *in qua eadem icon.*

Jonſt. Avi. pag. 105. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.
Ardea Stellaris major Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 408. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 556.
Ardea Stellaris major, ſive rubra cirrata. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 410. *hujus icon ſatis accurata pag.* 409.
Ardea Stellaris major, ſeu rubra Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 208. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 13.
Ardea cinerea alia. *Jonſt. Avi. hujus icon minùs accurata Tab.* 50.
Les Catalans l'appellent Toru de Garriga. *Barr.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur, Russey. *Geſn. Aldrov.*
Les Allemands, Grosser Ror-Reigel. *Geſn.*

Il eſt beaucoup plus gros que le *Butor ordinaire*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de trois pieds neuf pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles de quatre pieds ſix pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a pour le moins huit pouces de long; ſa queue quatre ou cinq pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, environ deux pouces; ſon pied ſix pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, cinq pouces : les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu de trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſque vers le bout

Botaurum vulgarem multùm craſſitie ſuperat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tres pedes novem pollices & tres lineas explet, & ad extremos ungues quatuor pedes & ſex pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque octo ſaltem pollices longum eſt; cauda quatuor vel quinque pollices; pars crurum plumis denudata duos circiter pollices; pes ſex pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quinque pollices : laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Alæ complicatæ versùs caudæ extremitatem uſque protenduntur.

tenduntur. Vertex capitis est niger : ex pennis illum obtegentibus quædam sunt longissimæ, elegantemque cristam efficiunt. Pars colli superior, dorsum, uropygium, superioresque caudæ tectrices sunt cinereo-fuscæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & cute flavâ solummodo obducitur. Collum ad latera rufum est, latâque tæniâ longitudinali nigrâ notatum. Guttur & collum inferius albicant, & longitudinalibus variegantur maculis, aliis nigris, alteris albo-rufescentibus. Pennæ quibus colli inferioris pars infima obsita est, maximam obtinent longitudinem, & supra pectus propendent. Pectus, ventrem, latera, inferiores caudæ tectrices & pennas alas subtus obtegentes tingit color rufus. Pennæ scapulares, quæ quidem longissimæ, strictissimæque, eodem imbuuntur colore. Crurum suprema pars ex albo rufescit. Superiores alarum tectrices, sicut & remiges, sunt cinereo-fuscæ. Ex remigibus autem corpori viciniores maximam longitudinem obtinent, & dum ala complicatur, ma-

de la queue. Le sommet de la tête est noir : quelques-unes des plumes qui le couvrent, sont fort longues, & forment une belle hupe. La partie supérieure du col, le dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un cendré-brun. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Les côtés du col sont roux, & marqués d'une large bande longitudinale noire. La gorge & la partie inférieure du col sont blanches, & variées de taches longitudinales, les unes noires & les autres d'un blanc-roussâtre. Les plumes du bas de la partie inférieure du col sont très-longues, & pendent sur la poitrine. La poitrine, le ventre, les couvertures du dessous de la queue, celles du dessous des aîles & les côtés sont roux. Les plumes scapulaires, qui sont très-longues & très-étroites, sont de la même couleur. Le haut des jambes est d'un blanc-roussâtre. Les couvertures du dessus des aîles, ainsi que les plumes de l'aîle, sont d'un cendré-brun. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin

que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré-brun. L'iris des yeux eſt jaune. Le bec eſt jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont bruns. On le trouve dans les marais.

jorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-fuſcis cauda conflatur. Oculorum irides luteæ. Roſtrum flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fuſci. In paludibus habitat.

29. Le Butor roux.

Ardea ſuperne nigricans, infernè rufeſcens; vertice nigro; collo ferrugineo; uropygio albo; rectricibus nigricantibus; roſtro ſuperne nigricante, infernè corneo colore tincto; pedibus fuſcis . . . . Botaurus rufus.

Ardeæ Stellaris tertium genus. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 410. *hujus icon ſatis accurata pag.* 411.

Ardeæ Stellaris tertium genus Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 100. *N°.* 12.

Ardea Stellaris, tertium genus. *Marſil. Danub. Tom. V. pag.* 18. *hujus icon non ſatis accurata Tab.* 7.

Ardea Stellaris, tertium genus Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 208.

Ardea Stellaris altera. *Jonſt. Avi. hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51.

Il eſt un peu plus gros que le *petit Butor*. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a environ quatre pouces de long; ſon col huit pouces. Sa queue eſt extrêmement courte. Ses jambes & ſes pieds, pris enſemble, ont neuf pouces de longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation.

Craſſitie *Botaurum minorem* paululùm antecellit. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor circiter pollices longum eſt; collum octo pollices. Cauda valdè brevis eſt. Crura, pedeſque, ſimul commenſurati, novem pollicum longitudinem obtinent. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum uſque productâ,

coadunatur. Capitis vertex nigro imbuitur colore. Reliquum caput, guttur & collum tingit color ferrugineus. Dorsum, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt nigricantes. Uropygium albicat. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes rufescunt. Superiores alarum tectrices albo & ferrugineo variegantur. Remiges majores sunt nigrigantes : minores ferrugineo colore imbutæ. Ex minoribus autem remigibus, corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigricantes. Oculorum irides luteæ. Mandibula superior nigricans; inferior corneo colore imbuta. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusci. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*. Paludes frequentat.

Le sommet de la tête est noir. Le reste de la tête, la gorge, & le col sont d'une couleur ferrugineuse. Le dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres. Le croupion est blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont roussâtres. Les couvertures du dessus des aîles sont variées de ferrugineux & de blanc. Les grandes plumes de l'aîle sont noirâtres : les moyennes sont d'une couleur ferrugineuse. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux est jaune. Le demi-bec supérieur est noirâtre; l'inférieur est de couleur de corne. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*. Il se tient dans les marais.

30. Le Butor du Brésil.

Ardea ſuperne fuſca, rufeſcente ſtriata, infernè alba, fuſco ſtriata, marginibus pennarum rufeſcentibus; capite & collo ſuperiore rufeſcentibus, nigro ſtriatis; rectricibus partim nigris, partim cinereis, albo tranſverſim ſtriatis; roſtro ſuperiùs fuſco, in exortu & infernè flavo-vireſcente; pedibus obſcurè griſeis . . . . Botaurus Brasiliensis.

Alia Ardeæ ſpecies. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 210.
Jonſt. Avi. pag. 143.
Ardea Braſilienſis, roſtro ſerrato, Stellari ſimilis Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 209.
Ardea Braſilienſis, roſtro ſerrato, cinereæ ſimilis Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 101. *N°.* 16.

Il eſt à peu près de la groſſeur du *petit Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ deux pieds trois pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds neuf pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces ſix lignes de long; ſa queue quatre pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied quatre pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, environ trois pouces ſix lignes : les latéraux ſont un peu plus courts; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Botaurum minorem craſſitie circiter æmulatur. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem duos pedes & tres circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes & novem pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor pollices & ſex lineas longum eſt; cauda quatuor pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes quatuor pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices & ſex circiter lineas : laterales paulò ſunt breviores; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito

connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput & collum superius rufescunt, nigroque striantur. Dorsum & uropygium vestiunt pennæ fuscæ, rufescente striatæ. Scapulares, alas superne cooperientes, superioresque caudæ tectrices concolores. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavo-virescente tectum. Guttur album est & immaculatum. Pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & inferiores caudæ tectrices albent & fusco striantur, marginibus pennarum in tota circumferentia rufescentibus. Remiges alarum sunt nigro & cinereo variæ, & apicibus albis præditæ. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices partim nigræ, partim cinereæ, albo transversim striatæ. Oculi sunt nigri: ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca, attamen in

brane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête & la partie supérieure du col sont d'un roussâtre rayé de noir. Le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, rayées de roussâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau d'un jaune-verdâtre. La gorge est blanche & sans taches. La partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un blanc rayé de brun, chaque plume étant bordée de roussâtre dans toute sa circonférence. Les plumes de l'aîle sont variées de noir & de cendré, & terminées de blanc. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes en partie noires & en partie cendrées, & rayées transversalement de blanc. Les yeux sont noirs :

leur iris eſt de couleur d'or. Le demi-bec ſupérieur eſt brun, excepté ſon origine, qui eſt d'un jaune-verdâtre; l'inférieur eſt de cette derniere couleur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un gris obſcur. On le trouve au *Bréſil.*

exortu flavo-vireſcens; inferior ex flavo quoque vireſcit. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque obſcurè griſei. Habitat in *Braſilia.*

** 31. Le Butor tacheté ou le Pouacre.

Ardea fuſca, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs, ſuperne albo punctulata; rectricibus fuſcis; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo vireſcente; roſtro ſuperne fuſco, infernè flavo-vireſcente; pedibus fuſco-vireſcentibus . . . . Botaurus nævius.

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Corneille.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix-huit pouces trois lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces ſept lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; ſa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, dix lignes; ſon pied deux pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes, l'intérieur ſeize lignes; & celui de derriere treize lignes. Celui

Cum *Cornice* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam octodecim pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & ſeptem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices longum eſt; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes duos pollices cum ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & novem lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis, intimus ſexdecim li-

neas; posticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & sex linearum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, sicut & dorsi suprema, pennæ scapulares & superiores alarum tectrices fusco imbuuntur saturato, minutis aspersо maculis albis, in extremitate pennarum positis. Dorsum infimum, uropygium, superioresque caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ & immaculatæ. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas subtus obtegentes fusco quidem tinguntur colore, sed nonnihil dilutiore. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute virescente obtegitur. Remiges alarum sunt saturatè fuscæ, minutâ maculâ candidâ in apice donatæ. Corpori viciniores maximam obtinent

du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds quatre pouces six lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, le dessus du col, la partie supérieure du dos, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus des aîles son d'un brun foncé, tout parsemé de petites taches blanches, placées à l'extrémité des plumes. La partie inférieure du dos, le croupion & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé & sans taches. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & celles du dessous des aîles sont d'un brun un peu plus clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verdâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un brun foncé, & terminées chacune par une petite tache blanche. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle.

La queue eſt compoſée de douze plumes brunes. Le demi-bec ſupérieur eſt brun ; l'inférieur eſt d'un jaune-verdâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un brun-verdâtre ; & les ongles bruns. Il ſe tient dans les marais, & s'y nourrit de *Poiſſons*, de *Grenouilles*, &c. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuſcis cauda conſtat. Mandibula ſuperior fuſca ; inferior flavo-vireſcens. Pars crurum plumis denudata, pedeſque fuſco-vireſcentes ; ungues verò fuſci. Paludes frequentat, ibique *Piſcibus*, *Ranis*, &c. victitat. *Ex muſeo Realmuriano.*

32. Le Butor tacheté d'Amérique.

Ardea fuſca, ſuperne ſaturatiùs, infernè dilutiùs ; alis ſuperne albo punctulatis ; rectricibus cinereo-cœruleſcentibus ; ſpatio roſtrum inter & oculos nudo, & roſtro inferiore viridibus, roſtro ſuperiore nigro-vireſcente ; pedibus flavo-vireſcentibus . . . . Botaurus Americanus nævius.

Ardea minor ſubfuſco-griſea, cruribus brevioribus. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 478.
Ardea Stellaris minor. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 315. *N°.* 5. *hujus icon minùs accurata Tab.* 263. *fig.* 2.
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 4.
Ardea fuſca. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 8.
Butor brun. *Catesb. Tom. I. pag.* 78 ; *avec une figure exacte Pl.* 78.
Les Anglois l'appellent Brown Bittern. *Catesb.*
Les Anglois de la Jamaïque, Small Bittern. *Sloane. Raj.* Crab-Catcher. *Browne.*

Il n'eſt pas ſi gros que le *petit Butor*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ un pied huit pouces, & juſqu'à celui des ongles de deux pieds un pouce. Son bec depuis ſa

Botauro minori craſſitie cedit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo circiter pollices æquat, & ad extremos ungues duos pedes cum pollice unico. Roſtrum

ab

ab ipsius apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres circiter pollices; pars crurum plumis denudata decem lineas; pes quatuor ferè pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue tres pollices, extimus duos pollices & sex lineas, intimus duos pollices cum tribus lineis; posticus autem octodecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt saturatè fuscæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ tectrices tingit color fuscus quidem, sed nonnihil dilutior. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute viridi solummodo tectum. Superiores alarum tectrices eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur; majores autem minutâ maculâ candidâ in extremi-

pointe jusqu'aux coins de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; la queue environ trois pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, dix lignes; son pied près de quatre pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces, l'extérieur deux pouces six lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere un pouce six lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plume scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un brun foncé. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun un peu plus clair. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Les couvertures du dessus des aîles sont de la même couleur que le dos; mais les plus grandes sont terminées par une pe-

tite tache blanche. Les plumes de l'aîle ſont auſſi d'un brun foncé, & terminées de même par une petite tache blanche. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un cendré-bleuâtre. Les yeux ſont grands : leur iris eſt de couleur d'or : & les paupieres ſont vertes. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un noir-verdâtre ; l'inférieur eſt verd. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune-verdâtre. On le trouve à *la Jamaïque*, à *la Caroline*, & en différens endroits de l'*Amérique Septentrionale*. Il ſe tient ſur les bords des rivieres & des étangs.

tate prædítæ ſunt. Remiges ſunt quoque ſaturatè fuſcæ, & minutâ maculâ candidâ ſimiliter terminatæ. Corpori viciniores longiſſimæ ſunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cinereo-cœruleſcentes. Oculi ſunt magni : ipſorum irides aureo colore imbutæ : palpebræ verò virides. Mandibula ſuperior nigro-vireſcens ; inferior viridis. Pars crurum plumis denudata, pedeſque flavo-vireſcentes. Habitat in *Jamaica*, *Carolina*, & in variis *Americæ Septentrionalis* regionibus. Juxta fluviorum & ſtagnorum ripas verſatur.

33. Le Crabier.

Ardea criſtata, caſtanea ; pennis ſcapularibus in exortu albis ; criſtâ in medio albâ, ad latera nigrâ ; rectricibus caſtaneis ; roſtro luteo, apice nigricante ; pedibus viridibus . . . . Cancrofagus.

Ardeæ alia ſpecies, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 401, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*

Ardea vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 207. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L.*
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 9.

Squaiotta Italorum. *Jonſt. Avi. pag.* 104. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 51, *ſub titulo*, Ardea Quaiotta.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°.* 6.

Charlet. Onomazt. pag. 103. *N°.* 6.

Les Boulonnois l'appellent SQUAIOTTA. *Aldrov. Willugh. Raj. Charlet.*

Præcedenti crassitie cedit. Summum caput obtegunt pennæ, quarum quæ medium locum tenent, sunt candidæ, quæ verò ad latera positæ sunt, nigræ. Ex istis autem pennis triginta reliquas longitudine superant, & cristam efficiunt. Reliquum caput, guttur, collum, universumque corpus pennis vestiuntur eleganter castaneis. Scapulares, caudam superne & infernè cooperientes, tectrices alarum superiores & inferiores, ipsarumque remiges tingit idem color : scapulares tamen, quæ quidem longissimæ & strictissimæ, sunt in exortu candidæ. Remiges corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim conflatur rectricibus eleganter castaneis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute luteâ coopertum. Rostrum similiter luteum, attamen in extremitate nigricans. Pars crurum plumis

Il est plus petit que le précédent. Le sommet de la tête est couvert de plumes, dont celles qui occupent le milieu, sont blanches, & celles qui sont sur les côtés, sont noires. Trente de ces plumes sont plus longues que les autres, & forment une hupe. Le reste de la tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes d'un beau marron. Les scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, & les plumes de l'aîle sont de la même couleur : les scapulaires, qui sont fort longues & fort étroites, sont cependant blanches à leur origine. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps sont très-longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui est très-courte, est composée de douze plumes d'un beau marron. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le bec est de la même couleur, excepté son extrémité, qui est noirâtre. La partie

des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verds. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

denudata, pedeſque virides. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

34. LE CRABIER MARRON.

Ardea ſuperne caſtanea, infernè ſordidè alba; tæniâ longitudinali candidâ à gutture ad ventrem uſque productâ; tectricibus alarum ſuperioribus ad cœruleum vergentibus; remigibus nigris; rectricibus caſtaneis; roſtro fuſco; pedibus rubris .... CANCROFAGUS CASTANEUS.

Ardea rubra. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 225.
Les Siléſiens l'appellent RODTER REGER; SAND-REGER. *Schwenck.*

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Corneille*. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a quatre pouces de longueur. Sa tête eſt fort petite; & ſon col fort allongé. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de couleur de marron. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc ſale; il y a cependant une bande longitudinale d'un beau blanc, qui part de la gorge,

Cum *Cornice* craſſitie circiter convenit. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos quatuor pollices longum eſt. Caput habet valdè exiguum; collum verò maximè elongatum. Caput, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices caſtaneo tinguntur colore. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices ſordidè albent; tænia tamen extat longitudinalis candida, à gutture orta, per totam colli longitudinem & pectus me-

dium ducta, & ad ventrem usque protensa. Superiores alarum tectrices nonnihil ad cœruleum vergunt. Remiges sunt nigræ. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus castaneis cauda constat. Oculorum irides flavicantes. Rostrum fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque rubri. Trium digitorum anticorum medius ad digitum extimum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. In arboribus excelsis nidificat. *Piscículis* & *Insectorum aquaticorum* omni genere vescitur. Habitat in *Silesia*.

passe dans toute la longueur du col & par le milieu de la poitrine, & s'étend jusqu'au ventre. Les couvertures du dessus des aîles tirent un peu sur le bleuâtre. Les plumes de l'aîle sont noires. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes de couleur de marron. L'iris des yeux est jaunâtre. Le bec est brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont rouges. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il fait son nid dans les grands arbres. Il se nourrit de *petits Poissons* & de toutes sortes d'*Insectes aquatiques*. On le trouve en *Silésie*.

35. Le Crabier roux.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum vergens, superne dilutiùs, infernè saturatiùs; capite superiore & cristâ lutescente & nigro variegatis; rectricibus ex croceo ad castaneum vergentibus; viridi-cœruleo, apice nigro; rostro pedibusque saturatè rubris . . . . Cancrofagus rufus.

Ardea Hæmatopos, seu Cirris Virgilii, Scaligeri. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 397. *hujus icon satis accurata pag.* 398.

Ardea Hæmatopus, ſeu Cirris Virgilii Scaligero, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. L. Raj. Syn. Avi. pag.* 99. *N°.* 7.

Il eſt tout au plus de la groſſeur du *Butor tacheté*. La partie ſupérieure de la tête eſt couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent ſur le col, & forment une eſpece de hupe. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, ſont d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron : cette couleur eſt plus claire dans le deſſus du corps, & plus foncée dans le deſſous. Les plumes ſcapulaires, le couvertures du deſſus de la queue, celles du deſſus & du deſſous des aîles, & les plumes de l'aîle ſont de la même couleur que le dos. Les couvertures du deſſous de la queue ſont de la même couleur que le ventre. Les plumes de l'aîle les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui eſt extrêmement courte, eſt compoſée de douze plumes d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui eſt jaune. Le bec eſt d'un verd tirant ſur le bleu depuis ſon origine juſque vers les

Botaurum nævium craſſitie circiter æquat, aut paululùm ei cedit. Partem capitis ſuperiorem veſtiunt pennæ longæ, ſtrictiſſimæ, luteſcente & nigro variegatæ, collo incumbentes, & criſtam quodammodo efficientes. Quæ guttur, collum, univerſumque corpus obtegunt, ex croceo ad caſtaneum vergunt : qui color in corpore ſuperiore dilutior eſt, in inferiore ſaturatior. Pennæ ſcapulares, quæ caudam ſuperne cooperiunt, tectrices alarum ſuperiores & inferiores, ipſarumque remiges eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Pennæ caudam ſubtus obtegentes ventri concolores. Remiges alarum corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis eſt, duodecim conſtat rectricibus ex croceo ad caſtaneum vergentibus. Oculorum irides luteæ, circulo coccineo circumdatæ. Roſtrum ab ipſius exortu versùs duas tertias longitu-

dinis partes usque viridi-cœruleum, inde ad extremitatem nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque saturatè rubri; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum usque protensâ, coadunatur. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

deux tiers de sa longueur; & de là jusqu'à son extrémité il est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un rouge foncé; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

36. Le Crabier roux tacheté.

Ardea cristata, ex croceo ad castaneum dilutum vergens; capite superiore & cristâ lutescente & nigro variegatis; collo ad latera maculis nigris aspersо; rectricibus ex croceo ad castaneum dilutum vergentibus; rostro viridi-cœruleo, apice nigro; pedibus flavicantibus . . . . Cancrofagus rufus nævius.

Ardea castanei coloris alia. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 399, *in qua hujus icon satis accurata.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Illius instar, superior capitis pars pennis vestitur longis, strictissimis, lutescente & nigro variegatis, collo incumbentibus, & cristam quodammodo efficientibus. Dorsum, uropygium, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ scapulares, alas superne cooperientes, tectricesque caudæ superiores & inferiores ex cro-

Il est à peu près de la grosseur du précédent. Comme lui, il a la partie supérieure de la tête couverte de plumes longues & fort étroites, variées de jaunâtre & de noir, qui pendent sur le col, & forment une espece de hupe. Le dos, le croupion, la gorge, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles, & celles du dessus & du dessous de la

queue ſont d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron clair. Le col eſt de la même couleur, mais il eſt varié ſur ſes côtés de taches noires. Les plumes de l'aîle ſont de la même couleur que le dos. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui eſt extrêmement courte, eſt compoſée de douze plumes d'une couleur de ſafran tirant ſur le marron clair. Un cercle d'un rouge vif entoure l'iris des yeux, qui eſt jaune. Le bec eſt d'un verd tirant ſur le bleu depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur; le reſte eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunâtres; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

ceo ad caſtaneum dilutum vergunt. Collum eodem colore tingitur, ſed maculis nigris ad latera aſpergitur. Alarum remiges eodem imbuuntur colore ac dorſum ipſum tingitur. Corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis eſt, duodecim conflatur rectricibus ex croceo ad caſtaneum dilutum inclinantibus. Oculorum irides luteas ambit circulus coccineus. Roſtrum ab ipſius exortu versùs duas tertias longitudinis partes uſque viridi-cœruleum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque flavicantes; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

37. LE CRABIER JAUNE.

Ardea criſtata, ſuperne luteo-rufeſcens, infernè candicans; capite, criſtâ & collo luteſcente, albo & nigro variegatis; rectricibus candicantibus; roſtro luteo-rufeſcente; pedibus vireſcentibus . . . . CANCROFAGUS LUTEUS.

Ardeæ

Ardeæ aliud genus, quam Sguacco vocant. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 400, *in qua hujus icon satis accurata.*
Ardea quam Sguacco vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 206.
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 8.
Les Boulonnois l'appellent SGUACCO. *Aldrov.*

Præcedenti paululùm crassitie cedit; & rostro nonnihil breviori donatur. Caput, guttur, collumque vestiunt pennæ lutescente, albo & nigro variegatæ. Quæ caput superius obtegunt, longæ sunt, strictissimæ, collo incumbentes, & cristam quodammodo efficientes. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices ex luteo rufescunt. Pectus, venter, latera & pennæ caudam subtus cooperientes candicant. Crurum pars suprema flavicat. Superiores alarum tectrices minimæ, ab alæ exortu ad articulum carpo humano respondentem usque, sunt candicantes: reliquæ omnes luteo-rufescentes. Alarum remiges ex luteo quoque rufescunt. Corpori viciniores sunt longissimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Cauda, quæ valdè brevis est, duodecim constat rectricibus candicantibus. Oculo-

Il est un peu plus petit que le précédent; & a le bec un peu plus court. La tête, la gorge & le col sont couverts de plumes variées de jaunâtre, de blanc & de noir. Celles qui couvrent la partie supérieure de la tête, sont longues & fort étroites, pendent sur le col, & forment une espece de hupe. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un jaune-roussâtre. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont blanchâtres. Le haut des jambes est jaunâtre. Les petites couvertures du dessus des aîles, depuis l'origine de l'aîle jusqu'au pli qui répond à celui du poignet, sont blanchâtres: toutes les autres sont d'un jaune-roussâtre. Les plumes de l'aîle sont de la même couleur. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue, qui est fort courte, est composée de douze

plumes blanchâtres. Un cercle noir entoure l'iris des yeux, qui eſt de couleur d'or. Le bec eſt d'un jaune-rouſſâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Italie* aux environs de *Bologne*.

rum irides aureo colore imbutas ambit circulus niger. Roſtrum luteo-rufeſcens. Pars crurum plumis denudata, pedeſque vireſcentes. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Habitat in *Italia* circa *Bononiam*.

** 38. Le Crabier des Philippines.

Voyez Pl. XXXVII. Fig. 2.

Ardea ſuperne caſtaneo & nigricante tranſverſim & undatim ſtriata, infernè griſeo-rufeſcens; capite caſtaneo, in parte poſteriore nigro variegato; collo ſuperiore dilutè caſtaneo; collo inferiore & pectore griſeis, ad caſtaneum vergentibus; rectricibus nigricantibus; roſtro ſuperiùs nigricante, infernè albo-flavicante; pedibus griſeo-fuſcis . . . . . Cancrofagus Philippensis.

Il n'eſt pas plus gros qu'un *petit Poulet*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de dix pouces, & juſqu'à celui des ongles d'onze pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a vingt-cinq lignes de long; ſa queue un pouce neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, trois lig-

Pullum Gallinaceum minorem craſſitie non ſuperat. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem decem pollices explet, & ad extremos ungues undecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos viginti quinque lineas longum eſt; cauda unum pollicem & novem lineas; pars crurum

plumis denudata tres lineas; pes unum pollicem & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quatuor lineas, extimus tredecim lineas; intimus duodecim cum semi lineas; posticus autem pollicis unius longitudinem obtinet. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est unius pedis quinque pollicum & decem linearum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput anteriùs & ad latera eleganti castaneo tingitur. Capitis pars posterior castaneo & nigro variegatur. Collum superius est dilutè castaneum. Dorsum & uropygium variegant exiguæ tæniæ transversæ & undatæ, alternatim nigricantes & castaneæ. Pennæ scapulares, superioresque caudæ tectrices iisdem coloribus, eodemque modo variegantur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute flavicante solummodo coopertum. Guttur, pars colli inférieure du col & la poitrine sont d'un gris tirant un peu sur le marron. Le ventre, les côtés, le haut des jambes, les cou-

nes; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce quatre lignes, l'extérieur treize lignes, l'intérieur douze lignes & demie; & celui de derriere un pouce. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied cinq pouces dix lignes de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie antérieure & les côtés de la tête sont d'un beau marron. La partie postérieure de la tête est variée de marron & de noir. Le dessus du col est d'un marron clair. Le dos & le croupion sont variés de noirâtre & de marron, & cela par petites bandes transversales & en zigzags. Les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont variées de même & des mêmes couleurs. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie

vertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un gris-rouſſâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont de la même couleur que les plumes du dos : les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres, & bordées de gris-rouſſâtre par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-cinq plumes : les vingt-une premieres ſont noirâtres ; & de celles-là les ſeize premieres ſont bordées de gris par le bout : les cinq ſuivantes, ſçavoir depuis la dix-ſeptiéme juſqu'à la vingt-uniéme incluſivement, ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, un peu au-delà de l'extrémité des plus grandes plumes de l'aîle : les quatre autres, ſçavoir depuis la vingt-deuxiéme juſqu'à la vingt-cinquiéme incluſivement, ſont noirâtres, rayées tranſverſalement de marron du côté extérieur, & bordées de la même couleur par le bout. Toutes les plumes de l'aîle ſont de plus marquées d'un peu de blanchâtre à leur origine du côté intérieur ſeulement. La queue eſt compoſée de douze plumes noirâtres. Le demi-bec ſupérieur eſt de cette derniere couleur ; l'inférieur eſt d'un

ferior & pectus ex griſeo paululùm ad caſtaneum vergunt. Venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes ex griſeo rufeſcunt. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, pennis dorſum veſtientibus concolores : majores à corpore remotiores nigricantes, griſeo-rufeſcente in apice fimbriatæ. Alam componunt viginti quinque remiges : uno-viginti primores nigricant ; ex iſtis autem ſexdecim priores griſeo ſunt in apice marginatæ : quinque proximè ſequentes, à decima ſeptima ſcilicet ad vigeſimam primam uſque incluſivè, maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, paululùm ultra majorum remigum extremitates extenduntur : quatuor reliquæ, à vigeſima ſecunda ſcilicet ad vigeſimam quintam uſque incluſivè, ſunt nigricantes, in latere exteriore caſtaneo tranſverſim ſtriatæ, eodemque colore in apice marginatæ. Omnes inſuper remiges pauco candicante ad ipſarum exortum in latere interiore tantùm inſigniuntur. Duodecim rectri-

cibus nigricantibus cauda conflatur. Mandibula superior quoque nigricans; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque griſeo-fuſci. Habitat in *Philippenſibus Inſulis* unde in *muſeum D. Aubry* miſſus eſt.

blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont d'un gris-brun. On le trouve aux *Iſles Philippines*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conſerve dans ſon *cabinet*.

39. Le Crabier d'Amérique.

Ardea ſuperne cinereo-cœruleſcente, viridi obſcuro & rufeſcente varia, infernè cinerea; vertice cinereo-cœruleſcente; collo ſuperiore fuſco, xerampelino vario; collo inferiore & pectore candidis, maculis xerampelinis variegatis; rectricibus nigro-vireſcentibus; roſtro ſuperne nigro, infernè fuſco-flavicante; pedibus flavis . . . . . Cancrofagus Americanus.

Héron ou Ardea varia. *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag.* 268. (*ed.* 1725).

Héron ou Ardea varia major Chilienſis. *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag.* 57. (*ed.* 1725).

Les François de l'Amérique l'appellent Cra-cra. *Feuillée.*

Les Caraïbes, Jaboutra. *Feuillée.*

Præcedentem craſſitie paulùlùm antecellit. Vertex capitis ex cinereo cœruleſcit. Caput poſterius, collumque ſuperius fuſca ſunt, xerampelino colore varia. Dorſum & uropygium cinereo-cœruleſcente, viridi obſcuro & rufeſcente eleganter variegata. Pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices iiſdem coloribus variegan-

Il eſt un peu plus gros que le précédent. Le ſommet de la tête eſt d'un cendré-bleuâtre. Le derriere de la tête & la partie ſupérieure du col ſont d'un brun varié de couleur feuille-morte. Le dos & le croupion ſont fort joliment variés de cendré-bleuâtre, de verd-obſcur & de rouſſâtre. Les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue

ſont variées des mêmes couleurs. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col & la poitrine ſont d'un blanc varié de quelques taches feuille-morte. Le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont cendrés. Les petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd obſcur, & bordées de rouſſâtre : les grandes ſont noires, & bordées de blanc. Toutes les plumes de l'aîle ſont pareillement noires, & bordées de blanc dans toute leur circonférence. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noir-verdâtre. La prunelle des yeux eſt d'un bleu obſcur : leur iris eſt de couleur d'or. Le demi-bec ſupérieur eſt noir ; l'inférieur eſt d'un brun-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont jaunes ; & les ongles noirs. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane,

tur. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior & pectus albent, & maculis quibuſdam xerampelinis variegantur. Ventrem, latera, crurum partem ſupremam & inferiores caudæ tectrices tingit color cinereus. Superiores alarum tectrices minores ſunt obſcurè virides, rufeſcente fimbriatæ : majores nigræ, albo marginatæ. Remiges omnes nigro ſimiliter imbuuntur, & in tota circumferentia albo marginantur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-vireſcentes. Oculorum pupilla obſcurè cœrulea : ipſorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula ſuperior nigra ; inferior fuſco-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque flavi ; ungues verò nigri. Trium digitorum anticorum medius extimo digito membranâ, ad primum articulum uſque protensâ, coadunatur. Habitat in *America*. Juxta rivulorum ripas,

haud procul à mare, versatur.

qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. On le trouve en *Amérique*. Il se tient le long des ruisseaux, assez près de la mer.

40. Le Crabier du Brésil.

Ardea superne nigro-chalybea, fusco & flavicante varia, infernè alba, cinereo & pallidè luteo variegata; capite superiore nigro-chalybeo, dilutè fusco notato; rectricibus virescentibus; spatio rostrum inter & oculos nudo, luteo; rostro superiùs fusco, infernè albo-flavicante; pedibus luteis. . . . . Cancrofagus Brasiliensis.

Ardeola. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 210, *in qua hujus icon non satis accurata.*

Jonst. Avi. pag. 144. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.

Ardeola Brasilienſis Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 210. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*

Raj. Syn. Avi. pag. 101. *N°.* 18.

Cocoi primus. *Pison. Hist. Nat. pag.* 89, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*

Les Brasiliens l'appellent Cocoi. *Pison.*

Crassitie *Columbam* vix adæquat. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam sexdecim pollices & sex circiter lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem octo pollices & sex lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata quindecim circiter lineas; pes duos pollices cum

Il est tout au plus de la grosseur d'un *Pigeon*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ seize pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied huit pouces six lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, environ quinze lignes; son pied deux pouces six lignes; celui

du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces trois lignes : les latéraux ſont un peu plus courts ; & celui de derriere eſt le plus court de tous. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête eſt d'un noir tirant ſur la couleur d'acier poli, marqué d'un peu de brun clair. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont d'un blanc varié de cendré & de jaune pâle. Le haut des jambes eſt varié de cendré & de jaunâtre. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir tirant ſur la couleur d'acier poli, varié de brun & de jaunâtre. Les couvertures du deſſus des aîles ſont joliment variées de brun, de couleur d'acier poli, de jaunâtre & de cendré. Les plumes de l'aîle ſont verdâtres, & marquées à leur extrémité d'une tache blanche. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin

ſex lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & tres lineas : laterales paulò ſunt breviores ; poſticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Alæ complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis ſuperior pars eſt nigro-chalybea, pauco fuſco diluto notata. Guttur, collum, pectus, venter, latera, inferioreſque caudæ tectrices albicant, & cinereo, luteoque pallido variegantur. Crurum ſuprema pars cinereo & flavicante variegata. Dorſum, uropygium, ſcapulares pennas & ſuperiores caudæ tectrices tingit color nigro-chalybeus, fuſco & flavicante varius. Superiores alarum tectrices fuſco, chalybeo, flaveſcente & cinereo eleganter variegatæ. Alarum remiges vireſcentes, maculâ candidâ in extremitate inſignitæ. Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus vireſcentibus cauda conſtat.

constat. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & cute luteâ solummodo tectum. Oculorum pupilla nigra : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Mandibula superior fusca ; inferior albo-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei ; ungues verò grisei. Habitat in *Brasilia.*

que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes verdâtres. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. La prunelle des yeux est noire ; leur iris est de couleur d'or. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes ; & les ongles gris. On le trouve au *Brésil.*

41. Le Crabier de Bahama.

Ardea cristata, superne albo & nigro striata, infernè obscurè cœrulea ; capite nigro-cœrulescente ; vertice pallidè luteo ; tæniâ longitudinali in genis, & pennis in occipite strictissimis longissimis candidis ; spatio rostrum inter & oculos nudo viridi ; rostro nigro ; pedibus luteis. . . . Cancrofagus Bahamensis.

Ardea crista flava, corpore nigro-cœrulescente, fascia temporali alba.
Ardea violacea. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 12.
Ardea major grisea cristata, capite nigro, vertice & ciliis albicantibus. *Browne. Nat. Hist. of Jamaic. pag.* 478.
Ardea cœrulea. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 314. *hujus icon non satis accurata Tab.* 264. *fig.* 5.
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 2.
Ardea Stellaris cristata Americana. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 9.
Butor huppé. *Catesb. Tom. I. pag.* 79 ; *avec une figure pas assez exacte Pl.* 79.
Les Anglois l'appellent Crested Bittern. *Catesb.*
Les Anglois de la Jamaïque, Grey Crested Gaulding. *Browne.*

Cum *Botauro nævio* crassitie circiter convenit. Ipsius

Il est à peu près de la grosseur du *Butor tacheté.* Sa lon-

gueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ quinze pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces neuf lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces huit lignes de long; sa queue deux pouces trois lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce; son pied trois pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur un pouce huit lignes, l'intérieur un pouce six lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà des trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert de plumes d'un jaune pâle, parmi lesquelles il y en a quelques-unes de blanches: ces dernieres, qui sont fort étroites & fort longues, quelques-unes ayant jusqu'à six pouces de longueur, forment une belle hupe, que l'Oiseau redresse ou abaisse à volonté. Le reste de la tête est d'un noir tirant sur

longitudo ab apice rostri ad caudam extremam quindecim pollices & sex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & novem lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & octo lineas longum est; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata unum pollicem; pes tres pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus unum pollicem cum octo lineis, intimus unum pollicem & sex lineas; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra tres quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem obtegunt pennæ pallidè luteæ, inter quas quædam oriuntur candidæ: quæ noviſſimæ dictæ sunt ſtrictiſſimæ, maximam longitudinem obtinent, quædam enim sex pollicum longitudine pollent, & elegantem efficiunt cristam, quam Avis ad libitum erigere aut

contrahere potest. Reliquum caput ex nigro cœruleſcit. In utroque tamen capitis latere tænia extat longitudinalis candida, ab oris angulis orta, & versùs occipitium usque protensa. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & tantummodo cute viridi obtegitur. Dorsum est albo & nigro striatum. Guttur, collum, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, uropygium, pennas caudam superne & infernè cooperientes, superioresque alarum tectrices tingit color obscurè cœruleus. Pennæ scapulares concolores : ex istis autem quædam sunt strictissimæ, septem pollices longæ, & ultra caudam extremam protenduntur. Remiges alarum sunt fuscæ, cœruleo adumbratæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices obscurè cœruleæ. Oculorum irides rubræ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque lutei; ungues verò nigricantes. Habitat in *Ca-*

le bleu. Il y a cependant de chaque côté de la tête une bande longitudinale blanche, qui part des coins de la bouche, & s'étend jusque vers l'occiput. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau verte. Le dos est rayé de noir & de blanc. La gorge, le col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, le croupion, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, & celles du dessus des aîles sont d'un bleu obscur. Les plumes scapulaires sont de la même couleur : quelques-unes de celles-là sont très-étroites, ont jusqu'à sept pouces de longueur, & s'étendent au-delà du bout de la queue. Les plumes de l'aîle sont d'un brun nuancé de bleu. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un bleu obscur. L'iris des yeux est rouge. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont jaunes; & les ongles noirâtres. On le trouve à *la Caroline*, à *la Jamaïque* & dans l'*Isle Bahama*.

Il fait ſon nid dans les buiſſons qui croiſſent parmi les rochers.

rolina, Jamaica & Bahamenſi Inſula. In ſepibus inter rupes provenientibus nidificat.

42 Le Crabier bleu.

Ardea criſtata, cœrulea; capite, criſtâ & collo ad violaceum vergentibus; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis longiſſimis; ſpatio roſtrum & oculos nudo, roſtroque cœruleis; pedibus viridibus. . . . Cancrofagus cœruleus.

Ardea occipite criſtato, corpore cœruleo. Ardea cœrulea *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 13.
Ardea plumbea criſtata, capite nigro, vertice albo. *Browne. Nat. Hiſt. of Jamaic. pag.* 478.
Ardea cœruleo-nigra. *Sloane. Voy. of Jamaic. pag.* 315. *N°. IV. hujus icon non ſatis accurata Tab.* 263. *fig.* 3.
Raj. Syn. Avi. pag. 189. *N°.* 3.
Ardea cyanea. *Klein. Avi. pag.* 124. *N°.* 7.
Héron bleu. *Catesb. Tom. I. pag.* 76; *avec une figure exacte Pl.* 76.
Les Anglois l'appellent Blew Heron. *Catesb.*
Les Anglois de la Jamaïque, Black Gaulding *ou* Blew Gaulding. *Sloane. Raj.* Blue Gaulding. *Browne.*

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros qu'une *Corneille.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'environ un pied cinq pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces de long; ſa queue deux pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied trois pouces quatre lignes; celui du milieu des trois doigts

Cornici paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & ſex circiter lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tres pollices longum eſt; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices & tres lineas; pes tres pollices cum quatuor lineis;

trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & quatuor lineas, extimus duos pollices, intimus unum pollicem cum decem lineis; posticus autem unum pollicem & quinque lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alæ complicatæ nonnihil ultra caudam extremam protenduntur. Caput, guttur & collum ex cœruleo ad violaceum vergunt. Ab occipitio longæ oriuntur pennæ concolores, strictissimæ, elegantem cristam efficientes. Colli inferioris pars infima pennis obsita est longis similiter & strictissimis, pectori incumbentibus. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares, pectus, venter, latera, crurum suprema pars, pennæ caudam superne & infernè cooperientes, alarumque tectrices superiores & inferiores cœruleo tinguntur colore. Ex scapularibus quædam sunt valdè strictæ, pedem longitudine adæquant, & ad quatuor usque pollices ultra caudam extremam protenduntur. Alarum remiges eodem imbuuntur cœruleo ac dorsum ipsum tingitur.

antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces quatre lignes, l'extérieur deux pouces, l'intérieur un pouce dix lignes; & celui de derriere un pouce cinq lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent un peu au-delà du bout de la queue. La tête, la gorge & le col sont d'un bleu tirant sur le violet. Il part de l'occiput de longues plumes de la même couleur, fort étroites, qui forment une jolie hupe. Le bas de la partie inférieure du col est garni de pareilles plumes, qui retombent sur la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessus & du dessous de la queue, celles du dessus & du dessous des aîles, & les côtés sont bleus. Quelques-unes des plumes scapulaires sont extrêmement étroites, ont un pied de longueur, & s'étendent jusqu'à quatre pouces au-delà du bout de la queue. Les plumes de l'aîle sont du même bleu que le dos. Les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin

que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes bleues. L'iris des yeux eſt jaune. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau bleue. Le bec eſt de la même couleur; mais elle devient un peu plus foncée vers l'extrémité du bec. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verds; & les ongles noirâtres. On le trouve à la *Caroline* & à *la Jamaïque.*

Corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices cœruleæ. Oculorum irides luteæ. Spatium roſtrum inter & oculum contentum plumis eſt denudatum, & cute cœruleâ ſolummodo tectum. Roſtrum ſimiliter cœruleum, attamen nonnihil ſaturatiùs versùs extremitatem. Pars crurum plumis denudata, pedeſque virides; ungues verò nigricantes. Habitat in *Carolina* & *Jamaica.*

** 43. Le Crabier verd.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 1.

Ardea ſuperne viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè fuſco-caſtanea; gutture albo, maculis fuſcis vario; collo caſtaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis; marginibus alarum griſeo-fulvis; rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus; roſtro ſuperiùs fuſco, inferiùs flavicante; pedibus griſeo-fuſcis . . . . Cancrofagus viridis.

Ardea occipite ſubcriſtato, dorſo viridi, pectore rufeſcente. Ardea vireſcens. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 15.
Ardea Stellaris minima. *Klein. Avi. pag.* 123. *N°.* 6.
Petit Butor. *Catesb. Tom. I. pag.* 80; *avec une figure exacte Pl.* 80.
Les Anglois l'appellent Small Bittern. *Catesb.*

Il n'eſt guères plus gros qu'un *Poulet.* Sa longueur depuis le

Craſſitie *Pullum Gallinaceum* non multùm excedit,

Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & sex lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem septem pollices & tres lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & decem lineas longum est ; cauda duos pollices cum novem lineis ; pars crurum plumis denudata unum pollicem ; pes unum pollicem & novem lineas ; trium digitorum anticorum medius cum ungue eâdem longitudine pollet ; extimus octodecim lineas longus, intimus unum pollicem & quatuor lineas ; posticus autem quatuordecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum ; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis superior pars est obscurè viridi aurea, cupri puri colore varians. Guttur albicat, & maculis quibusdam variegatur fuscis. Collum castaneo colore imbutum,

bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces six lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied sept pouces trois lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces dix lignes de long ; sa queue deux pouces neuf lignes ; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce ; son pied un pouce neuf lignes ; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce neuf lignes de long ; l'extérieur dix-huit lignes, l'intérieur un pouce quatre lignes ; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a deux pieds de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de quelques taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent

ſur la poitrine. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette. Les plumes qui couvrent la partie ſupérieure du dos, ainſi que les ſcapulaires, ſont très-longues & fort étroites. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un brun tirant un peu ſur le marron. Le haut des jambes tire ſur le fauve. Les couvertures du deſſous des aîles ſont cendrées, chaque plume étant bordée de fauve. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt d'un gris-fauve. Toutes les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette; les plus petites ſont bordées de marron: les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont bordées de fauve: les grandes les plus éloignées du corps ſont bordées de la même couleur, mais ſeulement par le bout. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes d'un verd-doré ſombre & changeant en couleur de cuivre de roſette: les ſept premieres n'ont aucune bordure: les quatre ſuivantes, ſçavoir depuis la huitiéme juſ-

albido in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis & ſtrictiſſimis, pectori incumbentibus. Dorſum, uropygium, ſcapulares pennas & ſuperiores caudæ tectrices tingit color viridi-aureus, cupri puri colore varians. Pennæ dorſum ſupremum veſtientes, ſicut & ſcapulares, longiſſimæ ſunt & ſtrictiſſimæ. Pectus, venter, latera, inferioreſque caudæ tectrices ex fuſco nonnihil ad caſtaneum vergunt. Crurum ſuprema pars ad fulvum inclinat. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt cinereæ, fulvo fimbriatæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, ſunt griſeo-fulvæ. Superiores alarum tectrices omnes viridi-aureæ, cupri puri colore variantes; minimæ caſtaneo marginantur: mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, ſunt fulvo fimbriatæ: majores à corpore remotiores eodem colore marginatæ quidem, ſed in apice tantùm. Alam componunt viginti quatuor remiges obſcurè viridi-aureæ, cupri puri colore variantes: ſeptem primores nullâ margine donantur;

donantur : quatuor proximè sequentes, ab octava scilicet ad undecimam usque inclusivè, sunt fulvo in apice fimbriatæ : tredecim reliquæ, à duodecima scilicet ad vigesimam quartam usque inclusivè, fulvo similiter marginatæ per totam lateris exterioris longitudinem, sicut & in apice. Sex remiges corpori finitimæ maximam obtinent longitudinem, in acumen desinunt, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim conflatur rectricibus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus. Oculorum irides luteæ. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & solummodo cute luteâ obducitur. Mandibula superior fusca ; inferior flavicans, præsertim versùs exortum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque griseo-fusci. *Ranis*, *Cancris* & *Pisciculis* victitat. Habitat in *Carolina*, *Virginia*, *Martinica* & *Cayana*, unde in *musæum Realmurianum* missus à *D. Artur*.

qu'à l'onziéme inclusivement, sont bordées de fauve par le bout : les treize autres, sçavoir depuis la douziéme jusqu'à la vingt-quatriéme inclusivement, sont bordées pareillement de fauve dans toute la longueur du côté extérieur & par le bout. Les six plumes de l'aîle les plus proches du corps sont fort longues, se terminent en pointe, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. L'iris des yeux est jaune. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaune. Le demi-bec supérieur est brun ; l'inférieur est jaunâtre, sur-tout vers son origine. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont d'un gris-brun. Il se nourrit de *Grenouilles*, de *Crabes* & de *petit Poissons*. On le trouve à *la Caroline*, en *Virginie*, à *la Martinique* & à *Cayenne*, d'où il a été envoyé à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

** 44. Le Crabier verd tacheté.

Voyez Pl. XXXVIII. Fig. 2.

Ardea ſuperne viridi-aurea, cupri puri colore varians, infernè griſea; gutture albo, maculis fuſcis vario; collo caſtaneo, albido in parte inferiore variegato; pennis in colli inferioris ima parte ſtrictiſſimis & longiſſimis; marginibus alarum albidis; alis ſuperne albo punctulatis; rectricibus obſcurè viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus apice griſeo-fuſcis; roſtro ſuperiùs nigricante, infernè albo-flavicante; pedibus fuſcis . . . . . Cancrofagus viridis nævius.

Il n'eſt pas tout-à-fait ſi gros que le précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied trois pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied cinq pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces neuf lignes de long; ſa queue deux pouces trois lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, huit lignes; ſon pied un pouce ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce neuf lignes, l'extérieur ſeize lignes & demie, l'intérieur un pouce quatre lignes; & celui de derriere quatorze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une mem-

Præcedenti nonnihil craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem tres pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues unum pedem quinque pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & novem lineas longum eſt; cauda duos pollices cum tribus lineis; pars crurum plumis denudata octo lineas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem cum novem lineis, extimus ſexdecim cum ſemi lineas, intimus unum pollicem & quatuor lineas; poſticus autem quatuordecim lineas. Trium

digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque protensâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum unius pedis & decem pollicum intervallo distant ; alæ verò complicatæ ad sex linearum distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Capitis pars superior est obscurè viridi-aurea, cupri puri colore varians. Guttur albicat, & maculis fuscis variegatur. Collum castaneo colore tinctum, albido in parte inferiore variegatum. Colli autem inferioris pars infima pennis obsita est longissimis & strictissimis, pectori incumbentibus : quæ pennæ sunt griseæ, & latâ tæniâ candicante, secundùm scapi longitudinem ductâ, insignitæ. Dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt viridi-aureæ, cupri puri colore variantes. Pennæ dorsi partem supremam vestientes, sicut & scapulares, longissimæ sunt & strictissimæ. Pectus, ventrem & latera tingit color griseus. Crurum suprema pars ex griseo ad fulvum nonnihil inclinat. Pennæ caudam subtus obtebrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a un pied dix pouces de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à six lignes au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un verd-doré sombre & changeant en couleur de cuivre de rosette. La gorge est d'un blanc varié de taches brunes. Le col est de couleur de marron, sa partie inférieure étant variée de blanchâtre. Le bas de cette même partie est garni de plumes très-longues & très-étroites, qui retombent sur la poitrine : ces plumes sont grises, & marquées chacune d'une large bande blanchâtre, qui s'étend selon la longueur de la tige. Le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un verd-doré changeant en couleur de cuivre de rosette. Les plumes qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont très-longues & très-étroites. La poitrine, le ventre & les côtés sont gris. Le haut des jambes est d'un gris tirant un peu sur le fauve. Les couvertures du dessous de la queue sont grises, & variées de blanchâtre. Les petites du dessous des aîles sont d'un gris-brun, & marquées chacune

d'une tache blanchâtre, placée vers leur extrémité, & qui s'étend ſelon la longueur de leur tige : les grandes ſont cendrées. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt blanchâtre. Les couvertures du deſſus des aîles ſont d'un brun nuancé de verd-doré & de couleur de cuivre de roſette : les plus petites ſont bordées de marron : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont bordées extérieurement de fauve, & marquées d'une tache blanche, placée à l'extrémité du côté extérieur, tout auprès de la tige : les grandes les plus éloignées du corps ſont marquées d'une pareille tache blanche, mais elles n'ont point de bordure. L'aîle eſt compoſée de vingt-quatre plumes d'un brun foncé, & dont le côté extérieur eſt nuancé de verd-doré changeant en couleur de cuivre de roſette : de plus les dix-huit premieres ſont marquées à leur extrémité d'une tache blanche, qui devient d'autant plus petite, que la plume eſt plus proche du corps : les ſix autres ſont terminées de gris-brun. Ces ſix dernieres plumes ſont fort longues, ſe terminent en pointe, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus

gentes griſeæ, albido variegatæ. Inferiores alarum tectrices minores griſeo-fuſcæ, maculâ candicante, versùs ipſarum extremitatem poſitâ, & ſecundùm ſcapi longitudinem ductâ, notatæ : majores cinereæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, albidæ. Superiores alarum tectrices fuſcæ, viridi-aureo & cupri puri colore adumbratæ : ex ipſis minimæ caſtaneo marginatæ : mediæ, ſicut & majores corpori finitimæ, exteriùs fulvo fimbriatæ, & maculâ albâ, in lateris exterioris extremitate prope ſcapum poſitâ, inſignitæ : majores à corpore remotiores pari maculâ candidâ notantur, ſed margine deſtituuntur. Alam componunt viginti quatuor remiges ſaturatè fuſcæ, in latere exteriore viridi-aureo cupri puri colore variante adumbratæ : octodecim primores maculâ inſuper albâ in extremitate notantur ; quæ macula eò minor eſt, quò remix fit corpori vicinior : ſex reliquæ griſeo-fuſco terminantur. Quæ ſex noviſſimè dictæ remiges maximâ longitudine pollent, in acumen deſinunt, & dum ala com-

plicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Cauda duodecim constat rectricibus obscurè viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, lateralibus omnibus griseo-fusco terminatis. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavicante tectum. Mandibula superior nigricat ; inferior ex albo flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque fusci. Habitat in *Martinica*, unde in *museum D. Aubry* missus est.

grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes d'un verd-doré sombre, & changeant en couleur de cuivre de rosette : toutes les latérales sont terminées de gris-brun. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Le demi-bec supérieur est noirâtre ; l'inférieur est d'un blanc-jaunâtre. La partie des jambes, qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont bruns. On le trouve à *la Martinique*, d'où il a été envoyé à *M. l'Abbé Aubry*, qui le conserve dans son *cabinet*.

** 45. Le Bihoreau.

Voyez Pl. XXXIX.

Ardea superne obscurè viridis, infernè alba ; vertice nigro-virideſcente ; tæniâ in syncipite & supra oculos candidâ ; pennis tribus in occipite strictissimis longissimis candidis ; collo superiore albo-cinerascente ; uropygio dilutè cinereo ; remigibus, rectricibusque cinereis ; rostro nigricante ; pedibus viridi-flavicantibus . . . . Nycticorax.

Ardea crista occipitis tripenni dependente, dorso nigro, abdomine flaveſcente. Nycticorax. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *sp.* 9.
Ardea cirrata, alba, dorso nigro. *Barr. Ornith. Class. IV. Gen. I. sp.* 7.
Ardea varia. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 226.
Ardea varia Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 123. *N°.* 5.
Ardea cinerea altera, seu minor. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 380. *hujus icon satis accurata pag.* 381.
Ardea cinerea minor. *Jonst. Avi. pag.* 103. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 50.
Raj. Syn. Avi. pag. 99. *N°.* 3.

Charlet. Exer. pag. 109. *N°.* 1.
Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag. 364.
Marſil. Danub. Tom. V. pag. 10. *hujus icon peſſima Tab.* 3.

Ardea cinerea minor, Germanis Nycticorax. *Willugh. Ornith. pag.* 204. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. XLIX.*

Nycticorax. *Geſn. Avi. pag.* 627. *hujus icon peſſima pag.* 628.
Geſn. icon. Avi. pag. 18, *in qua eadem icon.*
Charlet. Exer. pag. 79. *N°.* 9.
Charlet. Onomazt. pag. 71. *N°.* 9.
Sibbald. Scot. illuſtr. Part. II. Lib. III. pag. 15.

Nycticorax Ornithologi. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 271. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 272.

Nicticorax Geſneri. *Jonſt. Avi. pag.* 95. *hujus icon à Geſnero mutuata Tab. XX.*

Corvus Nocturnus Agric. *Klein.*

Héron ou Ardea cinerea roſtro craſſiori. *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag.* 411. (*ed.* 1725).

Bihoreau ou Roupeau, Eſpece de Héron. *Bel. Hiſt. nat. des Oiſ. pag.* 197; *avec une mauvaiſe figure pag.* 198.

Bihoreau, Roupeau. *Bel. Portr. d'Oiſ. pag.* 44 *a*, *dans laquelle eſt la même figure.*

Corbeau de nuit. *Alb. Tom. II. pag.* 43; *avec une figure mal coloriée Pl.* 67.

Les Boulonnois l'appellent SGUACCO. *Aldrov.*

Les Allemands, NACHT-RABE. *Geſn. Aldrov. Schwenck.* NACHT-RAB. *Willugh.* BUNDTER REGER; SCHILD REGER. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, NACHT-RAM. *Geſn. Aldrov. Schwenck.*

Les Siléſiens, FOCKER; FOCKE. *Schwenck.*

Les Hollandois, QUACK. *Charlet.*

Les Flamands, QUACK. *Willugh.*

Les Anglois, NIGHT-RAVEN. *Willugh. Raj. Charlet. Sibbald. Alb.* LESSER ASH COLOURED HERON. *Raj.*

Il eſt à peu près de la groſſeur d'une *Corneille*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied huit pouces, & juſqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces trois lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins

Cum *Cornice* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem unum pedem & octo pollices æquat, & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius

apice ad oris angulos usque tres pollices & novem lineas longum est; cauda tres pollices cum decem lineis; pars crurum plumis denudata tredecim lineas; pes duos pollices & septem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & undecim lineas, extimus duos pollices & totidem cum semi lineas, intimus duos pollices cum sesquilinea; posticus autem unum pollicem & octo lineas. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Alis expansis, extremitates majorum remigum trium pedum & duorum pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Supra mandibulæ superioris exortum sive in syncipite exigua extat tænia candida, utrinque supra oculos ducta. Vertex capitis nigro-virideſcente tingitur colore : qui color supra collum superius extenditur, & in acumen desinit. Ab occipitio tres oriuntur pennæ quinque circiter pollices longæ, strictissimæ, niveo candore nitentes. Collum superiùs & ad

de la bouche a trois pouces neuf lignes de long; sa queue trois pouces dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, treize lignes; son pied deux pouces sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces onze lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes & demie, l'intérieur deux pouces une ligne & demie; & celui de derriere un pouce huit lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a trois pieds deux pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. Au-dessus de l'origine du demi-bec supérieur ou sur le synciput est une petite bande blanche, qui s'étend de chaque côté jusqu'au dessus des yeux. Le dessus de la tête est d'un noir changeant en verd : cette couleur s'étend en pointe sur la partie supérieure du col. De l'occiput partent trois plumes longues d'environ cinq pouces, très-étroites & d'un très-beau blanc. La partie supérieure & les côtés du col sont d'un blanc tirant un peu sur le cendré. La partie supérieure du dos & les

plumes ſcapulaires ſont d'un verd foncé & obſcur. La partie inféricure du dos, le croupion & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un cendré clair; quelques-unes des couvertures du deſſus de la queue ſont cependant d'un cendré plus foncé. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau d'un verd-jaunâtre. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un beau blanc. Les côtés ſont d'un blanc tirant un peu ſur le cendré. Les couvertures du deſſous des aîles ſont d'un cendré très-clair. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt blanc. Les couvertures du deſſus des aîles ſont cendrées. Les plumes de l'aîle ſont de la même couleur. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. L'iris des yeux eſt d'un jaune-orangé. Le bec eſt d'un verd-jaunâtre à ſon origine, & noirâtre dans le reſte de ſa longueur. La partie des jambes qui

latera ex albo nonnihil ad cinereum vergit. Dorſi ſuprema pars & ſcapulares pennæ ſunt obſcurè ſaturatè virides. Dorſum infimum, uropygium & ſuperiores caudæ tectrices dilutè cinereæ; quædam tamen ex ſuperioribus caudæ tectricibus cinereo imbuuntur ſaturatiore. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis denudatur, & ſolummodo cute viridi-flavicante obtegitur. Guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices candore nitent. Latera ex albo nonnihil ad cinereum inclinant. Pennæ alas ſubtus obtegentes ſunt diluti ſſimè cinereæ. Margines alarum, infra articulum carpo humano reſpondentem, albæ. Superiores alarum tectrices cinereæ. Remiges concolores. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates attingunt. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Oculorum irides flavo-aurantiæ. Roſtrum in exortu viridi-flavicans, in reliqua longitudine nigricans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque

pedesque viridi-flavicantes; ungues verò nigricantes. Paludes frequentat. *Ex museo Realmuriano.*

est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve dans les marais. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

** 46. Le Blongios.

Voyez Pl. XL. Fig. 1.

Ardea superne nigro-virideſcens, infernè dilutè fulva; collo superiore griseo-fulvo, ad castaneum vergente; pennis in colli inferioris ima parte longissimis; pectore maculis longitudinalibus nigricantibus vario; rectricibus nigro-virescentibus; rostro viridi-flavicante, superiùs apice nigricante; pedibus virescentibus . . . . Ardeola.

Petit Butor. *Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag.* 136; *avec une figure peu exacte Pl.* 275.
On l'appelle en Barbarie Boo-onk. *Edwards.*

Turdum crassitie non multùm superat. Ipsius longitudo à rostri apice ad caudæ extremitatem tredecim pollices & novem lineas explet, & ad extremos ungues quindecim pollices & quatuor lineas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque duos pollices & sex cum semi lineas longum est; cauda duos pollices; pars crurum plumis denudata lineas binas; pes unum pollicem cum septem lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & decem lineas, ex-

Il n'est guères plus gros qu'une *Grive*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est de treize pouces neuf lignes, & jusqu'à celui des ongles de quinze pouces quatre lignes. Son bec depuis sa pointe jusqu'aux coins de la bouche a deux pouces six lignes & demie de long; sa queue deux pouces; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, deux lignes; son pied un pouce sept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce dix lignes, l'extérieur un pouce six lignes; l'intérieur

eſt de la même longueur ; & celui de derriere a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Il a un pied ſept pouces ſix lignes de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La partie ſupérieure de la tête, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un noir-verd brillant & un peu doré. La partie ſupérieure du col eſt d'un gris-fauve, tirant un peu ſur le marron. L'eſpace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil eſt dégarni de plumes, & couvert ſeulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un fauve clair. Le bas de la partie inférieure du col eſt garni de plumes très-longues, qui retombent ſur la poitrine. Celles qui couvrent la poitrine, ſont noirâtres, & bordées de fauve clair. Le bas-ventre, les couvertures du deſſous de la queue & celles du deſſous des aîles ſont d'un blanc mêlé d'une légere teinte de fauve. Les petites & les moyennes

timus ſeſquipollicem ; intimus eamdem longitudinem obtinet ; poſticus autem tredecim lineas longus eſt. Trium digitorum anticorum medius extimo digito coadunatur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis ſeptem pollicum & ſex linearum intervallo diſtant ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Capitis ſuperior pars, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices ſunt ſplendidè nigro-virideſcentes, nonnihil aureo colore adumbratæ. Pars colli ſuperior ex griſeo-fulvo nonnihil ad caſtaneum vergit. Spatium roſtrum inter & oculum utrinque contentum plumis eſt denudatum, & ſolummodo cute flavicante obſitum. Caput ad latera, guttur, partem colli inferiorem, ventrem ſupremum, crurum partem ſupremam & latera veſtiunt pennæ dilutè fulvæ. Colli inferioris pars infima pennis obſita eſt longiſſimis, pectori incumbentibus. Quæ pectus obtegunt, nigricant, & fulvo marginantur diluto. Venter imus, inferiores caudæ

tectrices & pennæ alas subtus obtegentes albent, & aliquid fulvi admixtum habent. Superiores alarum tectrices minores & mediæ sunt dilutè fulvæ : majores à corpore remotiores nigro-virideſcentes : majores corpori finitimæ ex albo ad griſeum vergentes; ex iſtis tamen excipiendæ ſunt binæ corpori viciniores, ſicut & proximè ſequentis interius latus, dorſo concolores. Viginti duabus remigibus ala conflatur : novemdecim primores ſunt ſuperne nigræ, exteriùs ad virideſcentem inclinantes colorem, ſubtus verò cinereæ : tres corpori viciniores fuſcæ, fulvo fimbriatæ. Quinque corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-vireſcentes. Mandibula ſuperior ex viridi flavicat, attamen in apice nigricat; inferior per totam longitudinem viridi-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque vireſcentes; ungues verò griſei. Paludes frequentat. In *muſeum Realmurianum* ab *Helvetia* miſſa eſt à *D. Gannebin.*

couvertures du deſſus des aîles ſont d'un fauve clair : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un noir-verdâtre : les grandes les plus proches du corps ſont d'un blanc tirant ſur le gris ; il faut cependant en excepter les deux plus proches du corps & le côté intérieur de la ſuivante, qui ſont de la même couleur que le dos. L'aîle eſt compoſée de vingt-deux plumes : les dix-neuf premieres ſont noires en-deſſus, leur côté extérieur tirant ſur le verdâtre ; mais en-deſſous elles ſont cendrées : les trois plus proches du corps ſont brunes, & bordées de fauve. Les cinq plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noir-verd. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un verd-jaunâtre, excepté ſon bout qui eſt noirâtre ; l'inférieur eſt d'un verd-jaunâtre dans toute ſa longueur. La partie des jambes, qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres ; & les ongles gris. On le trouve dans les marais. Il a été envoyé de *Suiſſe* à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin.*

** 47. Le Blongios tacheté.

Voyez Pl. XL. Fig. 2.

Ardea ſuperne fuſca, marginibus pennarum rufeſcentibus, infernè rufeſcens, pennis in medio fuſcis; vertice nigro-vireſcente, pennis in fronte caſtaneo marginatis; pennis in colli inferioris ima parte longiſſimis; imo ventre albo; rectricibus nigro-vireſcentibus, fulvo in apice marginatis; roſtro ſuperiùs fuſco, infernè viridi-flavicante; pedibus vireſcentibus . . . . Ardeola nævia.

Petit Butor brun. *Edwards. Glanur. Part. II. Chap. LXV. pag.* 135; *avec une figure aſſez exacte Pl.* 275.
Les Anglois l'appellent Little Brown Bittern. *Edwards.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du précédent. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces neuf lignes, & juſqu'à celui des ongles de treize pouces ſix lignes. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces deux lignes & demie de long; ſa queue un pouce huit lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux lignes; ſon pied un pouce ſept lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce huit lignes, l'extérieur un pouce cinq lignes; l'intérieur eſt de la même longueur; & celui de derriere a treize lignes de long. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt

Cum præcedente craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices & novem lineas æquat; & ad extremos ungues tredecim pollices & ſex lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & totidem cum ſemi lineas longum eſt; cauda unum pollicem & octo lineas; pars crurum plumis denudata lineas binas; pes unum pollicem & ſeptem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & octo lineas, extimus unum pollicem cum quinque lineis; intimus eâdem longitudine pollet; poſticus autem tre-

decim lineas longus est. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est octodecim pollicum & sex linearum ; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Vertex capitis ex nigro viresçit : in fronte autem pennæ castaneo marginantur. Partem colli superiorem vestiunt pennæ rufæ, in medio nonnihil fuscescentes. Quæ dorsum supremum obtegunt, sicut & scapulares, fuscæ sunt, marginibus ipsarum rufescentibus. Quæ dorsum infimum & uropygium cooperiunt, griseo-fuscæ, griseo-fulvo fimbriatæ. Superiores caudæ tectrices nigricant, & griseo-fulvo similiter marginantur. Spatium rostrum inter & oculum utrinque contentum plumis est denudatum, & solummodo cute flavicante tectum. Caput ad latera, guttur, pars colli inferior, pectus, venter supremus, crurum suprema pars & latera pennis vestiuntur rufescentibus, maculâ fuscâ, secundùm ipsarum scapi longitu-

réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Il a dix-huit pouces six lignes de vol ; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'au bout de la queue. La partie supérieure de la tête est d'un noir-verdâtre : sur le front les plumes sont bordées de marron. La partie supérieure du col est couverte de plumes rousses, dont le milieu est un peu rembruni. Celles qui couvrent la partie supérieure du dos, ainsi que les scapulaires, sont brunes & bordées de roussâtre. Celles qui couvrent la partie inférieure du dos & le croupion, sont d'un gris-brun, bordées de gris-fauve. Les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, & bordées pareillement de gris-fauve. L'espace contenu de chaque côté entre le bec & l'œil est dégarni de plumes, & couvert seulement d'une peau jaunâtre. Les côtés de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le haut du ventre, le haut des jambes & les côtés sont couverts de plumes roussâtres, marquées dans leur milieu d'une tache brune, qui s'étend selon la longueur de leur tige. Celles qui garnissent le bas de la partie inférieure du col, sont fort longues, & retombent sur

la poitrine. Le bas-ventre eſt blanc, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue. Les petites couvertures du deſſous des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un fauve très-clair : les grandes les plus éloignées du corps ſont blanches. Les plus petites du deſſus ſont brunes & bordées de rouſſâtre : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont brunes dans leur milieu, & fauves ſur leurs bords : les grandes les plus éloignées du corps ſont d'un noir-verdâtre. L'aîle eſt compoſée de vingt-deux plumes. Les dix-neuf premieres ſont noires en-deſſus, leur côté extérieur tirant ſur le verdâtre ; mais en-deſſous elles ſont cendrées : les trois plus proches du corps ſont brunes, & bordées de fauve. Les cinq plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un noir-verdâtre, bordées de fauve par le bout. Le demi-bec ſupérieur eſt brun ; l'inférieur eſt d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont verdâtres ; & les ongles gris. On le trouve dans les marais. Il

dinem ductâ, in medio inſignitis. Pennæ autem quibus obſita eſt colli inferioris pars infima, maximâ longitudine pollent, & pectori incumbunt. Venter imus & pennæ caudam ſubtus obtegentes albicant. Tectrices alarum inferiores minores, ſicut & majores corpori finitimæ, ſunt dilutiſſimè fulvæ : majores à corpore remotiores candidæ. Superiores minimæ fuſcæ, rufeſcente fimbriatæ : mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, in medio fuſcæ, ad margines fulvæ : majores à corpore remotiores nigro-vireſcentes. Viginti duabus remigibus ala conſtat : novemdecim primores ſunt ſuperne nigræ, exteriùs ad vireſcentem vergentes colorem, ſubtus cinereæ : tres corpori finitimæ fuſcæ, fulvo fimbriatæ. Quinque corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices nigro-vireſcentes, fulvo in apice marginatæ. Mandibula ſuperior fuſca ; inferior viridi-flavicans. Pars crurum plumis denudata, pedeſque vireſcentes ; ungues verò griſei.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Héron.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Héron huppé.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6

Echelle de 6. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Héron gris.

2. Héron pourpré hupé.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. *Butor.* 2. *Crabier des Philippines.*

Dessiné et Gravé par Martinet

1. Crabier verd. 2. Crabier verd tacheté.

Dessiné et Gravé par Martinet.

Bihoreau.



Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Blongios.

2. Blongios tacheté.

Paludes frequentat. In *musæum Realmurianum* ab *Helvetia* missa est à *D. Gannebin.*

a été envoyé de *Suisse* à *M. de Reaumur* par *M. Gannebin.*

Forsan hæc est præcedentis fœmina.

Celui-ci pourroit bien être la femelle du précédent.

LXXXII.

Genus Scopi. (1)

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum crassum, longum, rectum, lateraliter planum:
Mandibulæ superioris apex aduncus.

(1) *Scopus à* Σκία, id est, *umbra*: ab umbræ colore; unde nomen.

LXXXII.

Le genre de l'Ombrette. (1)

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec gros, long, droit, applati par les côtés:
Le bout de la mandibule supérieure crochu.

(1) *Ombrette.* Je l'ai ainsi nommée, à cause de la couleur d'*ombre*, dont toutes ses plumes sont teintes.

** 1. L'Ombrette.

Scopus fuscus, superne saturatiùs, infernè dilutiùs; tectricibus caudæ inferioribus, rectricibusque dilutè fuscis, fusco saturatiore transversim striatis .... Scopus.

Cum *Egretta* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem & novem pollices explet, & ad extremos ungues unum pedem undecim pol-

Elle est à peu près de la grosseur de l'*Aigrette*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied neuf pouces, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces trois lignes. Son bec depuis

ſon crochet juſqu'aux coins de la bouche a trois pouces ſix lignes de long; ſa queue ſix pouces ſix lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces trois lignes; ſon pied quatre pouces ſix lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces, l'extérieur un pouce neuf lignes, l'intérieur un pouce ſept lignes & demie; & celui de derriere treize lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec les deux doigts latéraux par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. Elle a trois pieds ſix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. La tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un brun foncé ou de couleur de *terre d'ombre*. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du deſſous des aîles ſont de la même couleur, mais plus claire. Les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un brun clair, rayé tranſverſalement de brun très-foncé. Toutes les

lices & tres lineas. Roſtrum ab ipſius unco ad oris angulos uſque tres pollices & ſex lineas longum eſt; cauda ſex pollices & totidem lineas; pars crurum plumis denudata duos pollices cum tribus lineis; pes quatuor pollices & ſex lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices, extimus unum pollicem & novem lineas, intimus unum pollicem & ſeptem cum ſemi lineas; poſticus autem tredecim lineas. Trium digitorum anticorum medius cum duobus digitis lateralibus connectitur membranâ ad primum articulum uſque protensâ. Alis expanſis, extremitates majorum remigum trium pedum & ſex pollicum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Caput pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne veſtientes & ſuperiores caudæ tectrices ſunt ſaturatè fuſcæ ſive *umbræ* colore imbutæ. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem ſupremam & tectrices alarum inferiores tingit idem color, ſed dilutior. Pennæ caudam

ſubtus

ſubtus obtegentes ſunt dilutè fuſcæ, fuſco ſaturatiſſimo tranſverſim ſtriatæ. Omnes alarum remiges in latere exteriore & apice eodem imbuuntur fuſco ac dorſum ipſum tingitur, in latere verò interiore fuſco dilutiore tinguntur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt duodecim rectrices dilutè fuſcæ, ſaturatiſſimo fuſco tranſverſim ſtriatæ. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque nigricant. Mandibula ſuperior pluribus partibus inter ſe coadunatis conflata videtur. Habitat in *Senegalenſi* regione, unde in *muſeum Realmurianum* miſſus eſt à *D. Adanſon.*

plumes de l'aîle ſont du même brun que le dos du côté extérieur & à leur extrémité ; leur côté intérieur eſt d'un brun plus clair. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un brun clair, rayé tranſverſalement de brun très-foncé. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont noirâtres. Le demi-bec ſupérieur ſemble être compoſé de pluſieurs piéces articulées les unes avec les autres. On la trouve au *Sénégal*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Adanſon.*

SECTIO IX.

Eæ quæ roſtrum habent craſſum & breve ; ipſius mandibulâ ſuperiore cochleariformi, apice unguiculatâ.

UNICO genere, *Cochlearii* ſcilicet, conſtituitur hæc ſectio.

SECTION IX.

Ceux qui ont le bec gros & court ; la mandibule ſupérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à ſon bout.

IL n'y a dans cette ſection qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de la *Cuilliere.*

LXXXIII.

Le genre de la Cuilliere.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec gros, court :
La mandibule ſupérieure en forme de cuilliere, & onguiculée à ſon bout.

LXXXIII.

Genus Cochlearii.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum craſſum, breve :
Mandibula ſuperior cochleariformis, apice unguiculata.

** 1. La Cuilliere.

Cochlearius ſuperne cinereo-albus, infernè fuſco-rufeſcens ; capite ſuperiore nigro ; ſyncipite, genis & collo inferiore albis ; dorſo ſupremo ſaturatè cinereo ; rectricibus cinereo-albis . . . . Cochlearius.

Onocrotalus Americanus, cinereus, non maculoſus. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XI. ſp.* 1.
Les François de la Guiane l'appellent Saouakou.

Elle eſt un peu moins groſſe que le *Courly*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'un pied cinq pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles d'un pied dix pouces ſix lignes. Son bec, qui a un pouce ſix lignes de largeur, a depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche deux pouces neuf lignes de long ; ſa queue deux pouces ſix lignes ; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de

Numenio paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam unum pedem quinque pollices & ſex lineas æquat ; & ad extremos ungues unum pedem decem pollices & ſex lineas. Roſtrum, quod ſeſquipollicis latitudinem obtinet, ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & novem lineas longum eſt ; cauda

duos pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum novem lineis; pes tres pollices & totidem lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum totidem lineis, intimus duos pollices; posticus autem quindecim lineas. Trium digitorum anticorum medius ad extimum digitum adnectitur membranâ ad primum articulum usque productâ. Ab extremo ad extremum alarum extensarum distantia est duorum pedum & undecim pollicum; alæ verò complicatæ ad unius pollicis distantiam ultra caudam extremam protenduntur. Caput superius nigro tingitur colore. Synciput, caput ad latera sive genæ, collumque inferiùs & ad latera albicant. Pars colli superior, dorsum infimum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne cooperiunt, superioresque caudæ tectrices ex cinereo albent. Dorsi partem supremam tingit color saturatè cinereus. Pectus, venter, latera, inferioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufes-

plumes, un pouce neuf lignes; son pied trois pouces trois lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces six lignes, l'extérieur deux pouces deux lignes, l'intérieur deux pouces; & celui de derriere quinze lignes. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend jusqu'à la premiere articulation. Elle a deux pieds onze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent jusqu'à un pouce au-delà du bout de la queue. La partie supérieure de la tête est noire. Le synciput, les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col sont blancs. Le dessus du col, la partie inférieure du dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un gris-blanc. La partie supérieure du dos est d'un cendré foncé. La poitrine, le ventre, les côtés & les couvertures du dessous de la queue sont d'un brun-roussâtre. Le haut des jambes est d'un gris-blanc. Les couvertures du dessous des aîles sont blanches. Le bord de l'aîle, au-dessous du pli qui répond à celui du poignet, est

de la même couleur. Toutes les plumes de l'aîle ſont d'un gris-blanc. Les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un gris-blanc. Le demi-bec ſupérieur eſt d'un cendré foncé, excepté ſes bords, qui ſont blanchâtres; le demi-bec inférieur eſt entiérement blanchâtre, & garni en-deſſous d'une membrane de la même couleur, capable d'une très-grande extenſion. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans *la Guiane*. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur*.

centes. Crurum ſuprema pars ex cinereo albicat. Inferiores alarum tectrices ſunt candidæ. Alarum margines, infra articulum carpo humano reſpondentem, concolores. Remiges omnes cinereo-albæ. Corpori finitimæ maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus cinereo-albis cauda conſtat. Mandibula ſuperior ſaturatè cinerea, attamen ad margines candicans; inferior penitùs albida, & ſubtus membranâ concolore, valdè inflabili, inſtructa. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes; ungues verò griſei. Habitat in *Guiana*. A. *Cayana* in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Artur*.

A. *La Cuilliere tachetée.*

Cochlearius nævius.

Onocrotalus Americanus, cinereus, maculatus. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XI. ſp.* 2.

Les Indiens de la Guiane l'appellent Arapapa. *Barr.*

Elle eſt de la grandeur & de la groſſeur de la précédente. Elle en différe ſeulement en ce qu'elle eſt variée de taches brunes. On la trouve auſſi dans la *Guiane*.

Magnitudine & craſſitie cum præcedente convenit. Ab illo tantùm diſcrepat maculis fuſcis quibus variegatus eſt. In *Guiana* ſimiliter habitat.

2. La Cuilliere brune.

Cochlearius fuscus ; capite nigro ; ventre candicante variegato ; rectricibus fuscis . . . . Cochlearius fuscus.

Cancrofagus major, rostro cochlearis instar excavato, ingluvie magnâ extuberante. *Barr. Hist. Fr. Eq. pag.* 128.
Tamatia Brasilienſibus dicta. *Marcgr. Hist. Br. pag.* 208. *hujus icon non satis accurata pag.* 209.
Jonst. Avi. pag. 143. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59, *subtitulo*, Tamatia alia.
Gallinula aquatica, Tamatia Brasilienſibus dicta Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 238.
Gallinula aquatica, Tamatia Brasilienſibus Marcgravii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 116. *N°.* 12.
Les François de la Guiane l'appellent Saouakou des bois. *Barr.*
Les Brasiliens, Tamatia. *Marcgr. Jonst. Willugh. Raj. Barr.*

Præcedentem craſſitie circiter æmulatur. Roſtrum, quod quindecim circiter linearum latitudinem obtinet, ab ipſius extremitate ad oris angulos uſque duos pollices & ampliùs longum eſt. Caudam habet valdè brevem ; pedes eâdem circiter longitudine pollentes ac pedes præcedentis. Caput ipſius obtegunt pennæ nigræ. Quæ guttur, collum, univerſumque corpus veſtiunt, ſicut & ſcapulares, alas ſuperne & infernè cooperientes, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores, fuſco tinguntur colore ; in ventre tamen candicantis aliquid admiſcetur. Remiges alarum eodem im-

Elle eſt à peu près de la grandeur de la précédente. Son bec, qui a environ quinze lignes de largeur, a depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche plus de deux pouces de long. Sa queue eſt fort courte. Ses pieds ſont à peu près auſſi longs que ceux de la précédente. Sa tête eſt couverte de plumes noires. Celles qui couvrent la gorge, le col & tout le corps, ainſi que les ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, & celles du deſſus & du deſſous de la queue, ſont brunes ; le ventre eſt cependant varié d'un peu de blanchâtre. Les plumes de l'aîle ſont du même brun que le dos. Les plus proches du corps ſont

fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes. Les yeux ſont noirs. Le demi-bec ſupérieur eſt de la même couleur; l'inférieur eſt jaunâtre, & garni en-deſſous, comme celui de la précédente, d'une membrane capable d'une grande extenſion. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles noirâtres. Celui du milieu des trois doigts antérieurs eſt réuni avec le doigt extérieur par une membrane, qui s'étend juſqu'à la premiere articulation. On la trouve dans *la Guiane* & au *Bréſil.*

buuntur fuſco ac dorſum ipſum tingitur. Corpori viciniores ſunt longiſſimæ, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus fuſcis cauda conflatur. Oculi ſunt nigri. Mandibula ſuperior ſimiliter nigra; inferior flavicans, & præcedentis inſtar, membranâ maximè inflabili ſubtus inſtructa. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes; ungues verò nigricantes. Trium digitorum anticorum medius cum extimo digito connectitur membranâ ad primum articulum uſque productâ. Habitat in *Guiana* & *Braſilia.*

SECTION X.

Ceux qui ont le bec court, droit & conique vers le bout.

CETTE ſection ne contient encore qu'un ſeul genre, ſçavoir celui de l'*Oiſeau-royal.*

Tous les Oiſeaux de cette ſection ont la tête ornée d'une hupe compoſée de plumes reſſemblantes à des racines de Chiendent.

SECTIO X.

Eæ quæ roſtrum habent breve, rectum, apice conicum.

IN illa ſectione unicum quoque continetur genus, ſcilicet *Balearicæ.*

Omnes hujus ſectionis Alites in capite ornantur corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ.

LXXXIV.

Genus Balearicæ.

Hujus character est
Digiti quatuor, membranis destituti; tres scilicet antici, posticus unus:
Crura in parte inferiore plumis denudata:
Rostrum breve, rectum, apice conicum:
Caput ornatum corollâ plumis, Graminis radicum æmulis, conflatâ.

LXXXIV.

Le genre de l'Oiseau-royal.

Son caractere est d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes; trois devant, un derriere:
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes:
Le bec court, droit & conique vers le bout:
La tête ornée d'une hupe composée de plumes ressemblantes à des racines de Chiendent.

** 1. L'Oiseau-royal.

Voyez la femelle Pl. XLI.

Balearica cinereo-cœrulescens (*mas*) nigricans, ad viride vergens (*fœmina*); vertice splendidè nigro; capite ad latera nudo, candido, rubro adumbrato; tectricibus alarum albis; remigibus minoribus castaneis, majoribus, rectricibusque nigricantibus . . . . Balearica.

Grus Balearica. *Jonst. Avi. pag.* 116. *maris & fœminæ icones ab Aldrovando mutuatæ Tab.* 54.
Charlet. Exer. pag. 114. *N°.* 1. *hujus icon satis accurata (rostro excepto) pag.* 115.
Charlet. Onomazt. pag. 110. *N°.* 1.
Grus Balearica Plinii. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 361. *icones non satis accuratæ, maris pag.* 362, *& fœminæ pag.* 363.
Grus Balearica Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 201. *hujus icon satis accurata Tab. XLVIII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 95. *N°.* 3.
Sloane. Voy. of Jamaic. pag. 314. *N°. I.*
Grus Balearica vel Japonica. *Mus. Besl. pag.* 36. *N°.* 5. *capitis icon minùs accurata Tab. IX. N°.* 5.

Grus Balearia, Aldrovandi, Willughbeji. *Klein. Avi. pag.* 121. *N°.* 3.
Grus Capenſis fuſca, capite aureo galeato. *Petiv. Gaz. Nat. hujus icon peſſima Tab. LXXVI. fig.* 9.
Ciconia. *Moehr. Avi. Gen.* 83.
Ardea criſta ſetoſa erecta, temporibus palearibuſque binis nudis. Ardea pavonina. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 10. *Gen.* 76. *ſp.* 1.
Struthio ex China, Viſcher. *Klein.*
Pavo ex cinereo fuſcus, pappo deaurato coronatus. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. XII. ſp.* 4.
Pavo nigricans, brevicaudus, pappo rariori coronatus. *Barr. Ornith. Claſſ. IV. Gen. XII. ſp.* 5. (*fœmina*).
Pavo ſine cauda Chinenſis. *Jonſt. Avi. hujus icon ſatis accurata* (*exceptis capite & corollâ*) *Tab. XXI.*
Pavo Chinenſis ſine cauda. *Charlet. Exer. pag.* 80. *N°.* 3.
Charlet. Onomazt. pag. 72. *N°.* 3.
Pavo cauda brevi. *Linn. Syſth. Nat. ed.* 6. *Gen.* 65. *ſp.* 2.
Pavo marinus. *Cluſ. exot. Lib. V. cap. XI. pag.* 105, *in qua capitis icon minùs accurata.*
Oiſeau-royal. *Hiſt. de l'Acad. Tom. III. Part. III. pag.* 201; *avec une aſſez bonne figure Pl.* 28.
Grue panachée de l'Afrique. *Edwards. Tom. IV. pag. CXCII*; *avec des figures aſſez exactes du mâle & de la femelle Pl.* 192.
Paon. *Kolbe. Deſcrip. du C. de B. Eſp. Tom. III. pag.* 145; *avec une figure tirée de Jonſton pag.* 164. *N°.* 2.
Les Anglois l'appellent CROWNED AFRICAN CRANE. *Edwards.*

Il eſt à peu près de la groſſeur du *Héron hupé*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de deux pieds neuf pouces, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds huit pouces. Son bec depuis ſa pointe juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces ſix lignes de long; ſa queue cinq pouces; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quatre pouces ſix lignes; ſon pied huit pouces dix lignes; celui du milieu des trois doigts

Cum *Ardea criſtata* craſſitie circiter convenit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam duos pedes & novem pollices æquat; & ad extremos ungues tres pedes & octo pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & ſex lineas longum eſt; cauda quinque pollices; pars crurum plumis denudata quatuor pollices & ſex lineas; pes octo pollices & decem lineas; trium digitorum

rum anticorum medius cum ungue tres pollices & sex lineas, extimus duos pollices cum septem lineis, intimus duos pollices & quatuor lineas; posticus autem unum tantùm pollicem. Alis expansis, extremitates majorum remigum quinque pedum & sex pollicum intervallo distant, alæ verò complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes extenduntur. Capitis verticem, à syncipite versùs occipitium usque, cooperiunt pennæ tactu molliſſimæ, nigræ, holoserici villosi instar splendentes: nigredo autem utrinque ducitur, & ponè utramque genam strictam efficit tæniam, sub gutture protensam. Caput ad latera plumis denudatur, & cute solummodo obducitur candidâ, in utraque extremitate aliquo rubore adumbratâ. Sub gutture quædam extat membrana carnosa, rugosa, eleganti rubedine tincta: quæ in quibusdam individuis satis amplam obtinet crassitiem, dum est in aliis valdè exigua. Ab occipitio copiosus oritur fascis pennarum, Graminis radices satis benè referentium: quæ pennæ quatuor pollicum lon-

antérieurs, joint avec l'ongle, trois pouces six lignes, l'extérieur deux pouces sept lignes, l'intérieur deux pouces quatre lignes; & celui de derriere un pouce seulement. Il a cinq pieds six pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le sommet de la tête est couvert, depuis le synciput jusque vers l'occiput, de plumes très-douces au toucher & d'un noir de velours: cette couleur descend de chaque côté, & forme derriere chaque joue une bande assez étroite, qui s'étend jusque sous la gorge. Les côtés de la tête sont dégarnis de plumes, & couverts seulement d'une peau blanche, nuancée d'une légere teinte de rouge aux deux extrémités. Sous la gorge est une espece de membrane charnue, raboteuse & d'un beau rouge: cette membrane est assez considérablement grosse dans quelques individus, & fort petite dans d'autres. De l'occiput part un gros faisceau de plumes, qui ressemblent assez bien à des racines de Chiendent: elles ont jusqu'à quatre pouces de longueur, & forment une belle hupe. Chacune de ces plumes n'est autre chose qu'une tige

rouſſâtre, fort applatie, contournée en forme de viz, & garnie de quelques barbes très-clair-ſemées, leſquelles ſont blanches vers l'origine de la plume, & noires dans le reſte de ſa longueur. Le col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes, & les couvertures du deſſus & du deſſous de la queue ſont d'un cendré-bleuâtre dans le *mâle*, & d'un noirâtre tirant ſur le verd dans la *femelle*. Les plumes qui couvrent le col, ſurtout celles dont il eſt garni dans le bas de ſa partie inférieure, ſont très-longues, très-étroites, ſe terminent en pointe, & retombent ſur la poitrine : car quelques-unes ont juſqu'à ſept pouces de longueur. Toutes les couvertures du deſſous des aîles, ainſi que les petites du deſſus, ſont blanches : les grandes du deſſus les plus proches du corps ſont rouſſâtres : & les grandes les plus éloignées du corps ſont noirâtres. Les grandes plumes de l'aîle ſont de cette derniere couleur : les moyennes ſont de couleur de marron. De ces dernieres, les plus proches du corps ſont fort longues, & s'étendent, lorſque l'aîle eſt pliée, preſqu'auſſi loin que les plus grandes plu-

gitudinem obtinent, elegantemque criſtam efformant. Ex iſtis autem pennis quælibet ſcapo conſtat rufeſcente, valdè plano, ſpiræ in modum intorto, & quibuſdam pinnulis rariſſimis, versùs pennæ exortum candidis, in reliqua longitudine nigris, obſito. Collum, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, tectriceſque caudæ ſuperiores & inferiores in *mare* ex cinereo cœruleſcunt, in *fœmina* verò nigricant, & ad viride vergunt. Pennæ collum obtegentes, iſtæ præſertim quibus obſita eſt colli inferioris pars infima, ſunt longiſſimæ, ſtrictiſſimæ, in acumen deſinentes & pectori incumbentes : quædam enim ſeptem pollicum longitudine pollent. Tectrices alarum inferiores omnes, ſicut & ſuperiores minores, albent : ſuperiores majores corpori finitimæ rufeſcunt : majores à corpore remotiores nigricant. Remiges majores ſunt quoque nigricantes : minores caſtaneo imbutæ colore. Ex minoribus autem corpori viciniores maximam obtinent longitudinem, & dum ala complica-

Dessiné et Gravé par Marinet.

Oiseau-Royal, femelle.

tur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Duodecim rectricibus nigricantibus cauda conflatur. Oculorum irides eleganter cinereo-albæ. Rostrum griseo-fuscum. Pars crurum plumis denudata, pedesque cinereo-nigricantes; ungues verò penitùs nigricant. Habitat in *Africa* & *Balearibus Insulis*. *Ex museo Realmuriano.*

mes de l'aîle. La queue est composée de douze plumes noirâtres. L'iris des yeux est d'un joli gris-blanc. Le bec est d'un gris-brun. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un cendré-noirâtre; & les ongles noirâtres. On le trouve en *Afrique* & dans les *Isles Baléares*. *Du cabinet de M. de Reaumur.*

SECTIO XI.

Eæ quæ rostrum habent conico-incurvum.

HÆC sectio binis conflatur generibus Avium, alis à se invicem discrepantium. Aliæ enim alis donantur inermibus, ut *Cariama*: aliæ alis corniculis sive calcaribus binis in parte anteriore armatis præditæ sunt, ut *Anhima*.

Hujus novissimi generis Aves corniculum cylindraceum antrorsum arcuatum in fronte gerunt.

SECTION XI.

Ceux qui ont le bec en cone courbé.

IL y a dans cette section deux genres d'Oiseaux, qui se distinguent entr'eux par leurs aîles. Les uns ont les aîles sans armes, comme le *Cariama*: & les autres ont les aîles armées de deux especes de cornes ou d'éperons placés dans la partie antérieure, comme le *Kamichy*.

Les Oiseaux de ce dernier genre portent sur le front une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant.

LXXXV.

Le genre du Cariama. (1).

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone courbé :
Les aîles point armées.

(1) *Cariama*, nom que les *Braſiliens* donnent à l'eſpece de ce genre.

LXXXV.

Genus Cariamæ. (1).

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum conico-incurvum :
Alæ inermes.

(1) *Cariama*, nomen hujus generis ſpeciei à *Braſilienſibus* inditum.

1. Le Cariama.

Cariama criſtata, griſea, fuſco & rufeſcente varia; criſtâ nigrâ, cinereo variegatâ; remigibus majoribus, rectricibuſque fuſcis, griſeo & rufeſcente variegatis . . . . . Cariama.

Cariama. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 81, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Cariama Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 203, *in qua hujus icon non ſatis accurata.*
Jonſt. Avi. pag. 138. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 59.
Cariama Braſilienſibus Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. LI.*
Raj. Syn. Avi. pag. 96. *N°.* 6.
Les Braſiliens l'appellent Cariama. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.*

Il eſt à peu près de la grandeur du *Héron*. Son bec eſt court : ſes jambes & ſes pieds ſont fort longs, ainſi que ſes doigts ; il faut cependant en excepter celui de derriere, qui eſt court & placé plus haut que

Ardeam magnitudine circiter adæquat. Roſtrum habet breve : crura & pedes, ſicut & digitos, longiſſimos; attamen excipiendus eſt poſticus digitus, qui brevis eſt, & altiùs quàm in *Ardeis*

collocatus; ita ut, ambulando, tribus tantùm digitis anterioribus incedat. Crura sunt per mediam ipsarum longitudinem plumis denudata. Trium digitorum anticorum medius duobus digitis lateralibus coadunatur membranâ ad primum circiter articulum usque productâ. Alæ complicatæ ultra caudæ exortum non multùm protenduntur. In syncipite, immediatè supra rostri exortum, erigitur crista pennis conflata nigris, cinereo variis. Caput, guttur, collum, universumque corpus obtegunt pennæ griseæ, fusco & pauco rufescente variegatæ. Scapulares, quæ alas superne & infernè cooperiunt, tectricesque caudæ superiores & inferiores concolores. Alarum remiges majores tingit color fuscus, rufescente & griseo variegatus: minores eodem imbuuntur colore ac dorsum ipsum tingitur. Ex minoribus autem corpori viciniores maximâ longitudine pollent, & dum ala complicatur, majorum remigum extremitates ferè pertingunt. Caudam componunt rectrices fuscæ, griseo & rufescente variegatæ. Oculorum pupilla nigra: ipsorum

dans les *Hérons*; de façon qu'en marchant il ne s'appuye que sur les trois doigts de devant. Les jambes sont dégarnies de plumes dans la moitié de leur longueur. Celui du milieu des trois doigts antérieurs est réuni avec les deux latéraux par une membrane, qui s'étend environ jusqu'à la premiere articulation. Ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, ne s'étendent guères au-delà de l'origne de la queue. Sur le synciput, immédiatement au-dessus de l'origine du bec, s'éleve une hupe composée de plumes noires, variées de cendré. La tête, la gorge, le col & tout le corps sont couverts de plumes grises, variées de brun & d'un peu de roussâtre. Les plumes scapulaires, les couvertures du dessus & du dessous des aîles, & celles du dessus & du dessous de la queue sont de la même couleur. Les grandes plumes de l'aîle sont d'un brun varié de roussâtre & de gris: les moyennes sont de la même couleur que le dos. De ces dernieres, les plus proches du corps sont fort longues, & s'étendent, lorsque l'aîle est pliée, presqu'aussi loin que les plus grandes plumes de l'aîle. La queue est composée de plumes brunes, variées de gris & de

rouſſâtre. La prunelle des yeux eſt noire : leur iris eſt de couleur d'or. Le bec eſt d'un jaunâtre rembruni. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un jaune obſcur ; & les ongles bruns. On le trouve au *Bréſil.*

irides aureo colore imbutæ. Roſtrum ex flavicante fuſceſcit. Pars crurum plumis denudata, pedeſque ſunt obſcurè flavi ; ungues verò fuſci. Habitat in *Braſilia.*

LXXXVI.

Le Genre du Kamichy. (1).

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone courbé :
Une petite corne cylindrique & courbée en arc en-avant ſur le front :
Les aîles armées de deux eſpeces de cornes ou d'éperons dans la partie antérieure.

(1) *Kamichy*, nom que les habitans de *la Guiane* donnent à l'eſpece de ce genre.

LXXXVI.

Genus Anhimæ. (1).

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum conico-incurvum :
Corniculum cylindraceum antrorſum arcuatum in fronte :
Alæ corniculis ſive calcaribus binis in parte anteriore armatæ.

(1) *Anhima*, nomen hujus generis ſpeciei à *Braſilienſibus* inditum.

** 1. LE KAMICHY.

Anhima nigricans, albo variegata ; vertice ex albo & nigro vario ; collo infimo & pectore cinereo, albo & nigro variegatis ; ventre albo ; remigibus, rectricibuſque nigricantibus . . . . ANHIMA.

Anhima Braſilienſibus. *Marcgr. Hiſt. Br. pag.* 215, *in qua hujus icon ſatis accurata* (*roſtro excepto*).
Jonſt. Avi. pag. 147. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab.* 61.

Anhima Brasilienſium Marcgravii. *Willugh. Ornith. pag.* 202. *hujus icon à Marcgravio mutuata Tab. XLVII.*
Raj. Syn. Avi. pag. 96. *N°.* 7.
Anhyma. *Piſon. Hiſt. Nat. pag.* 91, *in qua hujus icon à Marcgravio mutuata.*
Aquila Americana, nigra, aquatica, maxima, cornuta. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. IV. Sp.* 4.
Aquila aquatica, cornuta. *Barr. Hiſt. Fr. Eq. pag.* 124.
Avis quædam ex rapacibus. *Jonſt. Avi. pag.* 125.
Palamedæa. *Moehr. Avi. Gen.* 111.
Bambiaya. *Joan. de Laët. Nov. orb. pag.* 13.
Cahuitahu. *Comdam. Voy. des Amazo. pag.* 174.
Les Habitans de la Guiane l'appellent KAMICHY. *Barr.*
Les Braſiliens, ANHIMA. *Marcgr. Jonſt. Willugh. Raj.* CAHUITAHU. *Comdam.*

Cignum craſſitie paululùm antecellit. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam tres pedes duos pollices & ſex lineas explet, & ad extremos ungues tres pedes & quatuor pollices. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque duos pollices & tres lineas longum eſt; cauda decem pollices; pars crurum plumis denudata duos pollices; pes quinque pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices & ſex lineas, extimus tres pollices cum ſex lineis, intimus tres pollices & quatuor lineas; poſticus autem unum pollicem cum decem lineis. Alis expanſis, extremitates majorum remigum quinque pedum & decem pollicum in-

Il eſt un peu plus gros qu'un *Cigne*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de trois pieds deux pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de trois pieds quatre pouces. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a deux pouces trois lignes de long; ſa queue dix pouces; la partie de ſes jambes, qui eſt dégarnie de plumes, deux pouces; ſon pied cinq pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, quatre pouces ſix lignes, l'extérieur trois pouces ſix lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes; & celui de derriere un pouce dix lignes. Il a cinq pieds dix pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'à la moitié de la longueur

de la queue. Sur le bord de chaque aîle, un peu au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, ſont deux eſpeces de cornes ou d'éperons, gros comme le bout du petit doigt, dont le ſupérieur eſt long d'un pouce, & l'inférieur de neuf lignes ſeulement : ils ont à peu près la figure d'une pyramide triangulaire, dont le ſommet eſt un peu obtus ; & ſont d'un gris-brun. La petite corne cylindrique qu'il porte ſur le front, a deux pouces trois lignes de longueur, environ deux lignes de diametre, & eſt blanchâtre. Le ſommet de la tête eſt varié de blanc & de noir. Le reſte de la tête, la partie du col qui en eſt la plus voiſine, & la gorge ſont noirâtres. La partie du col qui eſt la plus proche du corps, & la poitrine ſont variées de cendré, de blanc & de noir. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus & du deſſous des aîles, celles du deſſus de la queue, le haut des jambes & les côtés ſont noirâtres, & variés d'un peu de blanc. Le ventre eſt entiérement blanc, ainſi que les couvertures du deſſous de la queue. Le bord de l'aîle, au-deſſous du pli qui répond à celui du poignet, eſt varié de blanc-rouſſâtre. Les plumes de

tervallo diſtant ; alæ verò complicatæ ad mediam circiter caudæ longitudinem extenduntur. In utriuſque alæ margine, paulò infra articulum carpo humano reſpondentem, bina extant cornicula ſive calcaria, minimi digiti extremitatis craſſitie æmula, quorum ſuperius pollicis unius longitudinem æquat, inferius verò novem tantùm lineas longum eſt : quæ calcaria figuram pyramidalem triangularem, apice nonnihil obtuſo donatam, circiter æmulantur ; & griſeo-fuſco colore imbuuntur. Corniculum cylindraceum quod in fronte gerit, duos pollices & tres lineas longum eſt, ipſiuſque diameter binas circiter lineas æquat : candicante imbuitur colore. Summum caput albo & nigro variegatur. Reliquum caput, pars colli ipſi finitima, gutturque nigricant. Pars colli corpori vicinior & pectus cinereo, albo & nigro variegantur. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne & infernè cooperientes, ſuperiores caudæ tectrices, crurum ſuprema pars & latera nigricant, & pauco albo variegantur. Venter & inferio-

res

res caudæ tectrices penitùs albicant. Alarum margines, infra articulum carpo humano respondentem, sunt albo-rufescente variæ. Remiges nigricantes. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Palpebræ, oculorumque pupilla nigræ : ipsorum irides aureo colore imbutæ. Rostrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque fusci ; ungues verò nigricantes. Semper mas & fœmina junctim incedunt. E luto nidum construunt, illumque ad caudices arborum super terram ædificant. Habitant in *Brasilia* & *Guiana*. Una à *Cayana* in *museum Realmurianum* missa est à *D. Artur*.

l'aîle sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes de la même couleur. Les paupieres & la prunelle des yeux sont noires : leur iris est de couleur d'or. Le bec est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont bruns ; & les ongles noirâtres. On trouve toujours le mâle & la femelle ensemble. Ils construisent leur nid avec de la boue, & le placent par terre au pied des arbres. On les trouve au *Brésil* & dans *la Guiane*. *M. de Reaumur* en a reçu un de *Cayenne*, qui lui a été envoyé par *M. Artur*.

SECTIO XII.

Eæ quæ rostrum habent conicum, lateraliter compressum.

IN illa sectione unicum continetur genus, scilicet *Porphyrionis*.

Omnes hujus generis Aves calvitio in fronte donantur.

SECTION XII.

Ceux qui ont le bec en cone applati par les côtés.

CETTE section ne contient qu'un seul genre, sçavoir celui de la *Poule-sultane*.

Tous les Oiseaux de ce genre ont le front chauve.

LXXXVII.

Le genre de la Poule-Sultane.

Son caractere eſt d'avoir
Quatre doigts, dénués de membranes ; trois devant, un derriere :
La partie inférieure des jambes dénuée de plumes :
Le bec en cone applati par les côtés :
Le front chauve.

LXXXVII.

Genus Porphyrionis.

Hujus character eſt
Digiti quatuor, membranis deſtituti ; tres ſcilicet antici, poſticus unus :
Crura in parte inferiore plumis denudata :
Roſtrum conicum, lateraliter compreſſum :
Calvitium in fronte.

** 1. La Poule-Sultane.

Voyez Pl. XLII. Fig. 1.

Porphyrio ſuperne obſcurè viridis, infernè ſplendidè violaceus ; calvitio in fronte ſaturatè rubro ; capite & collo ſuperioribus ſplendidè violaceis ; genis, gutture & collo inferiore cœruleo-violaceis ; tectricibus caudæ inferioribus albis ; rectricibus obſcurè viridibus . . . . Porphyrio.

Porphyrio cœſius, pedibus & roſtro ſanguineis. *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXIV. ſp.* 3.

Porphyrio. *Geſn. Avi. pag.* 716. *hujus icon ſatis accurata (exceptis pedibus) pag.* 717.
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 437. *hujus icones minimè accuratæ pag.* 439 & 440.
Cluſ. Exot. Auctuar. pag. 370.
Willugh. Ornith. pag. 238.
Raj. Syn. Avi pag. 116. *N°.* 13.

Porphyrion. *Geſn. icon. Avi. pag.* 126, *in qua hujus icon ſatis accurata (exceptis pedibus).*
Jonſt. Avi. pag. 106. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab.* 52.
Charlet. Exer. pag. 110. *N°. VI.*
Charlet. Onomazt. pag. 104. *N°. VI.*

Rallus aquaticus, roſtro, fronte, pedibuſque rubris ; reliquo corpore cyaneo, ſub cauda plumis albis. *Klein. Avi. pag.* 104. *N°.* 6.

Fulica fronte calva, corpore violaceo, digitis simplicibus. Porphyrio. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 82. *sp.* 3.
Quachilton. *Eus. Nieremb. pag.* 217.
Quachilton, seu Avis siliquastrini capitis. *Fern. Hist. Nov. Hisp. pag.* 20. *cap. XXVI.*
Quachilto, seu Avis siliquastrini capitis. *Jonst. Avi. pag.* 127.
Quachilto, sive Porphyrio Americanus Nierembergii. *Willugh. Ornith. pag.* 238.
Quachilto, sive Porphyrio Americanus Hernandezii, Nierembergii. *Raj. Syn. Avi. pag.* 116. *N°.* 14.
Porphyrio. *Bel. Hist. Nat. desOis. pag.* 226.
Bel. Portr. d'Ois. pag. 52 *a*, *dans laquelle il y a une mauvaise figure.*
Oiseau pourpré ou Porphyrion. *Alb. Tom. III. pag.* 35; *avec une figure mauvaise & mal coloriée Pl.* 84.
Poule-Sultane. *Hist. de l'Acad. Tom III. Part. III. pag.* 51; *avec une figure assez exacte Pl.* 11.
Poule-Sultane ou Bluet. *Edwards. Tom. II. pag. LXXXVII*; *avec une figure exacte Pl.* 87.
Les Grecs l'appellent Πορφυρίων. *Bel. Aldrov.*
Les Espagnols, Telamon. *Gesn. Aldrov. Jonst.* Calamon. *Aldrov.*
Les Catalans, Porc Mari. *Barr.*
Les Allemands, Purpur-Vogel; Frembder-Vogel. *Gesn.*
Les Mexiquains, Quachilton. *Fern. & quelques-uns*, Yacacintli. *Nieremb. Fern. Jonst. Willugh.*

Cum *Gallina* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem unum pedem quinque pollices & tres lineas æquat, & ad extremos ungues unum pedem undecim pollices & lineas binas. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque unum pollicem & septem lineas longum est; cauda tres pollices & sex lineas; pars crurum plumis denudata unum pollicem cum septem lineis; pes tres polli-

Elle est à peu près de la grosseur d'une *Poule*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'un pied cinq pouces trois lignes, & jusqu'à celui des ongles d'un pied onze pouces deux lignes. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a un pouce sept lignes de long; sa queue trois pouces six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, un pouce sept lignes; son pied trois pouces cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec

l'ongle, quatre pouces cinq lignes, l'extérieur trois pouces ſept lignes, l'intérieur trois pouces quatre lignes & demie; & celui de derriere deux pouces trois lignes. Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a deux pieds quatre pouces ſix lignes de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec juſqu'au milieu du ſommet de la tête, eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un rouge foncé. Le reſte du deſſus de la tête & la partie ſupérieure du col ſont d'un violet brillant. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd ſombre, mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col ſont d'un bleu-violet. La poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un violet éclatant. Les couvertures du deſſous de la queue ſont blanches. Les petites du deſſous des aîles ſont d'un violet brillant: les grandes ſont d'un cendré-noirâtre. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un

ces & quinque lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue quatuor pollices cum quinque lineis, extimus tres pollices & ſeptem lineas, intimus tres pollices & quatuor cum ſemi lineas; poſticus autem duos pollices cum tribus lineis. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Alis expanſis, extremitates majorum remigum duorum pedum quatuor pollicum & ſex linearum intervallo diſtant; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons, ab exortu roſtri ad capitis medium verticem uſque, calva eſt, & membranâ craſſâ ſaturatè rubrâ obducitur. Reliquum caput ſuperius, collumque ſuperius ſunt ſplendidè violacea. Dorſum, uropygium, ſcapulares pennas & ſuperiores caudæ tectrices tingit color viridis obſcurus quidem, ſed ſplendens. Caput ad latera ſive genæ, guttur & pars colli inferior ſunt cœruleo-violaceæ. Pectus, venter, crurum ſuprema pars & latera violaceo imbuuntur ſplendido. Pennæ caudam ſubtus obtegentes albæ. Inferiores alarum tectrices mi-

nores splendidè violaceæ : majores cinereo-nigricantes. Superiores alarum minores, sicut & majores corpori viciniores, splendidè violaceæ : majores à corpore remotiores in latere exteriore & apice concolores, in latere interiore fusco-nigricantes : ex majoribus corpori finitimis quædam insuper eodem imbuuntur viridi ac dorsum ipsum tingitur. Alam componunt viginti tres remiges, omnes subtus cinereo-nigricantes ; superne verò septemdecim primores sunt in latere exteriore splendidè violaceæ, in interiore fusco-nigricantes : decima octava & decima nona concolores, sed exteriùs aliquâ viridis tincturâ adumbratæ : quatuor corpori finitimæ virides obscurè quidem, sed, dorsi instar, splendentes. Duodecim rectricibus valdè obscurè viridibus cauda conflatur. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil excedunt ; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Oculi sunt nigri : ipsorum irides fulvæ. Rostrum saturatè rubrum. Pars cruris violet éclatant : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : de plus quelques-unes des grandes les plus proches du corps sont du même verd que le dos. L'aîle est composée de vingt-trois plumes, toutes d'un cendré-noirâtre en-dessous ; mais en-dessus les dix-sept premieres sont d'un violet éclatant du côté extérieur, & d'un brun-noirâtre du côté intérieur : la dix-huitiéme & la dix-neuviéme sont de la même couleur ; mais leur côté extérieur est nuancé d'une légere teinte de verd : les quatre plus proches du corps sont d'un verd sombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd très-sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Les yeux sont noirs : & leur iris est fauve. Le bec est d'un rouge foncé. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont rouges. On la trouve dans les *Indes Orientales*, & en différens endroits

de l'*Amérique*, ſous la Zone torride. Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

rum plumis denudata, pedes, ungueſque rubri. Habitat in *India Orientali* & variis *Americæ* regionibus ſub Zona torrida poſitis. A *Cayana* in *muſeum Realmurianum* miſſus à *D. Artur.*

A. *La Poule-Sultane a teste noire.*

Porphyrio melanocephalos.

Poule ou Gallinula paluſtris. *Feuillée. Journ. des Obſ. phyſ. pag.* 288. (*ed.* 1725).

Elle eſt de la même grandeur & de la même groſſeur que la précédente. Elle lui reſſemble auſſi par ſa couleur; & n'en différe que parce qu'elle a la tête noire. On la trouve en *Amérique.*

Magnitudine & craſſitie præcedentem æmulatur. Cum illo colore quoque convenit; & ab eo non diſcrepat niſi capite nigro. Habitat in *America.*

** 2. La petite Poule-Sultane.

Voyez Pl. XLII. Fig. 2.

Porphyrio ſuperne obſcurè viridis, infernè ſplendidè violaceus; calvitio in fronte rubro; capite ſplendidè violaceo; collo ſuperiore viridi-cœruleo; tectricibus caudæ inferioribus albis; rectricibus obſcurè viridibus.... Porphyrio minor.

Elle eſt à peu près de la groſſeur de la *Barge.* Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces dix lignes, & juſqu'à celui des ongles de qua-

Craſſitie *Limoſam* circiter æquat. Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices & decem lineas explet, & ad extremos ungues qua-

tuordecim pollices & undecim lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque tredecim cum ſemi lineas longum eſt; cauda duos pollices & undecim lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum tribus lineis, intimus viginti quinque lineas; poſticus autem unum pollicem & ſeptem lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Ab extremo ad extremum alarum extenſarum diſtantia eſt unius pedis & ſeptem pollicum; alæ verò complicatæ caudam extremam attingunt. Frons, ab exortu roſtri ad capitis medium verticem uſque, calva eſt, & membranâ craſſiſſimâ rubrâ obducta. Reliquum caput, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, crurum ſuprema pars & latera ſplendido imbuuntur violaceo. Collum ſuperiùs & ad latera viride, ſplendidiſſimo cœruleo adumbratum. Dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices obſcurè quidem, ſed

torze pouces onze lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a treize lignes & demie de long; ſa queue deux pouces onze lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces trois lignes, l'intérieur deux pouces une ligne; & celui de derriere un pouce ſept lignes. Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a un pied ſept pouces de vol; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec juſqu'au milieu du ſommet de la tête, eſt chauve, & couvert d'une membrane rouge fort épaiſſe. Le reſte de la tête, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes & les côtés ſont d'un violet éclatant. La partie ſupérieure & les côtés du col ſont d'un verd nuancé de bleu fort brillant. Le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd ſombre, mais brillant. Les couvertures du deſſous de la

queue ſont blanches. Les petites du deſſous des aîles ſont d'un bleu-violet, nuancé de verd : les grandes ſont cendrées ; & dans quelques individus elles ſont bordées de blanchâtre par le bout. Les plus petites couvertures du deſſus des aîles ſont d'un verd-bleu : les moyennes, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont d'un verd ſombre, mais brillant ; les grandes les plus éloignées du corps ſont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & brunes du côté intérieur. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes, toutes cendrées en-deſſous ; mais en-deſſus les dix-huit premieres ſont d'un verd nuancé de bleu du côté extérieur, & brunes du côté intérieur : les cinq plus proches du corps ſont d'un verd ſombre, mais brillant, comme celui du dos. La queue eſt compoſée de douze plumes d'un verd ſombre. Les deux du milieu ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Le bec eſt rouge depuis ſon origine juſque vers les deux tiers de ſa longueur ; le reſte eſt jaune. La partie des jambes

ſplendidè virides. Pennæ caudam ſubtus obtegentes albæ. Tectrices alarum inferiores minores cœruleo-violaceæ, viridi adumbratæ : majores cinereæ, & in quibuſdam individuis candicante in apice marginatæ. Superiores alarum minimæ viridi-cœruleæ : mediæ, ſicut & majores corpori viciniores, obſcurè quidem, ſed ſplendidè virides : majores à corpore remotiores in latere exteriore & apice concolores, in latere interiore fuſcæ. Alam componunt viginti tres remiges, omnes ſubtus cinereæ ; ſuperne verò octodecim primores ſunt in latere exteriore virides, cœruleo adumbratæ, in interiore fuſcæ : quinque corpori finitimæ obſcurè virides ; ſed, dorſi inſtar, ſplendentes. Duodecim rectricibus obſcurè viridibus cauda conſtat. Binæ intermediæ lateralium longitudinem nonnihil antecellunt ; laterales verò gradatim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Roſtrum ab ipſius exortu ad duas circiter tertias longitudinis partes uſque rubrum, inde ad apicem luteum. Pars crurum plumis denudata ; pedes,

pedes, ungueſque rubri. Præcedentis inſtar, in *India Orientali* & *America* habitat. A *Cayana* in *muſeum Realmurianum* miſſus eſt à *D. Artur.*

qui eſt dégarnie de plumes, les pieds & les ongles ſont rouges. On la trouve, comme la précédente, dans les *Indes Orientales* & en *Amérique.* Elle a été envoyée de *Cayenne* à *M. de Reaumur* par *M. Artur.*

** 3. La Poule-Sultane verte.

Porphyrio ſuperne obſcurè viridis, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; rectricibus obſcurè viridibus . . . . Porphyrio viridis.

An Porphyrio olivarius, pedibus leucophæis? *Barr. Ornith. Claſſ. III. Gen. XXXIV. ſp. 7.*

Les Catalans l'appellent Rasclet. *Barr.*

Præcedenti paululùm craſſitie cedit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem undecim pollices & ſex lineas æquat, & ad extremos ungues quatuordecim pollices & novem lineas. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque unum pollicem & quinque lineas longum eſt; cauda duos pollices & novem lineas; pars crurum plumis denudata quindecim lineas; pes duos pollices; trium digitorum anticorum medius cum ungue duos pollices & novem lineas, extimus duos pollices cum quatuor lineis, intimus duos pollices & tres lineas; poſticus autem oc-

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi groſſe que la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt d'onze pouces ſix lignes, & juſqu'à celui des ongles de quatorze pouces neuf lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a un pouce cinq lignes de long; ſa queue deux pouces neuf lignes; la partie de ſes jambes qui eſt dégarnie de plumes, quinze lignes; ſon pied deux pouces; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, deux pouces neuf lignes, l'extérieur deux pouces quatre lignes, l'intérieur deux pouces trois lignes; & celui de derriere un pouce ſix lignes.

Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Elle a un pied ſix pouces de vol ; & ſes aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent juſqu'au bout de la queue. Le front, depuis l'origine du bec juſque vers le milieu du ſommet de la tête, eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un verd-jaunâtre. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont d'un verd ſombre, mais brillant. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue, celles du deſſous des aîles & les côtés ſont blancs. Les petites couvertures du deſſus des aîles, ainſi que les grandes les plus proches du corps, ſont du même verd que le dos : les grandes les plus éloignées du corps ſont de la même couleur du côté extérieur & à leur bout, & d'un cendré-brun du côté intérieur. L'aîle eſt compoſée de vingt-trois plumes, toutes cendrées en-deſſous ; mais en-deſſus les dix-huit premieres ſont d'un verd ſombre, mais brillant, du

todecim lineas. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Alis expanſis, extremitates majorum remigum unius pedis & ſex pollicum intervallo diſtant, alæ verò complicatæ extremitatem caudæ pertingunt. Frons, ab exortu roſtri ad capitis medium verticem uſque, calva eſt, & membranâ craſſâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput ſuperius, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares & ſuperiores caudæ tectrices ſunt obſcurè quidem, ſed ſplendidè virides. Caput ad latera ſive genæ, guttur, collum inferius, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars, inferiores caudæ tectrices & pennæ alas ſubtus obtegentes albent. Superiores alarum tectrices minores, ſicut & majores corpori finitimæ, eodem imbuuntur viridi ac dorſum ipſum tingitur : majores à corpore remotiores ſunt in latere exteriore & apice eodem colore imbutæ, interiùs verò cinereo-fuſcæ. Alam componunt viginti tres remiges, omnes ſubtus cinereæ ; ſuperne verò octodecim primores ſunt in la-

tere exteriore obscurè quidem, sed splendidè virides, in interiore cinereo-fuscæ: quinque corpori finitimæ in utroque latere eodem viridi imbutæ ac dorsum ipsum tingitur. Caudam componunt duodecim rectrices obscurè virides. Binæ intermediæ lateralium longitudinem paululùm excedunt; laterales autem sensim atque sensim longitudine minuuntur ad utrinque extimam usque breviorem. Rostrum ex viridi flavicat. Pars crurum plumis denudata, pedesque griseo-flavescentes; ungues verò grisei. Habitat in *India Orientali*, unde in *museum Realmurianum* missus à *D. Bourgine.*

côté extérieur, & d'un cendré-brun du côté intérieur : les cinq plus proches du corps sont des deux côtés du même verd que le dos. La queue est composée de douze plumes d'un verd sombre. Les deux du milieu sont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés jusqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui est la plus courte. Le bec est d'un verd-jaunâtre. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes & les pieds sont d'un gris-jaunâtre; & les ongles gris. On la trouve dans les *Indes Orientales*, d'où elle a été envoyée à *M. de Reaumur* par *M. Bourgine.*

4. La Poule-Sultane brune.

Porphyrio superne fuscus, infernè albus; calvitio in fronte viridi-flavicante; genis candidis; rectricibus fuscis . . . .
Porphyrio fuscus.

Glottis. *Gesn. icon. Avi. pag.* 105, *in qua hujus icon pessima.*
Gallinulæ aquaticæ secundum genus, quod Glutt nominant, quasi Glottidem. *Gesn. Avi. pag.* 505, *in qua eadem icon.*
Gallinula Chloropos Ornithologi, quam apud Germanos Glutt, quasi Glottidem vocari ait. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 452, *in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*
Gallinula Chloropus tertia. *Jonst. Avi. pag.* 110.
Porphyrio olivarius, pedibus & rostro viridibus. *Barr. Ornith. Class. III. Gen. XXXIV. sp.* 1.
Les Catalans l'appellent Gallina sega; Pulla d'Aigua. *Barr.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, Glutt. *Gesn. Aldrov. Jonst.*

Elle eſt à peu près de la groſſeur & de la grandeur de la précédente. Son front eſt chauve, & couvert d'une membrane épaiſſe d'un verd-jaunâtre. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes. Les ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs. Les couvertures du deſſus des aîles ſont brunes, & variées à leur extrémité d'un peu de blanc. Les plumes de l'aîle ſont entiérement brunes. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur. Le bec eſt noir. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. Tous les doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne* ſur les bords des lacs & des étangs.

Magnitudine & craſſitie præcedentem circiter æquat. Frons ipſius calva eſt, & membranâ craſſâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput ſuperius, partem colli ſuperiorem, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ fuſcæ. Scapulares & ſuperiores caudæ tectrices concolores. Caput ad latera ſive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & pennæ caudam ſubtus obtegentes albicant. Superiores alarum tectrices ſunt fuſcæ, pauco albo in extremitate variegatæ. Remiges penitùs fuſcæ. Duodecim rectricibus concoloribus cauda conflatur. Roſtrum nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedeſque viridi-flavicantes; ungues verò griſei. Omnes digiti ſunt à ſe invicem ad exortum uſque directi. Habitat in *Germania*, ibique lacuum & piſcinarum ripas frequentat.

5. La Poule-Sultane roussatre.

Porphyrio superne fuscus, marginibus pennarum rufescentibus, infernè rufescens; calvitio in fronte viridi-flavicante; rectricibus fuscis, exteriùs & apice rufescente marginatis.... Porphyrio rufescens.

Gallinula terrestris. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 495, *in qua hujus icon à Gesnero mutuata.*
Jonst. Avi. pag. 111. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab.* 31.
Gallinula terrestris Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Gallinula terrestris, quæ vulgò Germanis Hegeschara dicitur. *Gesn. Avi. pag.* 496. *hujus icon non satis accurata pag.* 497.
Trochilus terrestris, vel Rallus terrenus. *Gesn. icon. Avi. pag.* 68, *in qua eadem icon.*
Les Italiens aux environs du Lac Majeur l'appellent Polle. *Gesn. Aldrov. Jonst. Willugh.*
Les Allemands, Heggeschaer *ou* Heggschaer; Eggenschaer. *Gesn.* Heggeschar; Hegesar; Eggenschar. *Aldrov. Willugh. & quelques-uns*, Grosz Wasser Heunle. *Gesn.* Grosse Wasser Hunle. *Aldrov. Willugh.*

Præcedentes magnitudine & crassitie circiter æmulatur. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ viridi-flavicante obducta. Reliquum caput, collum superius, dorsum & uropygium pennis vestiuntur fuscis, rufescente marginatis. Scapulares, alas superne cooperientes & superiores caudæ tectrices concolores. Guttur, partem colli inferiorem, pectus, ventrem, latera, crurum partem supremam, inferioresque caudæ tectrices tingit color rufes-

Elle est à peu près de la grosseur & de la grandeur des précédentes. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un verd jaunâtre. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos & le croupion sont couverts de plumes brunes, bordées de roussâtre. Les scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont de la même couleur. La gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, les côtés, le haut des jambes & les couvertures du dessous de la

queue ſont rouſſâtres. Les plumes de l'aîle ſont brunes, & bordées extérieurement de rouſſâtre. La queue eſt compoſée de douze plumes brunes, bordées pareillement de rouſſâtre extérieurement & par le bout. Le bec, la partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, & les pieds ſont d'un verd-jaunâtre; & les ongles gris. Tous les doigts, qui ſont extrêmement longs, ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

cens. Alarum remiges ſunt fuſcæ, exteriùs rufeſcente fimbriatæ. Cauda duodecim conſtat rectricibus fuſcis, rufeſcente ſimiliter in latere exteriore & inſuper apice marginatis. Roſtrum, pars crurum plumis denudata, pedeſque ex viridi flavicant; ungues verò ſunt griſei. Digiti omnes, qui quidem longiſſimi, ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Habitat in *Germania*.

6. La Poule-Sultane rousse.

Porphyrio ſuperne rufus, maculis nigricantibus varius, infernè albus; calvitio in fronte pallidè flavo; palpebris croceis; pennis baſim roſtri ambientibus, & genis candidis; rectricibus rufis, nigricante maculatis . . . . Porphyrio rufus.

Ochropus magnus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 103, *in qua hujus icon peſſima.*
Gallinulæ aquaticæ quartum genus, Schmirring dictum, nobis Ochropus magnus. *Geſn. Avi. pag.* 507, *in qua eadem icon.*
Gallinula Ochropus major. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 461. *hujus icon à Geſnero mutuata pag.* 462.
Jonſt. Avi. pag. 110.
Gallinula Ochropus major Geſnero, Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 236.
Raj. Syn. Avi. pag. 115. *N°.* 6.
Gallinula aquatica Ornithologis; Trochilus junio; aliis Glareola. *Rzac. Hiſt. nat. Pol. pag.* 281.
Gallinula aquatica quarta Geſneri; Ochropus magnus ejuſdem; Glareola tertia Schwenckfeldii. *Rzac. Auct. Hiſt. nat. Pol. pag.* 380.
Glareola tertia. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 281.
Glareola tertia Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 2.
Les Allemands l'appellent Wasser-hun. *Rzac.* Geel-feussel. *Schwenck.*

Les Allemands aux environs de Strasbourg, SCHMIRRING. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh. Rzac.*

Les Polonois, KOKOSZKA WODNA. *Rzac.*

Præcedenti multùm crassitie cedit. Frons ipsius calva est, & membranâ crassâ pallidè luteâ obducta. Reliquum caput superius, collum, dorsum, uropygium, pennæ scapulares & superiores caudæ tectrices sunt rufæ, maculis nigricantibus variæ. Pennæ basim rostri ambientes, caput ad latera sive genæ, guttur, pectus, venter, latera, crurum suprema pars & pennæ caudam subtus obtegentes albent. Superiores alarum tectrices minores sunt rufæ, maculis nigricantibus, pauco cinereofusco admixto, variegatæ, & rubricæ fabrilis colore in apice fimbriatæ : majores à corpore remotiores concolores : majores corpori finitimæ candidæ. Remiges alarum nigræ. Caudam componunt duodecim rectrices rufæ, nigricante maculatæ. Palpebræ sunt croceo colore imbutæ. Rostrum ab ipsius exortu versùs duas tertias longitudinis partes usque pallidè luteum, in reliqua longitudine nigrum. Pars crurum plumis denudata, pedesque pallidè lutei ; un-

Elle est beaucoup plus petite que la précédente. Son front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune pâle. Le reste du dessus de la tête, le col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires & les couvertures du dessus de la queue sont d'un roux varié de taches noirâtres. Les plumes qui entourent la base du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont blancs. Les petites couvertures du dessus des aîles sont rousses, variées de taches noirâtres & d'un peu de cendré-brun, & bordées d'un rouge de brique par le bout : les grandes les plus éloignées du corps sont de la même couleur : les grandes les plus proches du corps sont blanches. Les plumes de l'aîle sont noires. La queue est composée de douze plumes rousses, tachetées de noirâtre. Les paupieres sont de couleur de safran. Le bec est d'un jaune pâle depuis son origine jusque vers les deux tiers de sa longueur ; le reste est noir. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, & les pieds sont d'un

jaune pâle ; & les ongles noirâtres. Tout ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. On la trouve en *Allemagne*.

gues verò nigricantes. Digiti omnes sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Habitat in *Germania*.

7. La Poule-Sultane mouchetée.

Porphyrio superne fusco-rufescens, maculis partim nigris partim candidis aspersus, infernè fuscus, calvitio in fronte obscurè flavo ; pennis basim rostri ambientibus, genis, gutture & collo inferiore albis ; rectricibus binis intermediis nigris, albo terminatis, lateralibus fuscis . . . . . PORPHYRIO PUNCTULATUS.

Glareola nona. *Schwenck. Avi. Sil. pag.* 284.
Glareola nona Schwenckfeldii. *Klein. Avi. pag.* 101. *N°.* 8.
Erythra. *Gesn. icon. Avi. pag.* 108, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Erythra, quam Germani Mattkern dicunt. *Aldrov. Avi. Tom. III. pag.* 466. *hujus icon à Gesnero mutuata pag.* 467.
Gallinulæ aquaticæ nonum genus quod Erythram nuncupo : vulgus Mattkern. *Gesn. Avi. pag.* 512, *in qua hujus icon non satis accurata.*
Gallinula Erythra. *Jonst. Avi. pag.* 110. *hujus icon à Gesnero mutuata Tab.* 31.
Gallinula Erythra Gesneri, quam Germani Matkern vocant. *Raj. Syn. Avi. pag.* 109. *N°.* 10.
Gallinula novalis minor. *Rzac. Hist. nat. Pol. pag.* 281.
Matkneltzell Leonardi Baltneri. *Willugh. Ornith. pag.* 226. *hujus icon minimè accurata Tab. LVI.*
Cenchramus nonnullis. *Schwenck.*
Les Allemands l'appellent Rein-Vogel. *Gesn. Aldrov.* Brach-Vogel. *Rzac.* Klein Brach-Vogel. *Schwenck.*
Les Allemands aux environs de Strasbourg, Mattkern. *Gesn. Aldrov. Schwenck. Willugh.*
Les Polonois, Siewniczka ; Siewka ; Sieyka. *Rzac.*

Elle est à peu près de la grosseur du *Râle de Genet*. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'onze pouces. La partie de ses jambes qui est dégarnie de plu-

Cum *Rallo Genistarum* crassitie circiter convenit. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudam extremam undecim pollices æquat. Pars crurum plumis denudata, pedesque,

pedesque, simul commensurati, septem pollicum longitudinem obtinent. Digiti, qui longiusculi, sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Frons calva est, & membranâ crassâ obscurè flavâ obducta. Reliquum caput, pars colli superior, dorsum, uropygium, pennæ scapulares, quæ alas superne vestiunt, superioresque caudæ tectrices sunt fusco-rufescentes: qui color in dorso & alis maculis partim nigris partim candidis aspergitur. Pennæ basin rostri ambientes, caput ad latera sive genæ, guttur & collum inferius albicant. Pectus, venter, latera, crurum suprema pars, inferioresque caudæ tectrices fusco tinguntur colore. Remiges alarum majores sunt nigræ: minores nigricantes. Duodecim rectricibus cauda conflatur: binæ intermediæ nigræ, albo terminatæ: laterales omnes fuscæ. Rostrum obscurè flavum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueque grisei. Habitat in *Germania*, ibique paludes frequentat.

mes, & les pieds, joints ensemble, ont sept pouces de long. Ses doigts, qui sont assez longs, sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Le front est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune obscur. Le reste de la tête, la partie supérieure du col, le dos, le croupion, les plumes scapulaires, les couvertures du dessus des aîles & celles du dessus de la queue sont d'un brun-roussâtre: cette couleur est variée sur le dos & les aîles de taches en partie noires & en partie blanches. Les plumes qui entourent la bâse du bec, les côtés de la tête ou les joues, la gorge & la partie inférieure du col sont d'un beau blanc. La poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du dessous de la queue & les côtés sont bruns. Les grandes plumes de l'aîle sont noires: les moyennes sont noirâtres. La queue est composée de douze plumes: les deux du milieu sont noires, & terminées de blanc: toutes les latérales sont brunes. Le bec est d'un jaune obscur. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont gris. On la trouve en *Allemagne*, où elle se tient dans les marais.

8. La Poule-Sultane tachetée.

Porphyrio ſuperne pennis in medio nigris, ad margines ſordidè rufis, albo fimbriatis, veſtitus, infernè rufeſcens, lateribus fuſco & albo tranſverſim ſtriatis; calvitio in fronte croceo; tæniâ utrinque ſupra oculos cinereo-albâ; gutture cinereo-cœruleſcente; collo inferiore & pectore maculis nigris aſperſis; marginibus alarum candidis; rectricibus fuſco-nigricantibus, rufo adumbratis, binis intermediis albo utrinque fimbriatis . . . . Porphyrio nævius.

Gallinulæ aquaticæ tertium genus, quod Deffyt nominatur vulgò, à nobis Poliopus. *Geſn. Avi. pag.* 506, *in qua hujus icon peſſima.*
Poliopus. *Geſn. icon. Avi. pag.* 104, *in qua eadem icon.*
Aldrov. Avi. Tom. III. pag. 465. *hujus icon minùs accurata pag.* 466.
Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Raj. Syn. Avi. pag.* 114. *N°.* 5.
Grinetta, Mediolani Gillerdine, Poliopus Gallinula minor Aldrovandi. *Willugh. Ornith. pag.* 235. *hujus icon ab Aldrovando mutuata Tab. LVIII.*
Petite Poule d'eau. *Alb. Tom. II. pag.* 47; *avec une figure mal coloriée. Pl.* 73.
Les Italiens l'appellent Grinetta. *Raj.*
Les Florentins, Tordo Gelsemino. *Willugh.*
Les Boulonnois, Porcellana. *Aldrov.*
Les habitans de Mantouë, Porzana; Scorzana. *Aldrov.*
Les Milanois, Gillerdine. *Willugh. Raj.* Grugnetto; *& ailleurs*, Girardella Columba. *Aldrov.*
Les Allemands, Deffyt. *Geſn. Aldrov.*
Les Anglois, Small Water-Hen. *Alb.*

Elle n'eſt pas tout-à-fait ſi groſſe que le *Râle d'eau*. Sa longueur depuis le bout du bec juſqu'à celui de la queue eſt de neuf pouces trois lignes; & juſqu'à celui des ongles de douze pouces trois lignes. Son bec depuis ſon bout juſqu'aux coins de la bouche a environ dix lignes de long; ſa queue un

Rallo aquatico nonnihil craſſitie cedit. Ipſius longitudo à roſtri apice ad caudæ extremitatem novem pollices & tres lineas æquat; & ad extremos ungues duodecim pollices cum tribus lineis. Roſtrum ab ipſius apice ad oris angulos uſque decem circiter lineas longum

est; cauda unum pollicem & decem lineas; pars crurum plumis denudata quinque lineas; pes quatuordecim lineas; trium digitorum anticorum medius cum ungue unum pollicem & quinque lineas : laterales paulò sunt breviores; posticus autem reliquis omnibus longitudine cedit. Omnes digiti sunt à se invicem ad exortum usque discreti. Alis expansis, extremitates majorum remigum quindecim pollicum intervallo distant; alæ verò complicatæ ad duas circiter tertias longitudinis caudæ partes extenduntur. Frons, ab exortu rostri ad capitis medium verticem usque, calva est, & membranâ crassâ croceo colore imbutâ obducta. Reliquum caput & partem colli superiorem obtegunt pennæ in medio nigræ, ad margines rufæ. Quæ dorsum cooperiunt, sicut & scapulares, sunt quoque in medio nigræ, ad margines sordidè rufæ, albo fimbriatæ. Quæ uropygium vestiunt, superioresque caudæ tectrices nigricantes, rufo marginatæ. In utroque capitis latere tænia extat cinereo-alba, prope rostri exortum orta, & supra oculos producta.

pouce dix lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, cinq lignes; son pied quatorze lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, un pouce cinq lignes : les latéraux sont un peu plus courts; & celui de derriere est le plus court de tous. Tous ses doigts sont entiérement séparés les uns des autres jusqu'à leur origine. Elle a quinze pouces de vol; & ses aîles, lorsqu'elles sont pliées, s'étendent environ jusqu'aux deux tiers de la longueur de la queue. Le front, depuis l'origine du bec jusque vers le milieu du sommet de la tête, est chauve, & couvert d'une membrane épaisse d'un jaune de safran. Le reste de la tête & le dessus du col sont couverts de plumes noires dans leur milieu, & rousses sur leurs bords. Celles qui couvrent le dos, ainsi que les scapulaires, sont pareillement noires dans leur milieu, ensuite d'un roux sale, & bordées de blanc. Celles qui couvrent le croupion, & les couvertures du dessus de la queue sont noirâtres, & bordées de roux. De chaque côté de la tête est une bande d'un gris-blanc, qui part d'auprès de l'origine du bec, & s'étend au dessus des yeux.

La gorge eſt d'un cendré-bleuâtre. La partie inférieure du col & la poitrine ſont d'un cendré tirant ſur l'olivâtre, tout parſemé de taches noires. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont rouſſâtres. Les côtés ſont rayés tranſverſalement de brun & de blanc. Le bord de l'aîle, depuis ſon origine juſqu'à ſon extrémité, eſt blanc. Les couvertures du deſſus des aîles ſont rouſſes, & variées de bandes blanches tranſverſales & en zigzags. Les plumes de l'aîle ſont d'un brun-noirâtre, nuancé de roux : la premiere eſt bordée extérieurement de blanc. La queue eſt compoſée de douze plumes de la même couleur que celles des aîles, les deux du milieu ſeulement étant bordées de blanc des deux côtés. Ces deux dernieres ſont un peu plus longues que les latérales, qui vont toutes en diminuant de longueur par degrés juſqu'à la plus extérieure de chaque côté, qui eſt la plus courte. Les yeux ſont petits : leur iris eſt d'un verd-jaunâtre. Le bec eſt de la même couleur, laquelle s'obſcurcit un peu à l'origine & à l'extrémité du demi-bec ſupérieur. La partie des jambes qui eſt dégarnie de plumes, les

Guttur ex cinereo cœruleſcit. Pars colli inferior & pectus ex cinereo ad olivaceum vergunt, & maculis aſperguntur nigris. Venter, crurum ſuprema pars, inferioreſque caudæ tectrices ſunt rufeſcentes. Latera fuſco & albo tranſverſim ſtriata. Alarum margines ab ipſarum exortu ad extremitatem uſque candidæ. Superiores alarum tectrices rufæ, tæniis tranſverſis & undatis albis variegatæ. Remiges fuſco nigricantes, rufo adumbratæ : ex iſtis autem prior exteriùs albo marginatur. Caudam componunt duodecim rectrices remigibus concolores, binis tantummodo intermediis albo in utroque latere fimbriatis. Quæ binæ noviſſimè dictæ lateralium longitudinem paululùm excedunt ; laterales verò ſenſim atque ſenſim longitudine minuuntur ad utrinque extimam uſque breviorem. Oculi exigui : ipſorum irides viridi-flavicantes. Roſtrum quoque viridi - flavicans, obſcuriùs tamen in exortu & apice mandibulæ ſuperioris. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque ſordidè virides. Juxta fluviorum & piſcinarum ripas verſatur,

& paludes frequentat.

pieds & les ongles sont d'un verd sale. On la trouve sur le bords des rivieres & des étangs, & dans les marais.

9. La Poule-Sultane de la Baye de Hudson.

Porphyrio superne fuscus, pennis in medio obscurioribus, infernè albo-rufescens, lateribus nigro transversim striatis; calvitio in fronte luteo; pennis basim rostri ambientibus, & gutture nigris; genis, collo inferiore & pectore cinereo-cœrulescentibus; marginibus alarum candidis; rectricibus saturatè fuscis, exteriùs fusco dilutiore marginatis . . . . Porphyrio Freti Hudsonis.

Rallus grisea, fronte nigra, pectore plumbeo, rostro flavo, pedibus virescentibus. Rallus Carolinus. *Linn. Syst. Nat. ed.* 10. *Gen.* 83. *sp.* 5.

Petite Foulque d'eau de l'Amérique. *Edwards. Tom. III. pag. CXLIV; avec une figure exacte Pl.* 144.

Les Anglois l'appellent Little American Water Hen. *Edwards.*

Præcedentem crassitie circiter æmulatur. Ipsius longitudo ab apice rostri ad caudæ extremitatem octo circiter pollices explet, & ad extremos ungues decem pollices. Rostrum ab ipsius apice ad oris angulos usque undecim lineas longum est; cauda sesquipollicem; pars crurum plumis denudata sex cum semi lineas; pes unum pollicem cum quinque lineis; trium digitorum anticorum medius cum ungue eamdem obtinet longitudinem; extimus quatuordecim

Elle est à peu près de la grosseur de la précédente. Sa longueur depuis le bout du bec jusqu'à celui de la queue est d'environ huit pouces, & jusqu'à celui des ongles de dix pouces. Son bec depuis son bout jusqu'aux coins de la bouche a onze lignes de long; sa queue un pouce six lignes; la partie de ses jambes qui est dégarnie de plumes, six lignes & demie; son pied un pouce cinq lignes; celui du milieu des trois doigts antérieurs, joint avec l'ongle, a aussi un pouce cinq lignes de longueur; l'extérieur quatorze

lignes, l'intérieur treize lignes; & celui de derriere ſept lignes & demie. Tous ſes doigts ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Ses aîles, lorſqu'elles ſont pliées, s'étendent environ juſqu'aux trois quarts de la longueur de la queue. Le front eſt chauve, & couvert d'une membrane jaune fort épaiſſe. Les parties ſupérieures de la tête & du col, le dos & le croupion ſont couverts de plumes brunes, dont le milieu eſt d'une couleur un peu plus obſcure. Les ſcapulaires & les couvertures du deſſus de la queue ſont de la même couleur. Les plumes qui entourent la bâſe du bec, & la gorge ſont noires : cette couleur s'étend un peu ſur la partie inférieure du col. Les côtés de la tête ou les joues, la partie inférieure & les côtés du col, & la poitrine ſont d'un cendré-bleuâtre. Le ventre, le haut des jambes & les couvertures du deſſous de la queue ſont d'un blanc-rouſsâtre. Les côtés ſont de la même couleur, & rayés tranſverſalement de noir. Les couvertures du deſſous des aîles ſont blanches, & marquées de rayes tranſverſales brunâtres peu apparentes. Le bord de l'aîle, depuis ſon origine juſqu'à ſon extrémité, eſt blanc. Les petites

lineas longus, intimus tredecim lineas; poſticus autem ſeptem cum ſemi lineas. Digiti omnes ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Alæ complicatæ ad tres circiter quartas longitudinis caudæ partes uſque protenduntur. Frons calva eſt, membranâque craſſâ luteâ obducta. Partes capitis & colli ſuperiores, dorſum & uropygium veſtiunt pennæ fuſcæ, in medio obſcuriore colore imbutæ. Scapulares, ſuperioreſque caudæ tectrices concolores. Pennæ baſim roſtri ambientes, ſicut & guttur, nigræ ſunt : quæ nigredo in collo inferiore paululùm protenditur. Caput ad latera ſive genæ, collum inferiùs & ad latera, pectuſque ex cinereo cœruleſcunt. Venter, crurum ſuprema pars & pennæ caudam ſubtus obtegentes ex albo rufeſcunt. Latera eodem colore tinguntur, nigroque tranſverſim ſunt ſtriata. Inferiores alarum tectrices albicant, tæniiſque tranſverſis fuſceſcentibus parùm conſpicuis inſigniuntur. Alarum margines ab ipſarum exortu ad extremitatem uſque candidæ. Tectrices alarum ſuperiores minores rufeſcentes : majores

scapularibus concolores. Ex majoribus autem, quæ medium locum occupant, exteriùs candicante marginantur. Remiges sunt saturatè fuscæ, oris exterioribus fusco dilutiore imbutis : in illis tamen quæ medium locum tenent, oræ exteriores sunt candicantes. Caudam componunt duodecim rectrices saturatè fuscæ, exteriùs fusco dilutiore marginatæ. Rostrum luteum. Pars crurum plumis denudata, pedes, ungueſque virideſcentes. Habitat in *Freto Hudſonis*.

couvertures du dessus des aîles sont roussâtres : les grandes sont de la même couleur que les scapulaires. Parmi ces dernieres, celles qui occupent le milieu, sont bordées extérieurement de blanchâtre. Les plumes de l'aîle sont d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair : il faut cependant en excepter celles qui occupent le milieu, qui sont bordées extérieurement de blanchâtre. La queue est composée de douze plumes d'un brun foncé, & bordées extérieurement de brun plus clair. Le bec est jaune. La partie des jambes qui est dégarnie de plumes, les pieds & les ongles sont verdâtres. On la trouve à la *Baye de Hudſon*.

10. La Poule-Sultane de Madrast.

Porphyrio ſuperne cinereus, infernè albus; calvitio in fronte & genis candidis; collo inferiore & pectore maculis lunulatis nigris aſperſis; rectricibus cinereis .... Porphyrio Maderaspatanus.

Crex Indica ex albo cinerea, nigroque mixta. *Raj. Syn. Avi. pag.* 194. *N°. 6. hujus icon peſſima Tab. I. fig.* 4.
Les Anglois l'appellent Maderas Rail-Hen. *Raj.*
Les Habitans de Malabar, Caunangoly. *Raj.*
Les Gentils, Boollu Cory. *Raj.*

Magnitudine *Anatem* circiter æquat. Caudam habet breviſſimam; roſtrum & digitos longiuſculos. Digiti au-

Elle est à peu près de la grandeur d'un *Canard*. Sa queue est fort courte. Son bec & ses doigts sont assez longs. Ces

derniers ſont entiérement ſéparés les uns des autres juſqu'à leur origine. Son front eſt chauve, & couvert d'une membrane blanche fort épaiſſe. Le reſte du deſſus de la tête, la partie ſupérieure du col, le dos, le croupion, les plumes ſcapulaires, les couvertures du deſſus des aîles & celles du deſſus de la queue ſont d'un joli cendré. Les côtés de la tête ou les joues, la gorge, la partie inférieure du col, la poitrine, le ventre, le haut des jambes, les couvertures du deſſous de la queue & les côtés ſont blancs : cette couleur eſt variée à la partie inférieure du col & ſur la poitrine de taches noires en forme de croiſſant. Les plumes de l'aîle ſont cendrées, & bordées extérieurement de noir. La queue eſt compoſée de douze plumes cendrées. J'ignore la couleur du bec & des pieds. On la trouve aux environs de *Madraſt*.

tem ſunt à ſe invicem ad exortum uſque diſcreti. Frons calva eſt, membranâque craſſiſſimâ candidâ obducta. Reliquum caput ſuperius, pars colli ſuperior, dorſum, uropygium, pennæ ſcapulares, alas ſuperne cooperientes, ſuperioreſque caudæ tectrices eleganti cinereo tinguntur. Caput ad latera ſive genæ, guttur, pars colli inferior, pectus, venter, latera, crurum ſuprema pars & inferiores caudæ tectrices albent: in collo inferiore autem & pectore albedinem variegant maculæ lunulatæ nigræ. Remiges alarum cinereæ, exteriùs nigro fimbriatæ. Duodecim rectricibus cinereis cauda conſtat. Cujus coloris ſint roſtrum, pedeſque, penitùs me latet. Circa *Maderaſpatanum* habitat.

Fin du Tome cinquiéme.

Fig. 1.

Fig. 2.

1 2 3 4 5 6

Echelle de 6. pouces.

Dessiné et Gravé par Martinet.

1. Poule-Sultane.

2. Petite Poule-Sultane.

INDEX

Avium in quinto volumine contentarum, ſecundùm ordinem in quo diſponuntur.

TABLE

Des Oiſeaux contenus dans le cinquiéme volume, ſelon l'ordre dans lequel ils ſont rangés.

ORDO XV.

SECTIO I.

LXII. *Genus Struthionis.*

1. STruthio.

ORDRE XV.

SECTION I.

LXII. *Genre de l'Autruche.*

1. L'Autruche.

SECTIO II.

LXIII. *Genus Rheæ.*

1. Rhea.

LXIV. *Genus Ceſuarii.*

1. Caſuarius.

SECTION II.

LXIII. *Genre du Thouyou.*

1. Le Thouyou.

LXIV. *Genre du Caſoar.*

1. Le Caſoar.

SECTIO III.

LXV. *Genus Raphi.*

1. Raphus.

SECTION III.

LXV. *Genre du Dronte.*

1. Le Dronte.

ORDO XVI.

SECTIO I.

LXVI. *Genus Otidis.*

1. Otis.
2. Otis minor, Anas campeſtris vulgò dicta.
3. Otis Arabica.

ORDRE XVI.

SECTION I.

LXVI. *Genre de l'Outarde.*

1. L'Outarde.
2. La petite Outarde, appellée vulgairement Cannepetiere.
3. L'Outarde d'Arabie.

SECTION II.

LXVII. *Genre de l'Echaſſe.*

1. L'Echaſſe.
2. L'Echaſſe du Mexique.

LXVIII. *Genre de l'Huitrier.*

1. L'Huitrier, appellé vulgairement Pie de Mer.

SECTION III.

LXIX. *Genre du Pluvier.*

1. Le Pluvier doré.
2. Le petit Pluvier doré.
3. Le Pluvier doré de S. Domingue.
4. Le Pluvier doré de la Baye de Hudſon.
5. Le petit Pluvier ou le Guignard.
6. Le Guignard d'Angleterre.
7. Le Pluvier à collier.
8. Le petit Pluvier à collier.
9. Le Pluvier à collier de Virginie.
10. Le Pluvier à collier de S. Domingue.
11. Le Pluvier à collier de la Jamaïque.
12. Le grand Pluvier, appellé vulgairement Courly de terre.
13. Le grand Pluvier de Bengale.
14. Le Pluvier hupé de Perſe.
15. Le Pluvier armé du Sénégal.

SECTIO II.

LXVII. *Genus Himantopi.*

1. Himantopus.
2. Himantopus Mexicanus.

LXVIII. *Genus Oſtralegæ.*

1. Oſtralega, Pica marina vulgò dicta.

SECTIO III.

LXIX. *Genus Pluvialis.*

1. Pluvialis aurea.
2. Pluvialis aurea minor.
3. Pluvialis Dominicenſis aurea.
4. Pluvialis aurea Freti Hudſonis.
5. Pluvialis minor ſive Morinellus.
6. Morinellus Anglicanus.
7. Pluvialis torquata.
8. Pluvialis torquata minor.
9. Pluvialis Virginiana torquata.
10. Pluvialis Dominicenſis torquata.
11. Pluvialis Jamaicenſis torquata.
12. Pluvialis major, Oedicnemus vulgò dicta.
13. Pluvialis Bengalenſis major.
14. Pluvialis Perſica criſtata.
15. Pluvialis Senegalenſis armata.

ORDO XVII.

SECTIO I.

LXX. *Genus Vanelli.*

1. Vanellus.
2. Vanellus griſeus.
3. Vanellus varius.
4. Vanellus Helveticus.
5. Vanellus Bononienſis major.
6. Vanellus Senegalenſis armatus.
7. Vanellus Ludovicianus armatus.
8. Vanellus Dominicenſis armatus.

LXXI. *Genus Jacanæ.*

1. Jacana.
2. Jacana armata.
3. Jacana armata nigra.
4. Jacana armata fuſca.
5. Jacana armata varia.

SECTIO II.

LXXII. *Genus Arenariæ.*

1. Arenaria.
2. Arenaria cinerea.

SECTIO III.

LXXIII. *Genus Glareolæ.*

1. Glareola.
2. Glareola torquata.
3. Glareola nævia.

ORDRE XVII.

SECTION I.

LXX. *Genre du Vanneau.*

1. Le Vanneau.
2. Le Vanneau gris.
3. Le Vanneau varié.
4. Le Vanneau de Suiſſe.
5. Le grand Vanneau de Bologne.
6. Le Vanneau armé du Sénégal.
7. Le Vanneau armé de la Louiſiane.
8. Le Vanneau armé de S. Domingue.

LXXI. *Genre du Jacana.*

1. Le Jacana.
2. Le Jacana armé ou le Chirurgien.
3. Le Chirurgien noir.
4. Le Chirurgien brun.
5. Le Chirurgien varié.

SECTION II.

LXXII. *Genre du Coulon-chaud.*

1. Le Coulon-chaud.
2. Le Coulon-chaud cendré.

SECTION III.

LXXIII. *Genre de la Perdrix-de-mer.*

1. La Perdrix-de-mer.
2. La Perdrix-de-mer à collier.
3. La Perdrix-de-mer tachetée.

4. La Perdrix-de-mer du Sénégal.

SECTION IV.

LXXIV. *Genre du Râle.*

1. Le Râle d'eau.
2. Le petit Râle d'eau ou la Maroüette.
3. Le Râle de Genet ou Roi de Cailles.
4. Le Râle des Philippines.
5. Le Râle rayé des Philippines.
6. Le Râle à collier des Philippines.
7. Le Râle brun des Philippines.
8. Le Râle de Virginie.

SECTION V.

LXXV. *Genre du Beccaſſeau.*

1. Le Beccaſſeau, appellé vulgairement Cul-blanc.
2. La Guignette.
3. Le Chevalier.
4. Le Chevalier rouge.
5. Le Chevalier rayé.
6. Le Chevalier tacheté.
7. Le Chevalier cendré.
8. Le Chevalier blanc.
9. Le Chevalier de Bengale.
10. L'Alouette-de-mer.
    A. *La petite Alouette-de-mer.*
11. L'Alouette-de-mer à collier.
12. L'Alouette-de-mer de S. Domingue.
13. La petite Alouette-de-mer de S. Domingue.
14. La Maubéche.
15. La Maubéche tachetée.

4. Glareola Senegalenſis.

SECTIO IV.

LXXIV. *Genus Ralli.*

1. Rallus aquaticus.
2. Rallus aquaticus minor ſive Maruetta.
3. Rallus Geniſtarum ſive Ortygometra.
4. Rallus Philippenſis.
5. Rallus Philippenſis ſtriatus.
6. Rallus Philippenſis torquatus.
7. Rallus Philippenſis fuſcus.
8. Rallus Virginianus.

SECTIO V.

LXXV. *Genus Tringæ.*

1. Tringa.
2. Guinetta.
3. Totanus.
4. Totanus ruber.
5. Totanus ſtriatus.
6. Totanus nævius.
7. Totanus cinereus.
8. Totanus candidus.
9. Totanus Bengalenſis.
10. Cinclus.
    A. *Cinclus minor.*
11. Cinclus torquatus.
12. Cinclus Dominicenſis.
13. Cinclus Dominicenſis minor.
14. Calidris.
15. Calidris nævia.

16. Calidris grisea.
17. Calidris grisea minor.
18. Pugnax.
19. Merula aquatica.
20. Turdus aquaticus.
21. Canutus.

16. La Maubéche grise.
17. La petite Maubéche grise.
18. Le Combattant ou Paon-de-mer.
19. Le Merle-d'eau.
20. La Grive-d'eau.
21. Le Canut.

LXXVI. *Genus Limosæ.*

1. Limosa.
2. Limosa grisea.
3. Limosa grisea major.
4. Limosa fusca.
5. Limosa rufa.
6. Limosa rufa major.
7. Limosa Americana rufa.
8. Limosa candida.

LXXVI. *Genre de la Barge.*

1. La Barge.
2. La Barge grise.
3. La grande Barge grise.
4. La Barge brune.
5. La Barge rousse.
6. La grande Barge rousse.
7. La Barge rousse d'Amérique.
8. La Barge blanche.

LXXVII. *Genus Scolopacis.*

1. Scolopax.
   A. *Scolopax candida.*
2. Gallinago.
3. Gallinago minor.
4. Gallinago Maderaspatana.
5. Gallinago Anglicana.

LXXVII. *Genre de la Beccasse.*

1. La Beccasse.
   A. *La Beccasse blanche.*
2. La Beccassine.
3. La petite Beccassine.
4. La Beccassine de Madrast.
5. La Beccassine d'Angleterre.

SECTIO VI.

SECTION VI.

LXXVIII. *Genus Numenii.*

1. Numenius.
   A. *Numenius candidus.*
2. Numenius minor.
3. Numenius Madagascariensis.
4. Numenius viridis.
5. Numenius castaneus.
6. Numenius Americanus fuscus.
7. Numenius Mexicanus varius.

LXXVIII. *Genre du Courly.*

1. Le Courly.
   A. *Le Courly blanc.*
2. Le petit Courly ou le Corlieu.
3. Le Courly de Madagascar.
4. Le Courly verd.
5. Le Courly marron.
6. Le Courly brun d'Amérique.
7. Le Courly varié du Mexique.

8. Le grand Courly d'Amérique.
9. Le petit Courly d'Amérique.
10. Le Courly blanc du Bréſil.
11. Le Courly brun du Bréſil.
12. Le Courly rouge du Bréſil.
13. L'Ibis.
14. L'Ibis blanc.

SECTION VII.

LXXIX. *Genre de la Spatule.*

1. La Spatule.
2. La Spatule couleur de roſe.
3. La Spatule rouge.

SECTION VIII.

LXXX. *Genre de la Cigogne.*

1. La Cigogne brune.
2. La Cigogne blanche.
3. La Cigogne d'Amérique.
4. La Cigogne du Bréſil.
5. La Cigogne de la Guiane.
6. La Grue.
7. La Grue des Indes Orientales.
8. La Grue du Mexique.
9. La Grue du Japon.
10. La Grue d'Amérique.
11. La Grue de la Baye de Hudſon.
12. La Grue de Numidie, appellée vulgairement Demoiſelle de Numidie.

LXXXI. *Genre du Héron.*

1. Le Héron.

8. Numenius Americanus major.
9. Numenius Americanus minor.
10. Numenius Braſilienſis candidus.
11. Numenius Braſilienſis fuſcus.
12. Numenius Braſilienſis coccineus.
13. Ibis.
14. Ibis candida.

SECTIO VII.

LXXIX. *Genus Plateæ.*

1. Platea.
2. Platea roſea.
3. Platea coccinea.

SECTIO VIII.

LXXX. *Genus Ciconiæ.*

1. Ciconia fuſca.
2. Ciconia alba.
3. Ciconia Americana.
4. Ciconia Braſilienſis.
5. Ciconia Guianenſis.
6. Grus.
7. Grus Orientalis Indica.
8. Grus Mexicana.
9. Grus Japonenſis.
10. Grus Americana.
11. Grus Freti Hudſonis.
12. Grus Numidica, Virgo Numidica vulgò dicta.

LXXXI. *Genus Ardeæ.*

1. Ardea.

2. Ardea criſtata.	2. Le Héron hupé.
3. Ardea Cayanenſis criſtata.	3. Le Héron hupé de Cayenne.
4. Ardea cinerea.	4. Le Héron cendré.
5. Ardea Mexicana cinerea.	5. Le Héron cendré du Mexique.
6. Ardea Americana cinerea.	6. Le Héron cendré d'Amérique.
7. Ardea Freti Hudſonis.	7. Le Héron de la Baye de Hudſon.
8. Ardea nævia.	8. Le Héron tacheté.
9. Ardea griſea.	9. Le Héron gris.
10. Ardea Virginiana criſtata.	10. Le Héron hupé de Virginie.
11. Ardea Mexicana criſtata.	11. Le Héron hupé du Mexique.
12. Ardea purpuraſcens.	12. Le Héron pourpré.
13. Ardea Mexicana purpuraſcens.	13. Le Héron pourpré du Mexique.
14. Ardea criſtata purpuraſcens.	14. Le Héron pourpré hupé.
15. Ardea candida.	15. Le Héron blanc.
16. Egretta.	16. L'Aigrette.
17. Ardea Braſilienſis candida.	17. Le Héron blanc du Bréſil.
18. Ardea Carolinenſis candida.	18. Le Héron blanc de la Caroline.
19. Ardea Mexicana candida.	19. Le Héron blanc du Mexique.
20. Ardea candida minor.	20. Le petit Héron blanc.
21. Ardea nigra.	21. Le Héron noir.
22. Ardea nigra torquata.	22. Le Héron noir à collier.
23. Ardea Braſilienſis.	23. Le Héron du Bréſil.
24. Botaurus.	24. Le Butor.
25. Botaurus Freti Hudſonis.	25. Le Butor de la Baye de Hudſon.
26. Botaurus minor.	26. Le petit Butor.
27. Botaurus ſtriatus.	27. Le Butor rayé.
28. Botaurus major.	28. Le grand Butor.
29. Botaurus rufus.	29. Le Butor roux.
30. Botaurus Braſilienſis.	30. Le Butor du Bréſil.
31. Botaurus nævius.	31. Le Butor tacheté ou le Pouacre.
32. Botaurus Americanus nævius.	32. Le Butor tacheté d'Amérique.
33. Cancrofagus.	33. Le Crabier.
34. Cancrofagus caſtaneus.	34. Le Crabier marron.

35. Le Crabier roux.
36. Le Crabier roux
37. Le Crabier jaune.
38. Le Crabier des Philippines.
39. Le Crabier d'Amérique.
40. Le Crabier du Bréſil.
41. Le Crabier de Bahama.
42. Le Crabier bleu.
43. Le Crabier verd.
44. Le Crabier verd tacheté.
45. Le Bihoreau.
46. Le Blongios.
47. Le Blongios tacheté.

LXXXII. *Genre de l'Ombrette.*

1. L'Ombrette.

SECTION IX.

LXXXIII. *Genre de la Cuilliere.*

1. La Cuilliere.
A. *La Cuilliere tachetée.*
2. La Cuilliere brune.

SECTION X.

LXXXIV. *Genre de l'Oiſeau-royal.*

1. L'Oiſeau-royal.

SECTION XI.

LXXXV. *Genre du Cariama.*

1. Le Cariama.

LXXXVI. *Genre du Kamichy.*

1. Le Kamichy.

SECTION XII.

LXXXVII. *Genre de la Poule-Sultane.*

1. La Poule-Sultane.

35. Cancrofagus rufus.
36. Cancrofagus rufus nævius.
37. Cancrofagus luteus.
38. Cancrofagus Philippenſis.
39. Cancrofagus Americanus.
40. Cancrofagus Braſilienſis.
41. Cancrofagus Bahamenſis.
42. Cancrofagus cœruleus.
43. Cancrofagus viridis.
44. Cancrofagus viridis nævius.
45. Nictycorax.
46. Ardeola.
47. Ardeola nævia.

LXXXII. *Genus Scopi.*

1. Scopus.

SECTIO IX.

LXXXIII. *Genus Cochlearii.*

1. Cochlearius.
A. *Cochlearius nævius.*
2. Cochlearius fuſcus.

SECTIO X.

LXXXIV. *Genus Balearicæ.*

1. Balearica.

SECTIO XI.

LXXXV. *Genus Cariamæ.*

1. Cariama.

LXXXVI. *Genus Anhimæ.*

1. Anhima.

SECTIO XII.

LXXXVII. *Genus Porphyrionis.*

1. Porphyrio.
A. *Porphyrio*

A. *Porphyrio melanocephalos.*	A. *La Poule-Sultane à tête noire.*
2. Porphyrio minor.	2. La petite Poule-Sultane.
3. Porphyrio viridis.	3. La Poule-Sultane verte.
4. Porphyrio fuſcus.	4. La Poule-Sultane brune.
5. Porphyrio rufeſcens.	5. La Poule-Sultane rouſſâtre.
6. Porphyrio rufus.	6. La Poule-Sultane rouſſe.
7. Porphyrio punctulatus.	7. La Poule-Sultane mouchetée.
8. Porphyrio nævius.	8. La Poule-Sultane tachetée.
9. Porphyrio Freti Hudſonis.	9. La Poule-Sultane de la Baye de Hudſon.
10. Porphyrio Maderaſpatanus.	10. La Poule-Sultane de Madraſt.

TABLE INDEX

Des Genres. *Generum.*

LXII	Genre . page	3		LXII	Genus . pagina	3
LXIII	Genre . . .	8		LXIII	Genus . . .	8
LXIV	Genre . . .	10		LXIV	Genus . . .	10
LXV	Genre . . .	14		LXV	Genus . . .	14
LXVI	Genre . . .	18		LXVI	Genus . . .	18
LXVII	Genre . . .	33		LXVII	Genus . . .	33
LXVIII	Genre . . .	38		LXVIII	Genus . . .	38
LXIX	Genre . . .	42		LXIX	Genus . . .	42
LXX	Genre . . .	94		LXX	Genus . . .	94
LXXI	Genre . . .	121		LXXI	Genus . . .	121
LXXII	Genre . . .	132		LXXII	Genus . . .	132
LXXIII	Genre . . .	141		LXXIII	Genus . . .	141
LXXIV	Genre . . .	151		LXXIV	Genus . . .	151
LXXV	Genre . . .	177		LXXV	Genus . . .	177
LXXVI	Genre . . .	261		LXXVI	Genus . . .	261
LXXVII	Genre . . .	292		LXXVII	Genus . . .	292
LXXVIII	Genre . . .	311		LXXVIII	Genus . . .	311
LXXIX	Genre . . .	351		LXXIX	Genus . . .	351
LXXX	Genre . . .	361		LXXX	Genus . . .	361
LXXXI	Genre . . .	391		LXXXI	Genus . . .	391
LXXXII	Genre . . .	503		LXXXII	Genus . . .	503
LXXXIII	Genre . . .	506		LXXXIII	Genus . . .	506
LXXXIV	Genre . . .	511		LXXXIV	Genus . . .	511
LXXXV	Genre . . .	516		LXXXV	Genus . . .	516
LXXXVI	Genre . . .	518		LXXXVI	Genus . . .	518
LXXXVII	Genre . . .	522		LXXXVII	Genus . . .	522

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS FRANÇOIS.

La lettre G indique le genre : la lettre V, la variété ; & la lettre E, l'eſpece.

A.

	G.	V.	E.
ABoyeur des Anglois,	76		2
Aigrette,	81		16
Allouette de mer,	72		2
Alouette de mer,	69		8
—-de-mer,	75		10
—-de-mer à collier,	75		11
—-de-mer de S. Domingue,	75		12
—-de-mer de S. Domingue, (Petite)	75		13
—-de-mer, (Petite)	75	A.	10
Autre Beccaſſine,	75		1
Autruche,	62		
—	62		1
— de Guiane,	63		1

B.

	G.	E.
BArge,	76	
—	76	1
— blanche,	76	8
— brune,	76	4
— griſe,	76	2
— griſe, (Grande)	76	3
— rouſſe,	76	5
— rouſſe d'Amérique,	76	7
— rouſſe, (Grande)	76	6
Bec à Cuiller,	79	1
Bécaſſe,	77	1
— grande,	77	1
— petite,	77	2
Bécaſſeau,	77	2
Bécaſſine,	77	2
Bécaſſine d'Etang,	75	3
— (Plus petite eſpece de)	77	3
Bécaſſon,	77	2
Beccaſſe,	77	
—	77	1
— blanche,	77 A.	1
— de mer,	68	1
Beccaſſeau,	75	
—	75	1
Beccaſſine,	77	2
— (Autre)	75	1
— blanche,	75	8
— d'Angleterre,	77	5
— de Madraſt,	77	4
— (Mâle de la)	77	3
— (Petite)	77	3
Béquaſſe,	77	1
Bergeronette,	75	10
Bihoreau,	81	45
Biſtarde,	66	1
Bitarde,	69	12
Blongios,	81	46
— tacheté,	81	47
Bluet,	87	1
Butor,	81	24
— brun,	81	32
— brun, (Petit)	81	47
— de la Baye de Hudſon,	81	25
— du Bréſil,	81	30
— (Grand)	81	28
— huppé,	81	41

	G.	E.
Butor, (Petit)	81	26
—	81	43
—	81	46
— rayé,	81	27
— roux,	81	29
— tacheté,	81	31
— tacheté d'Amérique,	81	32

C.

	G.	E.
CAilles, (Mere des)	74	1
—	74	3
— (Roi de)	74	3
— (Roy des)	74	1
—	74	3
Canard de pré de France,	66	2
Canne-petiere,	66	2
Canut,	75	21
Cariama,	85	
—	85	1
Caſoar,	64	
—	64	1
Caſſowary,	64	1
Chevalier,	75	3
—	75	4
— aux pieds rouges,	75	4
— aux pieds rouges, (Femelle du)	76	3
— blanc,	75	8
— cendré,	75	7
— d'Italie, (Grand)	67	1
— de Bengale,	75	9
— noir,	75	7
— rayé,	75	5
— rouge,	75	3
—	75	4
— tacheté,	75	6
Chirurgien,	71	2
— brun,	71	4
— noir,	71	3
— varié,	71	5
Cigogne,	80	
—	80	2

	G.	V.	E.
Cigogne blanche,	80		2
— brune,	80		1
— d'Amérique,	80		3
— de la Guiane,	80		5
— du Bréſil,	80		4
— noire,	80		1
— noire, (Eſpece de)	78		13
— ordinaire,	80		2
Cocoüan,	74		2
Combattant,	75		18
Corbeau de nuit,	81		45
Corlieu,	78		1
—	78		2
— blanc,	78		10
— brun,	78		11
— (Petit)	76		2
—	78		2
— rouge,	78		12
Corlis,	78		8
Coulon-chaud,	72		
—	72		1
— -chaud cendré,	72		2
Courly,	78		
—	78		1
— blanc,	78	A.	1
— blanc du Bréſil,	78		10
— brun d'Amérique,	78		6
— brun du Bréſil,	78		11
— d'Amérique, (Grand)	78		8
— d'Amérique, (Petit)	78		9
— de Madagaſcar,	78		3
— de terre,	79		12
— marron,	78		5
— (Petit)	78		2
— rouge du Bréſil,	78		12
— varié du Mexique,	78		7
— verd,	78		4
Cra-cra,	81		39
Crabier,	81		33
— bleu,	81		42
— d'Amérique,	81		39
— de Babama,	81		41
— des Philippines,	81		38

	G.	V.	E.
Crabier du Bréſil,	81		40
— jaune,	81		37
— marron,	81		34
— roux,	81		35
— roux tacheté,	81		36
— (Second)	81		3
— verd,	81		43
— verd tacheté,	81		44
Crex, (Oiſeau nommé)	76		2
Cueiller,	79		1
Cuiller, (Bec à)	79		1
Cuilliere,	83		
—	83		1
— brune,	83		2
— tachetée,	83	A.	1
Cul-blanc,	75		1
Curiaca,	78		8

D.

	G.	E.
DEmoiſelle de Numidie,	80	12
Deux-pour-un,	77	3
Dixhuit,	70	1
Dotralle de la Province de Lincoln,	69	6
— des Anglois,	69	5
Dronte,	65	
—	65	1

E.

	G.	E.
ECha ſſe,	67	
—	67	1
— du Mexique,	67	2
Eſpatule,	79	2
— rouge,	79	3
Eſpece de Cigogne noire,	78	13
— de Héron,	81	45

F.

	G.	E.
FEmelle du Chevalier aux pieds rouges,	76	3
Flamant gris,	78	11
— rouge,	78	12
Foulque d'eau de l'Amérique, (Petite)	87	9
Fouton,	77	3
Francolin,	76	6
— à poitrine rouge,	76	5
— blanc de la Baye de Hudſon,	76	8
— de l'Amérique, (Grand)	76	7

G.

	G.	E.
GAlerand,	81	24
GGrand-Butor,	81	28
— Chevalier d'Italie,	67	1
— Courly d'Amérique,	78	8
— Francolin de l'Amérique,	76	7
— Héron hupé,	81	10
— Pluvier,	69	12
— Pluvier de Bengale,	69	13
— Vanneau de Bologne,	70	5
Grande Barge griſe,	76	3
— Barge rouſſe,	76	6
— Grue de la Baye de Hudſon,	80	10
— Grue des Indes,	80	7
Grive-d'eau,	75	20
Grue,	80	6
— blanche de l'Amérique,	80	10
— brune & cendrée,	80	11
— d'Amérique,	80	10
— de la Baye de Hudſon,	80	11
— de la Baye de Hudſon, (Grande)	80	10
— de Numidie,	80	12
— des Indes, (Grande)	80	7
— des Indes Orientales,	80	7
— du Japon,	80	9

	G.	E.
Grue du Mexique,	80	8
Guignard,	69	5
— d'Angleterre,	69	6
Guignette,	75	2

H.

	G.	E.
HÉron,	81	
H—	81	1
—	81	2
—	81	6
—	81	39
—	81	45
— blanc,	75	18
—	81	15
— blanc de la Caroline,	81	18
— blanc de M. Oldham,	75	7
— blanc du Bréſil,	81	17
— blanc du Mexique,	81	19
— blanc, (Petit)	81	18
—	81	20
— bleu,	81	3
—	81	42
— cendré,	81	1
—	81	4
— cendré d'Amérique,	81	6
— cendré de l'Amérique Septentrionale,	81	7
— cendré du Mexique,	81	5
— de la Baye de Hudſon,	81	7
— du Bréſil,	81	23
— (Eſpece de)	81	45
— étoilé,	75	18
— gris,	81	9
— hupé,	81	2
— hupé de Cayenne,	81	3
— hupé de Virginie,	81	10
— hupé du Mexique,	81	11
— hupé, (Grand)	81	10
— noir,	81	21
— noir à collier,	81	22
Héron ordinaire,	81	1
— (Petit)	79	1
— pourpré,	81	12
— pourpré du Mexique,	81	13
— pourpré hupé,	81	14
— tacheté,	81	8
Houtarde,	66	1
Huitres, (Preneur d')	68	1
Huitrier,	68	
—	68	1

I.

	G.	E.
JAcana,	71	
J—	71	1
— armé,	71	2
Ibis,	78	13
— blanc,	78	14

K.

	G.	E.
KAmichy,	86	
K—	86	1

M.

	G.	E.
MAle de la Beccaſſine,	77	3
Maroüette,	74	2
Maubéche,	75	14
— griſe,	75	16
— griſe, (Petite)	75	17
— tachetée,	75	15
Mere des Cailles,	74	1
—	74	3
Merle-d'eau	75	19

O.

	G.	E.
OIſeau appellé Hæmatopus marinus,	68	1
— de Riviere,	78	8
— nommé Crex,	76	2
— pourpré,	87	1
— -Royal,	84	
—	84	1
Olive,	66	2

	G.	E.
Ombrette,	82	
—	82	1
Onouré des bois,	81	23
Oſtarde,	66	1
—	69	12
Oſtardeau,	69	12
Otarde,	66	1
Outarde,	66	
—	66	1
—	69	12
— d'Arabie,	66	3
— des Indes,	69	13
— (Petite)	66	2

P.

	G.	E.
PAle,	79	1
Pallette,	79	1
Paon,	84	1
— -de-mer,	75	18
Papechieu,	70	1
Pélican,	79	1
— Américain,	78	8
Perdrix-de-mer,	73	
—	73	1
— -de-mer à collier,	73	2
— -de-mer du Sénégal,	73	4
— -de-mer tachetée,	73	3
Petit Butor,	81	26
—	81	43
—	81	46
— Butor brun,	81	47
— Corlieu,	76	2
—	78	2
— Courly,	78	2
— Courly d'Amérique,	78	9
— Héron,	79	1
— Héron blanc,	81	18
—	81	20
— Pluvier,	69	5
— Pluvier à collier,	69	8
— Pluvier doré,	69	2
— Râle d'eau,	74	2

	G.	V.	E.
Petite Alouette-de-mer,	75	A.	10
— Alouette-de-mer de S. Domingue,	75		13
— Beccaſſine,	77		3
— Eſpece de Beccaſſine, (Plus)	77		3
— Foulque d'eau de l'Amérique,	87		9
— Maubéche griſe,	75		17
— Outarde,	66		2
— Poule d'eau,	87		8
— Poule-Sultane,	87		2
Pie de mer,	68		1
Pittouër,	81		24
Plus petite Eſpece de Beccaſſine,	77		3
Pluvier,	69		
—	69		1
—	69		8
— à collier,	69		7
— à collier de la Jamaïque,	69		11
— à collier de S. Domingue,	69		10
— à collier de Virginie,	69		9
— à collier, (Petit)	69		8
— armé du Sénégal,	69		15
— criard,	69		9
— de Bengale, (Grand)	69		13
— des Indes à la gorge noire,	69		14
— doré,	69		1
— doré de la Baye de Hudſon,	69		4
— doré de S. Domingue,	69		3
— doré, (Petit)	69		2
— (Grand)	69		12
— gris,	70		2
— hupé de Perſe,	69		14
— moucheté,	69		4
— (Petit)	69		5
— verd,	69		1
Poche,	79		1

	G.	V. E.
Porphyrio,	87	1
Porphyrion,	87	1
Pouacre,	81	31
Poule,	87	A. 1
—-d'eau,	71	2
—-d'eau aux aîles épe-ronnées,	71	5
— d'eau, (Petite)	87	8
—-Sultane,	87	
—	87	1
—-Sultane à tête noi-re,	87	A. 1
—-Sultane brune,	87	4
—-Sultane de la Baye de Hudſon,	87	9
—-Sultane de Madraſt,	87	10
—-Sultane mouchetée,	87	7
—-Sultane, (Petite)	87	2
—-Sultane rouſſâtre,	87	5
—-Sultane rouſſe,	87	6
—-Sultane tachetée,	87	8
—-Sultane verte,	87	3
Preneur d'Huitres,	68	1

R.

	G.	E.
RAle,	74	
— à collier des Phi-lippines,	74	6
— brun des Philippines,	74	7
— d'eau,	74	1
— d'eau de Bengale,	75	9
— d'eau, (Petit)	74	2
— de Genet,	74	3
— de l'Amérique,	74	8
— de Virginie,	74	8
— des Philippines,	74	4
— rayé des Philippines,	74	5
Ralle,	74	1
Raſle,	74	1
— de Genet,	74	3
— noir,	74	1
— rouge,	74	3
Roi de Cailles,	74	3
Roupeau,	81	45
Roy des Cailles,	74	1
—	74	3

S.

	G.	E.
SAnderling d'Arbres,	75	10
— de Cornouaille,	75	17
Saouakou,	83	1
—des bois,	83	2
Second Crabier,	81	3
Spatule,	79	
—	79	1
—	79	2
— couleur de roſe,	79	2
— rouge,	79	3

T.

	G.	E.
THouyou,	63	
—	63	1
Tourne pierre de la Baye de Hudſon,	72	1
Tringa tacheté,	75	20
Truble,	79	1

V.

	G.	E.
VAneau,	70	1
Vanneau,	70	
—	70	1
— armé de la Louiſia-ne,	70	7
— armé de S. Domin-gue,	70	8
— armé du Sénégal,	70	6
— de Bologne, (Grand)	70	5
— de Suiſſe,	70	4
— gris,	70	2
— varié,	70	3
Videcocq,	77	1
Videcoq,	77	1
Wimbrel,	78	2

INDEX ALPHABETICUS

Nominum Gallicorum, Latinorum, Hebraicorum, Græcorum, &c.

Littera G Genus designat; Littera V, varietatem; & Littera S, Speciem.

A.

	G	S.
ABastrus,	62	1
Aboyeur des Anglois,	76	2
Acacalotl,	78	7
— Hernandezii,	78	7
— Nierembergii,	78	7
Acceggia,	77	1
Acker-Trapp,	66	1
— Trappe,	66	1
Adebar,	80	2
Ægocephala,	76	6
Ægocephalus Bellonii,	76	1
—	76	6
— (Glareola)	76	6
Aengsnaerpa,	74	3
Aers, (Dod-)	65	1
Aesch-Heunlein,	74	1
— Heunlin,	74	1
Agro,	81	1
— blanc,	81	15
Agroti,	81	16
Aguapeçaca,	71	2
— dicta, (Gallinula Brasilienſis)	71	2
— dicta, (Jacanæ alia ſpecies, Braſilienſibus)	71	2
Aiaia,	79	3
Ajaia,	79	2
— Braſilienſibus,	79	2
— dicta Marcgravii, (Platea Braſilienſis)	79	2

	G.	V.	S.
Ajaja,	79		2
Aigeron,	81		24
Αἰγοκέφαλος,	76		1
Aigrette,	81		16
— Gallorum,	81		16
Αἱματόπους,	68		1
Airon,	81		1
— bianco,	81		15
— negro,	81		1
Αἴξ,	70		1
Albardeola,	79		1
—	81		15
— Willughbeii,	79		1
Alfwargrim,	69		4
Alhabari,	66		1
Alia Ardeæ ſpecies,	81		2
—	81		17
—	81		30
— quædam Ardea,	81		2
— quædam Ardea ex Ornithologo,	81		2
Aliis Butio,	81		24
— Glareola,	87		6
Allouette de mer,	72		2
Alouette de mer,	69		8
Alouette-de-mer,	75		10
— -de-mer à collier,	75		11
— -de-mer de S. Domingue,	75		12
— -de-mer de S. Domingue, (Petite)	75		13
— -de-mer, (Petite)	75	A.	10

	G.	V. S.
Alte Knechte,	74	3
Alwargrim,	69	4
American Godwit, (Greater)	76	7
— Scarlet Pelecan,	79	3
— Scarlet Spoon-bill,	79	3
— Water Hen, (Little)	87	9
Amsel, (Bach-)	75	19
— (Brach-)	70	2
— (See-)	75	19
— (Wasser-)	75	19
Anas campestris,	66	2
— rostro plano, &c.	79	1
Andugoacu,	63	1
Anghiron,	81	1
Anhima,	86	
—	86	1
— Brasilienſibus,	86	1
— Brasilienſium Marcgravii,	86	1
Anhyma,	86	1
Anſer Chilenſis,	71	4
— Cochlearius,	79	1
— platorynchos,	79	1
— Trappa,	66	1
Ανθρωποειδὴς,	80	12
Antigone,	80	7
Aokerhoena,	69	1
Aokerhoens,	69	1
—	69	4
Aouarou,	80	5
Apoa, (Nhandu)	80	4
— Tupinambis Marcgravii, (Nhandu)	80	4
— Tupinambis, (Nhandu)	80	4
Aquila Americana, &c.	86	1
— aquatica, cornuta,	86	1
Arapapa,	83	A. 1
Arcaſe,	78	1
Arcia,	77	1
Arcuata,	78	1
— Coſmii,	78	1
Arcuata major,	78	1
— minor, &c.	78	5
Arcuato,	78	1
Ardea,	80	2
—	81	
—	81	1
—	81	2
—	81	24
— æquinoctialis,	78	14
— alba,	79	1
—	81	15
— alba, &c.	80	2
— alba cirrata Jonſtoni,	81	15
— alba major,	81	15
— alba major criſtâ carens,	81	15
— alba major Willughbeji,	81	15
— alba maxima,	81	15
—	81	16
— alba minor,	81	16
— alba minor Aldrovandi,	81	16
— alba minor alia,	81	16
— alba minor Carolinienſis,	81	18
— alba minor criſtata,	81	16
— alba minor Geſneri,	81	16
— alba minor ſecunda, Aldrovandi,	81	16
— alba minor tertia Aldrovandi,	81	20
— alba tota, &c.	81	15
— alia alba,	81	15
— (Alia quædam)	81	2
— Americana, &c.	63	1
—	75	18
— Americana, alba maxima Sloan.	81	16
— Americana cinerea,	81	6
— Americana, ſylvatica, &c.	81	23
— Arundinum,	81	24

	G.	S.
Ardea Asterias,	81	24
— Brasilienſis,	81	23
— Brasilienſis candida,	81	17
— Brasilienſis Cocoi dicta Marcgravio,	81	3
— Brasilienſis, roſtro ſerrato, cinereæ ſimilis Marcgravii,	81	30
— Brasilienſis, roſtro ſerrato, ſtellari ſimilis Marcgravii,	81	30
— Canadenſis,	80	11
— candens,	81	15
— candida,	81	15
— candida minor,	81	20
— capite lævi, &c.	78	13
—	78	14
—	81	15
— capite læviuſculo, &c.	81	24
— capite nudo, &c.	80	7
— Carolinenſis candida,	81	18
— caſtanei coloris alia,	81	36
— Cayanenſis criſtata,	81	3
— cinerea,	81	1
—	81	4
— cinerea alia,	81	28
— cinerea altera,	81	45
— cinerea criſtata,	81	1
— cinerea flaveſcens, nova ſpecies,	81	12
— cinerea flaveſcens, nova ſpecies, Marſilli,	81	12
— cinerea major,	81	1
—	81	2
— cinerea major Jonſtoni,	81	1
— cinerea minor,	81	45
— cinerea minor Mexicana,	81	5
— cinerea roſtro craſſiori,	81	45
— cinerea Schwenckfeldii,	81	1
Ardea cirrata, alba, &c.	80	2
—	81	45
— cœrulea,	81	41
—	81	42
— cœruleo-nigra,	81	42
— criſtâ dependente,	81	1
— criſta flava, &c.	81	41
— criſta occipitis tripenni dependente, &c.	81	45
— criſta ſetoſa erecta, &c.	84	1
— criſtata,	81	2
— criſtata, &c.	81	28
— criſtata maxima Americana,	81	10
— criſtata purpuraſcens,	81	14
— cyanea,	81	42
— ex Ornithologo, (Alia quædam)	81	2
— Freti Hudſonis,	81	7
— fuſca,	81	32
— fuſca, Nova ſpecies,	81	27
— griſea,	81	9
— Hæmatopos,	81	35
— Hæmatopus, Aldrovandi,	81	35
— major griſea criſtata &c.	81	41
— maximâ, luteſcens, &c.	81	28
— Mexicana,	81	13
— Mexicana candida,	81	19
— Mexicana cinerea,	81	5
— Mexicana criſtata,	81	11
— Mexicana minima candidiſſima Hernandezii,	81	19
— maxima purpuraſcens,	81	13
— minor,	81	24
— minor alia roſtro arcuato,	81	4
— minor alia roſtro arcuato Aldrovandi,	81	4

	G.	S.
Ardea minor alia vertice croceo,	81	20
— minor, ſubfuſco-griſea, &c.	81	32
— nævia,	81	8
— nigra,	81	21
—	81	22
— nigra, &c.	80	1
— nigra Aldrovandi,	81	22
— nigra Jonſtoni,	81	22
— nigra torquata,	81	22
— nivea,	81	17
— occipite criſta pendula, &c.	81	1
— occipite criſtato, &c.	81	10
—	81	42
— occipite ſubcriſtato, &c.	81	43
— pallida, &c.	81	24
— paluſtris,	81	24
— pavonina,	84	1
— pella Schwenckfeldii,	81	1
— Phœnicea, Spatula dicta,	79	3
— plumbea criſtata, &c.	81	42
— Porphyrio,	78	12
— pulla,	81	1
— pulla Schwenckfeldii,	81	1
— purpuraſcens,	81	12
— Quaiotta,	81	33
— quam Sguacco vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi,	81	37
— roſea, Spatula dicta,	79	2
— roſtro maximè arcuato,	81	4
— roſtro rubro, &c.	80	6
— rubra,	81	34
— rubra Aldrovandi,	81	28
— rubra, Carollina,	78	12
— rubra cirrata,	81	28
Ardea ſtellaris,	81	24
— ſtellaris altera,	81	29
— ſtellaris Ariſtoteli,	81	24
— ſtellaris criſtata Americana,	81	41
— ſtellaris Geſneri,	81	24
— ſtellaris Geſnero,	81	24
— ſtellaris major,	81	28
— ſtellaris major Ornithologo,	81	28
— ſtellaris minima,	81	43
— ſtellaris minor,	81	24
—	81	32
— ſtellaris Plinio,	81	24
— ſtellaris, tertium genus,	81	29
— ſtellaris, tertium genus Aldrovandi,	81	29
— ſtellaris Willughbeji,	81	24
— ſubcœrulea,	81	1
— ſubfuſca major, &c.	81	23
— ſuperciliis albis, &c.	80	12
— ſylvatica, &c.	81	23
— ſyncipite nudo papilloſo, &c.	80	11
— varia,	81	39
—	81	45
— varia major Chilienſis,	81	39
— varia Schwenckfeldii,	81	45
— ventre ſubalbo, &c.	80	1
— vertice croceo,	81	20
— vertice nigro, &c.	81	24
— vertice nudo papilloſo, &c.	80	6
— vertice papilloſo,	80	6
— vertice temporibuſque nudis papilloſis, &c.	80	10
— violacea,	81	41
— vireſcens,	81	43

	G.	S.
Ardea Virginiana criſtata,	81	10
— viride-flaveſcens, Nova ſpecies,	81	26
— viride flaveſcens, Nova ſpecies Marſilli,	81	26
— vulgò Squaiotta dicta Malalbergi, Aldrovandi,	81	33
Ardeæ alia ſpecies, quæ vulgò Squaiotta dicitur Malalbergi,	81	33
— aliud genus, quam Sguacco vocant,	81	37
— cinereæ congener,	81	8
— cinereæ tertium genus,	81	8
— cinereæ tertium genus Aldrovandi,	81	8
— congener,	81	22
— congener Aldrovandi,	81	22
— ſpecies,	78	4
— ſpecies, (Alia)	81	2
—	81	17
—	81	30
— ſpecies Marcgravii,	81	15
— ſpecies Marſilli,	78	4
— ſtellaris tertium genus,	81	29
— ſtellaris tertium genus Aldrovandi,	81	29
Ardeola,	81	40
—	81	46
— Braſilienſis Marcgravii,	81	40
— cinerea,	81	1
— nævia,	81	47
— pulla,	81	1
Arenaria,	72	
—	72	1
—	75	77
Arenaria cinerea,	72	2
— noſtra,	75	17
Arquata,	78	1
— albicans, &c.	78	1
— Aldrovandi,	78	1
— Americana cinerea,	78	11
— Americana cinerea, &c.	80	5
— Americana Phœnicea,	78	12
— cinerea,	78	11
— Geſneri,	78	1
— major,	78	1
— minor,	69	12
—	78	2
— minor Geſneri,	78	2
— minor noſtras,	78	2
— Phœnicea,	78	12
Arquatæ congener,	69	12
Aſchenfarbener Reger,	81	1
Aſcolopax,	77	1
Ash-colour'd Heron from North-America,	81	7
— coloured Heron,	81	1
— coloured Heron, (Leſſer)	81	45
Ασκαλωπαξ,	77	1
Ασκολόπαξ,	77	1
Aſterias,	81	24
— (Ardea)	81	24
Ἀστερίας,	81	24
— (Ἐρωδιὸς)	81	24
Ἀστερίας ἐρωδιος, Ariſt.	81	24
Aveſtrúz,	62	1
Avis Aldrovandi, (Stella)	66	2
— Aldrovandi, (Tarda)	66	1
— Anglica, (Morinellus)	69	5
— Braſiliana Guara dicta,	78	12
— (Canuti)	75	21
— (Capella)	70	1

	G.	S.
Avis cornuta,	71	4
— dicta, (Stella)	66	2
— Eme,	63	1
—	64	1
— (Emeu)	64	1
— falcata,	78	4
— (Hirundo marina)	73	1
— hoſpita,	80	2
— peregrina,	80	2
— pietatis cultrix,	80	2
— Porphyrio, Amboinenſis,	78	12
— pugnax,	75	18
— pugnax, Aldrovandi,	75	18
— quædam ex rapacibus,	86	1
— quædam quam in Belgio Kemperken vocant,	75	18
— quædam quam in Belgio Pugnacem vocant,	75	18
— ſicca,	81	11
— ſiliquaſtrini capitis,	87	1
— (Stella)	66	2
— (Tarda)	66	1
— The Stint dicta,	75	10
— vivivora,	79	3
— Xoxouquihaactli,	81	13
Aukoh,	81	1
Autre Beccaſſine,	75	1
Autruche,	62	
—	62	1
— de Guiane,	63	1
Ayaya,	79	2
Ayron negro,	78	4
Aztatl,	81	15

B.

	G.	S.
Babgach,	81	1
Bach-Amſel,	75	19
Bak,	81	24
Balakzel,	81	1

	G.	V.	S.
Balearica,	84		
—	84		1
— (Grus)	84		1
Bambiaya,	86		1
Baranek,	70		1
—	77		2
Barge,	76		
—	76		1
— Bellonii,	76		6
— blanche,	76		8
— brune,	76		4
— Gallorum,	76		1
— griſe,	76		2
— griſe, (Grande)	76		3
— rouſſe,	76		5
— rouſſe d'Amérique,	76		7
— rouſſe, (Grande)	76		6
Barker,	76		2
— Albini, (Glareola)	76		2
Baſtard Plover,	70		1
Bec à cuiller,	79		1
Bec-llarg,	76		1
Becada,	77		1
Becadell,	77		3
Bécaſſe,	77		1
— grande,	77		1
— petite,	77		2
Bécaſſeau,	77		2
Bécaſſine,	77		2
— d'Étang,	75		3
— (Plus petite eſpece de)	77		3
Bécaſſon,	77		2
Beccaroveglia,	79		1
Beccaſſa,	77		1
Beccaſſe,	77		
—	77		1
— blanche,	77	A.	1
— de mer,	68		1
Beccaſſeau,	75		1
—	75		1
Beccaſſine,	75		2
—	77		2
— (Autre)	75		1

	G.	S.
Beccaſſine blanche,	75	8
— d'Angleterre,	77	5
— de Madraſt,	77	4
— (Mâle de la)	77	3
— (Petite)	77	3
Becquaroveglia,	79	1
Bein, (Rot-)	75	3
— (Rott-)	75	3
Beinen, (Waſſer-Heunlin mit Roten)	75	3
Bekas,	77	2
Belgis Scur-Vogel Marcgravii,	80	4
— vulgò Negro,	80	5
Bengall Water Rail,	75	9
Béquaſſe,	77	1
Berg-Schnepfe,	77	1
— Schneppe,	77	1
Bergeronette,	75	10
Bernard Piſcaira,	81	1
Beyſſer, (Stein-)	75	10
Bicker, (Stein-)	75	10
Bihoreau,	81	45
Bilcock,	74	1
Bill, (American Scarlet Spoon-)	79	3
— (Spoon-)	79	1
Bill'd Bird of America, (Scarlet Spoon-)	79	3
— Heron, (White and Spoon-)	79	1
Bird of America, (Scarlet Spoon-bill'd)	79	3
Biſtard,	66	1
Biſtarda,	66	1
— Alberti magni,	66	1
— Alberto,	66	1
— (Recentiorum)	66	1
Biſtarde,	66	1
Bitarde,	69	12
Bittern,	81	24
— (Brown)	81	32
— (Creſted)	81	41
Bittern, from Hudſon's-Bay,	81	25
— (Little Brown)	81	47
— (Small)	81	32
—	81	43
Bittorn,	81	24
Bittour,	81	24
Black Gaulding,	81	42
— Stork,	80	1
Blaw-Gruner,	70	1
Blawer Reger,	81	1
Blauwer Reigel,	81	1
Blew Gaulding,	81	42
— Heron,	81	3
—	81	42
Blongios,	81	46
— tacheté,	81	47
Blue Gaulding,	81	42
Bluet,	87	1
Bocian,	80	2
— bialy,	80	2
— czarny,	80	1
— ſniady,	80	1
Boczan,	80	2
Boo-onk,	81	46
Boollu Cory,	87	10
Botaurus,	81	24
— Americanus nævius,	81	32
— Braſilienſis,	81	30
— Freti Hudſonis,	81	25
— major,	81	28
— minor,	81	26
— nævius,	81	31
— Ornithologis,	81	24
— Ornithologorum,	81	24
— rufus,	81	29
— ſtriatus,	81	27
Brach-Amſel,	70	2
— hun,	78	1
—	78	2
— hun, (Gallinula quam noſtri vocant)	78	2
— Vogel,	69	1

	G.	S.
Charadrius ſpinoſus,	69	15
— ſupra niger, &c.	67	1
— vociferus,	69	9
— Willughby,	69	8
Charlot,	76	1
—	78	1
Chaſida,	80	2
Chattering Plover,	69	9
Chavarita,	80	2
Chevalier,	75	3
—	75	4
— aux pieds rouges,	75	4
— aux pieds rouges, (femelle du)	76	3
— blanc,	75	8
— cendré,	75	7
— d'Italie, (Grand)	67	1
— de Bengale,	75	9
— noir,	75	7
— rayé,	75	5
— rouge,	75	3
—	75	4
— tacheté,	75	6
Χιλορνιθα,	77	1
Chirurgien,	71	2
— brun,	71	4
— noir,	71	3
— varié,	71	5
Chorata,	80	2
Chroſciel,	74	3
Churge,	69	13
Cicognino,	80	2
Ciconia,	80	
—	80	2
—	84	1
— alba,	80	2
— Americana,	80	3
— Braſilienſis,	80	4
— fuſca,	80	1
— fuſca Schwenckfeldii,	80	1
— Guianenſis,	80	5
— nigra,	80	1

	G.	V.	S.
Ciconia nigra Willughbeii,	80		1
Cignus cucullatus,	65		1
Cigogna,	80		2
Cigogne,	80		
—	80		2
— blanche,	80		2
— brune,	80		1
— d'Amérique,	80		3
— de la Guiane,	80		5
— du Bréſil,	80		4
— noire,	80		1
— noire, (Eſpece de)	78		13
— ordinaire,	80		2
Ciguenna,	80		2
Cincli congener altera,	75		1
— congener prior,	75	A.	10
— genus,	75		2
Cinclus,	72		1
—	75		1
—	75		9
—	75		19
—	77		3
— Belloniî,	75		1
— Dominicenſis,	75		12
— Dominicenſis minor,	75		13
— minor,	75	A.	10
— Ornithologi,	75		10
— prior Aldrovandi,	75		10
— quartus,	77		3
— tertius,	75		1
— tertius Aldrovandi,	75		1
— torquatus,	75		11
— Turneri,	75		10
Cirris Virgilii, Scaligeri,	81		35
— Virgilii Scaligero, Aldrovandi,	81		35
Clucking-Hen,	81		23
Coceayauhqui,	80		8
Cochlearia,	79		1
Cochlearius,	83		
—	83		1
— (Anſer)	79		1

	G.	V.	S.
Cochlearius fuſcus,	83		2
— nævius,	83	A.	1
Cock, (Jud-)	77		3
— (White Wood-)	77	A.	1
— (Wood-)	77		1
Cocoi,	81		3
—	81		40
— Braſilienſibus,	81		3
— dicta Marcgravio, (Ardea Braſilienſis)	81		3
— primus,	81		40
— ſecundus,	81		3
— tertius,	81		23
Cocoüan,	74		2
Cognatus, (Numenio)	78		1
Colherado,	79		2
—	79		3
— Marcgravii, (Luſitanis)	79		2
Comaltecatl,	67		2
Combattant,	75		18
Common Heron,	81		1
—	81		2
Congener Aldrovandi, (Ardeæ)	81		22
— Aldrovandi, (Œdicnemo)	66		1
— altera, (Cincli)	75		1
— (Ardeæ)	81		22
— (Arquatæ)	69		12
— (Œdicnemo)	66		1
— (Pardali Bellonii)	70		3
— prior, (Cincli)	75	A.	10
Corbeau de nuit,	81		45
Corlieu,	78		1
—	78		2
— blanc,	78		10
— brun,	78		11
— rouge,	78		12
— (Petit)	76		2
—	78		2
Corlis,	78		1
Corn-Crek,	74		3
Cornix aquatica,	75		19
Corvus aquaticus,	78		7
— aquaticus Hernandezii,	78		7
— aquaticus Nierembergii,	78		7
— nocturnus Agric.	81		45
Coruz,	69		12
Cory, (Boollu)	87		10
Coturnico-mater Scaligero,	74		3
Coturnicum, (Rex)	74		3
Coturnix,	74		3
— magna,	74		3
Coulon-chaud,	72		
—	72		1
— -chaud cendré,	72		2
Courly,	78		
—	78		1
— blanc,	78	A.	1
— blanc du Bréſil,	78		10
— brun d'Amérique,	78		6
— brun du Bréſil,	78		11
— d'Amérique, (Grand)	78		8
— d'Amérique, (Petit)	78		9
— de Madagaſcar,	78		3
— de terre,	69		12
— marron,	78		5
— (Petit)	78		2
— rouge du Bréſil,	78		12
— varié du Mexique,	78		7
— verd,	78		4
Cra-cra,	81		39
Crab-Catcher,	81		32
Crabier,	81		33
— bleu,	81		42
— d'Amérique,	81		39
— de Bahama,	81		41
— des Philippines,	81		38
— du Bréſil,	81		40
— jaune,	81		37
— marron,	81		34
— roux,	81		35

	G.	V.	S.
Crabier roux tacheté,	81		36
— (Second)	81		3
— verd,	81		43
— verd tacheté,	81		44
Crake, (Water-)	75		19
Crane,	80		6
— (Brown and Ash-colour'd)	80		11
— from Hudson's-Bay, (Hooping-)	80		10
— (Greater Indian)	80		7
— (Hooping)	80		10
— (Numidian)	80		12
— (Red Legged)	67		1
Crek, (Corn-)	74		3
Crested Bittern,	81		41
— Gaulding, (Grey)	81		41
— Heron,	81		2
— Heron, (Largest)	81		10
Crex,	74		3
—	76		2
—	81		13
— Bellonii,	76		2
— Indica, ex albo cinerea, &c.	87		10
— (Oiseau nommé)	76		2
Crotalistria,	80		2
Cryall,	81		16
Cueiller,	79		1
Cuiller, (Bec à)	79		1
Cuilliere,	83		
—	83		1
— brune,	83		2
— tachetée,	83	A.	1
Cul-blanc,	75		1
Curiaca,	78		8
Curicaca,	78		8
— Brasilienfibus,	78		8
— Brasilienfium Marcgravii,	78		8
Curicacæ alia fpecies,	78		9
Curlew,	76		3
—	76		7
Curlew,	78		1
— (Brown)	78		11
— (Jack-)	78		1
— (Leffer)	78		2
— of Brafil, (Scarlet)	78		12
— (Red-)	78		12
— (Stone)	69		12
— (Water-)	78		1
— (White)	78		10
Curlinus,	78		1
Curwilet,	75		17
Curwillet,	75		17
Cygnus cucullatus,	65		1
— cucullatus Nierembergii,	65		1
Czapla,	81		1
Czayka,	70		1
Cziap,	80		2
Cziepie,	81		1
Czieyka,	70		1

D.

	G.	S.
DAker-Hen,	74	3
Dam, (Ros-)	81	24
Deer, (Kill-)	69	9
Deffyt,	87	8
Deiutha,	80	2
Demoiselle de Numidie,	80	12
— of Numidia,	80	12
Derkacz,	74	3
Deux-pour-un,	77	3
Dixhuit,	70	1
— Gallorum,	70	1
Dod-aers,	65	1
Dodo,	65	1
— Lusitanorum,	65	1
Dommel, (Rei-)	81	24
Domp-horn,	81	24
Domps-horn,	81	24
Dorada,	69	1
Dotralle de la Province de Lincoln,	69	6
— des Anglois,	69	5

	G.	S.
Dotterel,	69	5
— (Sea-)	72	1
Dotterell,	69	5
Dotteril,	69	5
Dottrel,	69	6
— (Sea-)	72	1
—	72	2
Dottrell,	69	5
— (Sea-)	72	1
Drofa,	66	1
Dronte,	65	
—	65	1
Drop,	66	1
Drum, (Mire-)	81	24
— (Roer-)	81	24
Drumbel, (Mire-)	79	1
Drummel, (Rohr-)	81	24
Duck, (French Field)	66	2
Dummel, (Ror-)	81	24
Dump, (Ros-)	81	24
Dumpf, (Ros-)	81	24
Dunlin,	77	5
— Septentrionalium Anglorum D. Johnſon,	77	5

E.

	G.	S.
EBeher,	80	2
Echaſſe,	67	
—	67	1
— du Mexique,	67	2
Eggenſchaer,	87	5
Eggenſchar,	87	5
Egret,	81	16
Egretta,	81	16
— Gallorum,	81	16
Elaphis,	76	1
Elbiger,	80	2
Ἔλωριος,	78	1
Ema,	62	1
—	63	1
—	80	6
— di Gei,	62	1
Ema Luſitanis Marcgravio,	63	1
Eme,	64	1
— Aldrovandi,	64	1
— (Avis)	63	1
—	64	1
— Cluſii,	64	1
— Nierembergii,	64	1
Emeu,	63	1
—	64	1
— Aldrovandi,	64	1
— Avis,	64	1
— Cluſii,	64	1
— Nierembergii,	63	1
—	64	1
— nigricans, &c.	63	1
— pennis ſetoſis, &c.	64	1
Erdboull,	81	24
Ἐρωδιὸς,	81	1
—	81	2
Ἐρώδιος, Ariſt. (Ἀστέριας)	81	24
Ἐρωδιὸς ἀστερίας,	81	24
— λευκος,	81	15
Erythra,	87	7
— (Gallinula)	87	7
— Geſneri, (Gallinula)	87	7
Erythrontaon Olai magni,	66	1
Erythropos,	75	3
— major Ornithologi, (Gallinula)	75	3
— minor, (Gallinula)	73	1
Erythropus,	75	3
— (Gallinula)	75	3
— major,	75	3
— major, (Gallinula)	75	3
— major Geſneri, Aldrovando, (Gallinula)	75	3
— major Geſneri, (Gallinula)	75	3
— minor,	73	1
— minor, (Gallinula)	73	1

	G.	S.
Erythropus primus Geſneri,	75	3
Eſpatule,	79	2
— rouge,	79	3
Eſpece de Cigogne noire,	78	13
— de Héron,	81	45
Exul hyemis,	80	2
Eye, (Hawk's-)	69	4
— (Ox-)	75	10

F.

	G.	S.
FAlcata,	78	4
Falcinello,	78	4
Falcinellus,	78	4
— Aldrovandi,	78	4
— Aldrovandi colore furvo,	78	4
— Geſneri,	78	4
— Geſneri colore furvo,	78	4
— puniceo-viridis,	78	4
Falconellus puniceo-viridis, Marſilli,	78	4
Falunt d'acqua,	75	19
Faſanella,	66	2
Fauſer,	81	24
Fedoa,	75	3
—	76	7
— altera,	76	1
— noſtra ſecunda,	76	1
— noſtra tertia,	69	12
— ſecunda,	76	1
Fedoæ tertia ſpecies,	69	12
Femelle du Chevalier aux pieds rouges,	76	3
Feuſſel, (Geel-)	87	6
— (Greun-)	75	1
— (Rot-)	75	3
Field Duck, (French)	66	2
Filicetta,	70	1
Flamant gris,	78	11
— rouge,	78	12
Focke,	81	45
Focker,	81	45
Folot d'acqua,	75	19
Forzane,	74	1
Foulque d'eau de l'Amérique, (Petite)	87	9
Fouton,	77	3
Francolin,	76	6
— à poitrine rouge,	76	5
— blanc de la Baye de Hudſon,	76	8
— de l'Amérique, (Grand)	76	7
French Field Duck,	66	2
Froembder Vogel,	67	1
Fulica fronte calva, &c.	87	1
— fronte carunculata, &c.	71	5
— ſpinoſa,	71	5
Fuſer,	81	24
Fyſterlin,	75	2

G.

	G.	S.
GAbilan,	80	6
Galerand,	81	24
Galgulus Aliorum,	69	8
Galla mareza,	74	1
Gallina aquatica, minor, &c.	71	2
— arciera,	77	1
— novalis media,	69	1
— novalis minor Schwenckfeldii,	69	2
— ruſtica,	77	1
— ruſticella,	77	1
— ſalvatica,	77	1
— ſega,	87	4
Gallinaceus Gallus peregrinus,	65	1
— peregrinus Cluſii, (Gallus)	65	1
Gallinæ aquaticæ ſpecies prima de novo adjecta,	74	1

	G.	S.
Gallinæ aquaticæ ſpecies ſecunda de novo adjecta,	75	1
Gallinaginis genus nomine ignoto,	74	1
Gallinago,	77	1
—	77	2
— Anglicana,	77	5
— cinerea,	74	1
— cinerea major,	76	1
— Gazæ,	77	1
—	77	2
— Maderaſpatana,	77	4
— Maderaſpatana, &c.	77	4
— maxima,	77	1
— minima,	77	3
— minima, &c.	75	10
— minima Bellonii,	77	3
— minor,	77	2
—	77	3
— minor Aldrovandi,	77	2
— minor Bellonii,	77	2
— minor Willughby,	77	2
— Serica dicta,	74	1
— ſylveſtris aquatica,	78	13
— tertia Bellonii,	77	3
— vulgaris minor,	77	2
Gallinaza,	77	1
Gallinella,	77	1
Gallinula aquatica,	83	2
— aquatica octava Geſneri,	75	1
— aquatica Ornithologis,	87	6
— aquatica quarta Geſneri,	87	6
— Braſilienſibus Jacana dicta Marcgravii,	71	1
— Braſilienſis Aguapecaca dicta,	71	2
— Braſilienſis, Jacana dicta,	71	1
— Braſilienſis quarta Marcgravii,	71	4
Gallinula Braſilienſis tertia Marcgravii,	71	3
— Chloropos Ornithologi,	87	4
— Chloropus, rarior ſpecies,	74	1
— Chloropus tertia,	87	4
— Erythra,	87	7
— Erythra Geſneri,	87	7
— Erythropos minor,	73	1
— Erythropos major Ornithologi,	75	3
— Erythropus,	75	3
— Erythropus major,	75	3
— Erythropus major Geſneri,	75	3
— Erythropus major Geſneri Aldrovando,	75	3
— Erythropus minor,	73	1
— Geſneri, (Phæopus)	78	2
— Holoſericea,	74	1
— Hypoleucos,	75	2
— Melampos,	73	3
— Melampus Aldrovandi,	73	3
— Melampus Aldrovando,	73	3
— Melampus Geſneri,	73	3
— Melampus Geſnero,	73	3
— Melampus Willughbeji,	73	3
— Melampus Willughby,	73	3
— minor Aldrovandi, (Poliopus)	87	8
— novalis minor,	87	7
— Ochra,	74	2
—	75	1
— Ochra Geſneri, Aldrovandi,	74	2
— Ochropus,	75	1
— Ochropus major,	87	6

	G.	V.	S.
Gallinula Ochropus major Geſnero, Aldrovandi,	87		6
— Ochropus medius,	75		1
— Ochropus minor,	73		2
— paluſtris,	87	A.	1
— pedibus nigricantibus,	75		7
— pedibus nigris,	75		4
— pedibus viridibus,	75		1
— Phæopos altera,	78		2
— Phæopus,	78		2
— Phœnicopos,	75		1
— Phœnicopus Geſneri,	75		1
— quam noſtri vocant Brach-hun,	78		2
— Rhodopos,	75		1
— Rhodopus,	75		1
— Rhodopus Geſneri,	75		1
— ſerica,	74		1
— ſerica Aldrovandi,	74		1
— ſerica dicta,	74		1
— ſerica Geſneri,	74		1
— terreſtris,	87		5
— terreſtris Aldrovandi,	87		5
Gallinulæ aquaticæ decimum genus,	74		2
— aquaticæ duodecimum genus,	73		2
— aquaticæ nonum genus,	87		7
— aquaticæ octavum genus,	75		1
— aquaticæ primum genus,	75		3
— aquaticæ quartum genus, Schmirring dictum,	87		6
— aquaticæ quintum genus,	75		1
— aquaticæ ſecundum genus,	87		4
— aquaticæ ſeptimum genus,	73		3
Gallinulæ aquaticæ ſextum genus,	75		2
— aquaticæ ſpecies,	75		19
— aquaticæ tertium genus,	87		8
— aquaticæ undecimum nus,	73		1
— genus nomine ignoto,	74		1
— maritimæ genus,	76		3
— maritimæ genus aliud,	76		2
Gallus Gallinaceus peregrinus Cluſii,	65		1
— peregrinus, (Gallinaceus)	65		1
Gambetta,	75		4
— Aldrovandi,	75		4
— Italis dicta,	75		4
Gans, (Loeffel-)	79		1
— (Trapp-)	66		1
Ganſs, (Heer-)	81		1
— (Herr-)	81		1
— (Trapp-)	66		1
Ganta,	80		2
Garriga, (Toru de)	81		28
Garza,	81		1
—	81		15
— bianca,	81		16
— biancha,	81		15
— Luſitanis,	81		15
Garzetta,	81		16
— Aldrovandi,	81		16
— bianca,	81		15
—	81		16
— dicta Aldrovandi,	81		16
— Geſneri,	81		16
— Italorum,	81		16
Gavia Brachyptera, vocifera,	69		9
— cinerea,	70		2
— cinerea Eberi,	70		1
— cinerea Peuceri,	70		1
— Indica,	69		13
— littoralis,	69		8

	G.	V. S.
Gavia Morinella altera,	69	6
— Morinellus ſimpliciter,	69	5
— quæ Pluvialis arenaria noſtra, Raji,	72	1
— roſtro vireſcente, &c.	69	12
— viridis,	69	1
— vulgaris,	70	1
Gaulding, (Black)	81	42
— (Blew)	81	42
— (Blue)	81	42
— (Grey Creſted)	81	41
— (Largeſt White)	81	15
— (White)	81	15
Gazæ Hiaticula,	69	8
Gazola,	81	24
Geel-Feuſſel,	87	6
Geiſz, (Himel-)	78	1
— (Himels)	77	2
— -Vogel,	78	1
Gelvæ,	81	24
Gelve,	81	24
Γερανός,	80	6
Germanis Nycticorax,	81	45
Γερανος,	80	6
Gerzab,	80	6
Geſcheckt Mott Heunle,	75	1
Giarola,	73	3
Giarolo,	75	1
—	75	10
—	75	A. 10
Giaroncello,	75	1
—	75	10
—	75	A. 10
— Italis dicta, (Tringa tertia Aldrovandi)	75	1
Gid-Snipe,	77	3
Gillerdine,	87	8
Giloch,	78	1
Ginocchiella,	70	5
— vulgò,	70	5
Girardel,	76	3
Girardella Columba,	87	8
Girardello,	78	2
Girardin,	74	2
Girardina,	74	2
Girone,	81	15
Glareola,	73	
—	73	1
—	73	3
—	75	1
— alia primæ ſimilis, &c.	75	4
— (Aliis)	87	6
— Barker, Albini,	76	2
— caſtanea,	75	15
— nævia,	73	3
— nona,	87	7
— nona Schwenckfeldii,	87	7
— octava,	75	1
— octava Schwenckfeldii,	75	1
— prima,	75	3
— prima Schwenckfeldii,	75	3
— pugnax,	75	18
— quarta,	75	1
— quarta Schwenckfeldii,	75	1
— quinta,	73	2
— quinta Schwenckfeldii,	73	2
— ſecunda,	73	1
— Senegalenſis,	73	4
— ſexta,	74	1
— ſeptima,	74	1
— ſeptima Schwenckfeldii,	74	1
— tertia,	87	6
— tertia Schwenckfeldii,	87	6
— torquata,	73	2
Glottis,	76	3
—	87	4
— Aldrovandi,	76	3
— Baltnero,	76	3
— Geſneri,	76	3

	G.	S.
Γλωττὶς,	60	3
Glutt,	76	3
—	87	4
Goat-head,	76	1
Godwit,	76	1
—	76	6
— from Hudſon's-Bay, (White-)	76	8
— (Greater American)	76	7
— (Red-breaſted)	76	5
Gooſe of America, (Spur-wing'd)	71	4
Gorriones de Oviedo,	69	1
Grand Butor,	81	28
— Chevalier d'Italie,	67	1
— Courly d'Amérique,	78	8
— Francolin de l'Amérique,	76	7
— Héron hupé,	81	10
— Pluvier,	69	12
— Pluvier de Bengale,	69	13
— Vanneau de Bologne,	70	5
Grande Barge griſe,	76	3
— Barge rouſſe,	76	6
— Grue de la Baye de Hudſon,	80	10
— Grue des Indes,	80	7
Graſe-Schnepff,	77	2
Graſs-Schnepff,	77	2
Graver Keuwit,	70	2
Grauer Reigel,	81	1
Grawer Gyſitz,	70	2
Grauwer Reigel,	81	1
Great White Heron,	81	15
Greater American Godwit,	76	7
— Indian Crane,	80	7
Greateſt Snipe,	69	11
Green Plover,	69	1
Gren Legged Horſeman,	76	3
Greny,	78	1
Greun-Feuſſel,	75	1
Greuner Keuwit,	69	1
Grey Creſted Gaulding,	81	41
— Plover,	69	1
—	70	2
— Snipe With à White neck, (Larger)	69	11
Griel,	69	12
Grinetta,	87	8
Grive-d'eau,	75	20
Groſſe Waſſer Hunle,	87	5
Groſſer Brach-Vogel,	69	1
—	70	2
—	78	1
— Ror-Reigel,	81	28
— Schnepf,	77	1
Groſz Waſſer Heunle,	87	5
Gru,	80	6
Grua,	80	6
Grue,	80	6
— blanche de l'Amérique,	80	10
— brune & cendrée,	80	11
— d'Amérique,	80	10
— de la Baye de Hudſon,	80	11
— de la Baye de Hudſon, (Grande)	80	10
— de Numidie,	80	12
— des Indes, (Grande)	80	7
— des Indes Orientales,	80	7
— du Japon,	80	9
— du Mexique,	80	8
Grugnetto,	87	8
Grúlla,	80	6
Gruner,	70	1
— (Blaw-)	70	1
Grus,	80	6
— Americana,	80	10
— Balearia, Aldrovandi,	84	1
— Balearia Willughbeji,	84	1
— Balearica,	84	1
— Balearica Aldrovandi,	84	1
— Balearica Plinii,	84	1

	G.	S.
Grus Capenſis fuſca, &c.	84	1
— cinerea ferrivora,	63	1
— criſpa,	81	24
— Freti Hudſonis,	80	11
— Japonenſis,	80	9
— Japonenſis alia,	80	9
— Japonenſis Charletoni,	80	9
— Japonica,	84	1
— Japponenſis,	80	9
— incurvato roſtro, &c.	80	5
— Indica,	80	8
— Indica major,	80	7
— Indica Willughbeji,	80	8
— Mexicana,	80	8
— noſtras,	80	6
— Numidiæ,	80	12
— Numidica,	80	12
— Orientalis Indica,	80	7
Gruz,	80	6
Guacu Braſilienſibus Marcgravio,(Nhandu-)	63	1
— Braſilienſibus, (Nhandu-)	63	1
— (Jabiru-)	80	4
— (Nhandu-)	63	1
— Petiguaribus, (Jabiru-)	80	4
— Petiguaribus Marcgravii,	80	4
Guara,	78	6
—	78	12
— Braſilianis dicta,	78	12
— Braſilienſibus,	78	12
— Braſilienſibus Marcgravii,	78	12
— dicta, (Avis Braſiliana)	78	12
Guaranna,	78	6
— Braſilienſibus,	78	6
— Braſilienſibus Marcgravii,	78	6
Guignard,	69	5
— d'Angleterre,	69	6
Guignette,	75	2
Guinetta,	75	2
Guira-tinga,	81	15
— tinga Braſilienſibus,	81	15
— tinga Braſilienſibus Marcgravii,	81	15
Gulguruk,	10	1
Guſtard,	66	1
Gybitz,	70	1
Gybytz,	70	1
Gyfitz,	70	1
— (Grawer)	70	2
Gyvitt,	70	1
Gywitt,	70	1

H.

	G.	S.
HAeger,	81	1
Hæmaſtica,	76	5
Hæmantopus,	67	1
Hæmatopos, (Ardea)	81	35
Hæmatopus,	67	1
—	68	1
— Aldrovandi, (Ardea)	81	35
— Bellonii,	68	1
— marinus, (Oiſeau appellé)	68	1
Haer-Sneff,	77	2
Hahn, (Brauſz-)	75	18
Half-Schnepf,	77	3
— Snipe,	77	3
Hanikens,	78	1
Har-Schnepf,	77	2
Haus-Teuffel,	75	18
Hawk's-Eye,	69	4
Head, (Goat-)	76	1
Heer-ganſs,	81	1
— Schnepfe,	77	2
— Schnepff,	77	2
Hegeſar,	87	5
Hegeſchara,	87	5
Heggeſchaer,	87	5

	G.	S.
Heggeſchar,	87	5
Heggſchaer,	87	5
Hen, (Clucking-)	81	23
— (Daker-)	74	3
— (Little American Water)	87	9
— (Maderas Rail-)	87	10
— (Small Water-)	87	8
Herodias,	81	9
Héron,	81	
—	81	1
—	81	2
—	81	6
—	81	39
—	81	45
— blanc,	75	18
—	81	15
— blanc de la Caroline,	81	18
— blanc de M. Oldham,	75	7
— blanc du Bréſil,	81	17
— blanc du Mexique,	81	19
— blanc, (Petit)	81	18
—	81	20
— bleu,	81	3
—	81	42
— cendré,	81	1
—	81	4
— cendré d'Amérique,	81	6
— cendré de l'Amérique Septentrionale,	81	7
— cendré du Mexique,	81	5
— de la Baye de Hudſon,	81	7
— du Bréſil,	81	23
— (Eſpece de)	81	45
— étoilé,	75	18
— gris,	81	9
— hupé,	81	2
— hupé de Cayenne,	81	3
— hupé de Virginie,	81	10
— hupé du Mexique,	81	11
— hupé, (Grand)	81	10
— noir,	81	21
— noir à collier,	81	22
Héron ordinaire,	81	1
— (Petit)	79	1
— pourpré,	81	12
— pourpré du Mexique,	81	13
— pourpré hupé,	81	14
— tacheté,	81	8
Heron,	81	1
— (Ash-coloured)	81	1
— (Blew)	81	3
—	81	42
— (Common)	81	1
—	81	2
— (Creſted)	81	2
— from North-America, (Ash-colour'd)	81	7
— (Great White)	81	15
— (Largeſt Creſted)	81	10
— (Leſſer Ash coloured)	81	45
— (Little White)	81	18
— (Red Legg'd)	81	16
— (Scythe-bill'd)	78	4
— (White)	81	15
— (White and Spoon-bill'd)	79	1
Herr-ganſs,	81	1
Heunle, (Geſcheckt Mott)	75	1
— (Groſz Waſſer)	87	5
— (Schwartz Waſſer)	74	1
Heunlein, (Aeſch-)	74	1
— (Waſſer-)	73	3
Heunlin, (Aeſch-)	74	1
— (Bundt Waſſer)	75	1
— mit Roten beinen, (Waſſer-)	75	3
— (Mott-)	74	1
— (Waſſer-)	77	2
Heyron,	81	1
Hiaticula,	69	8
— (Gazæ)	69	8
— Willughby,	69	8
Himantopus,	67	
—	67	1

	G.	S.
Hymantopus caſtaneus, &c.	67	1
— corpore gracili, &c.	68	1
— Maderaſpatanus, &c.	67	1
— Mexicanus,	67	2
— Plinii,	67	1
— Plinii, Aldrovandi,	67	1
Himel-Geiſz,	78	1
Himels Geiſz,	77	2
— Ziege,	77	2
Himmel-Ziege,	70	1
Himmels-Ziege,	77	2
Hirundinis ripariæ ſpecies,	73	1
Hirundo marina,	73	1
— marina Aldrovandi,	73	1
— marina Avis,	73	1
Hoactli,	81	11
— (Xoxouhqui-)	81	5
—	81	11
— (Xoxouqui-)	81	5
Hoacton,	81	5
—	81	11
Hoen, (Water-)	71	1
Hoitzilaztatl,	81	19
— dicta Hernandezii,	81	19
Holtz-Schnepfe,	77	1
— Schnepff,	75	14
— Schneppe,	77	1
Hooping Crane,	80	10
— Crane from Hudſon's-Bay,	80	10
Horn, (Domp-)	81	24
— (Domps-)	81	24
Horſeman, (Green Legged)	76	3
— (Red Legged)	75	4
Horſgioek,	75	1
Hortybel,	81	24
Hovare,	80	2
Houn, (Meer-)	76	2
—	76	3
Houtarde,	66	1
Huitres, (Preneur d')	68	1
Huitrier,	68	
—	68	1
Hun, (Brach-)	78	1
—	78	2
— (Gallinula quam noſtri vocant Brach-)	78	2
— (Schnep-)	77	1
— (Schnepff-)	77	1
— (Waſſer)	87	6
— (Water-)	71	1
Hunle, (Groſſe Waſſer)	87	5
Hutti,	69	1
Hypoleucos,	75	2
— (Gallinula)	75	2

I.

	G.	S.
Jabiru,	80	5
— Braſilienſibus,	80	5
— Braſilienſibus Marcgravii,	80	5
— Braſilienſium Marcgravii,	80	5
— -Guacu,	80	4
— -Guacu Petiguaribus,	80	4
— -Guacu Petiguaribus, Marcgravii,	80	4
Jaboûtra,	81	39
Jacana,	71	
—	71	1
— armata,	71	2
— armata fuſca,	71	4
— armata nigra,	71	3
— armata varia,	71	5
— armé,	71	2
— Braſilienſibus,	71	1
— dicta, (Gallinula, Braſilienſis)	71	1
— dicta Marcgravii, (Gallinula Braſilienſibus)	71	1
Jacanæ alia ſpecies, Braſilienſibus Aguapecaca dicta,	71	2

	G.	S.
Jacanæ quarta ſpecies,	71	4
— tertia ſpecies,	71	3
Jack-Curlew,	78	1
— Snipe,	77	3
Jacuah,	62	1
Iandou,	63	1
Iardu,	63	1
Ibidis ſpecies,	78	12
Ibis,	78	12
—	78	13
—	78	14
— alba Herodoto,	80	2
— Bellonii,	78	13
— blanc,	78	14
— candida,	78	14
— nigra,	78	13
— nigra Bellonii,	78	13
— non ex toto nigra,	78	14
Ἴβις,	78	13
Icterus,	69	8
Jeheras,	78	13
Jelvé,	77	2
Ἰμαντόπους,	67	1
Indian Buſtard,	69	13
— Crane, (Greater)	80	7
Interpres,	72	1
Jochualcuachili,	71	4
Jud-Cock,	77	3
Junco,	75	10
— Bellonii,	75	10
Junger Kranich,	80	6
Jut-Vogel,	78	1

K.

	G.	S.
KAath,	79	1
Καλίδρις,	75	3
Kamichy,	86	
—	86	1
Kapoüa,	71	2
Kaſper,	74	3
Kemperken,	75	18
Kemperken vocant, (Avis quædam quam in Belgio)	75	18
Keuwit, (Graver)	70	2
— (Greuner)	69	1
Kifitz,	70	1
Κιγκλος,	75	1
—	75	10
Κικυψ,	80	2
Kill-Deer,	69	9
Kividit,	70	1
Kiwit,	70	1
Κλαρος,	80	6
Klein Brach-Vogel,	87	7
Kleiner Brach-Vogel,	69	2
Knarren, (Korn)	74	3
Knechte, (Alte)	74	3
Knillis, (Rot-)	73	3
Knot,	75	21
— agri Lincolnienſis,	75	21
— Lincolnienſibus,	75	21
Knuſſell Leonardi Baltneri, (Rot-)	73	3
Kobel Regerlin,	73	1
Koenig, (Wachtel)	74	3
— (Wachteln)	74	3
Kokoſska,	73	3
Kokoſzká wodná,	87	6
Koppriegerle,	73	1
Korn knarren,	74	3
Κότυφος ἔνυδρος,	75	19
Kou, (Moſs-)	81	24
Kowipa,	70	1
Kozielek,	70	1
—	77	2
Κυκκφα,	80	2
Kran,	80	6
Kranch,	80	6
Krane,	80	6
Kranich,	80	6
— (Junger)	80	6
Κρεξ,	74	3
Krye,	80	6

	G.	S.
Kuh, (Moos-)	81	24
Kunner, (Velvet)	74	1
Kurlu,	78	1
Kuvitz,	70	1
Kuw, (Mos)	81	24
Kyvitta fuſca,	70	2
— *Schwenckfeldii*,	70	1
Kyuutz,	70	1

L.

	G.	S.
LAhul,	69	5
Land Rail,	74	3
Lap-wing,	70	1
— wing Plover,	70	1
Larger Grey Snipe, With à White neck,	69	11
Largeſt Creſted Heron,	81	10
— (White Gaulding)	81	15
Lark, (Sea-)	69	8
Leaſt-Snipe,	75	10
Leepelaer,	79	1
Leſſer,	79	1
Legged Horſeman, (Red)	75	4
Leglék,	80	2
Leheras,	78	13
Lepelaer,	79	1
—	79	2
—	79	3
Lepler,	79	1
Lerlichirollo,	75	19
Leſſer Ash coloured Heron,	81	45
— Curlew,	78	2
Leucorodia,	79	1
Leucorodios,	81	16
Leucorodius,	79	1
— Willughbei,	79	1
— Willughbeii,	79	1
Leverſina,	76	3
Λευκερώδιος,	81	15
Λευκορόδιος,	79	1
Λευκορωδιὸς,	79	1
Limoſa,	76	

	G.	S.
Limoſa,	76	1
—	76	3
— Americana ruſa,	76	7
— candida,	76	8
— fuſca,	76	4
— griſea,	76	2
— griſea major,	76	3
— ruſa,	76	5
— ruſa major,	76	6
— Venetorum,	76	3
Lingulaca Gazæ,	76	3
Little American Water Hen,	87	9
— Brown Bittern,	81	47
— Buſtard,	66	2
— White Heron,	81	18
Loculator,	78	8
Loeffel-Gans,	79	1
Loeffler,	79	1
Lohong,	66	3
Longlegs,	67	1
Looper, (Strand-)	75	10
Los-rind,	81	24
Luſitanis Colherado, Marcgravii,	79	2
Lyſsklicker,	75	10

M.

	G.	S.
MAchuautha,	80	2
Macuarta,	80	2
Maderas Rail-Hen,	87	10
Maguari,	80	3
— Braſilienſibus,	80	3
— Braſilienſibus Marcgravii,	80	3
Mâle de la Beccaſſine,	77	3
Mall-Snaeppa,	77	2
Maroüette,	74	2
Marſpitt,	68	1
Martinete peſcador,	81	11
Maruetta,	74	2
Maſarino,	78	8
Mathoen,	67	1

	G.	S.
Matkern,	87	7
Matkneltzell Leonardi Baltneri,	87	7
Mattkern,	87	7
Mattknillis,	75	1
Matuitui,	69	8
—	78	9
— Braſilienſibus,	69	8
Maubéche,	75	14
— griſe,	75	16
— griſe, (Petite)	75	17
— tachetée,	75	15
Meer-houn,	76	2
—	76	3
— rind,	81	24
Melampos, (Gallinula)	73	3
Melampus,	73	3
— Aldrovandi, (Gallinula)	73	3
— Aldrovando, (Gallinula)	73	3
— Geſneri, (Gallinula)	73	3
— Geſnero, (Gallinula)	73	3
— Willughbeji, (Gallinula)	73	3
— Willughby, (Gallinula)	73	3
Mere des Cailles,	74	1
—	74	3
Merle-d'eau,	75	19
Merlo aquaiolo grande,	67	1
Merula aquatica,	75	19
— aquatica Ornithologi,	75	19
— novalium,	70	2
— rivalis,	75	19
Mire-Drum,	81	24
— Drumbel,	79	1
Molliceps Ariſtotelis,	77	2
Monk-Swan of S. Maurice's Iſland,	65	1
Moos-Kuh,	81	4
Morinella altera, (Gavia)	69	6
Morinellus,	69	5
Morinellus Anglicanus,	69	6
— Anglorum,	69	5
— Avis Anglica,	69	5
— marinus D. Brown,	72	1
— ſimpliciter, (Gavia)	69	5
Morkulla,	77	1
Mos,	81	24
— Kuw,	81	24
— Reigel,	81	24
Moſs-Kou,	81	24
— Ochs,	81	24
— Ochſe,	81	24
— Reigel,	81	24
Moſz-Reigel,	81	24
Motacilla maritima,	75	10
— pectore albo, &c.	75	19
Motacillæ genus,	75	2
Mott Heunle, (Geſcheckt)	75	1
— -Heunlin,	74	1
Mycteria Americana,	80	4
Myrpytta,	69	4

N.

	G.	S.
Naamitha,	62	1
Nacht-rab,	81	45
— rabe,	81	45
— ram,	81	45
Neamah,	62	1
Negro,	80	5
Neppe,	77	1
Nhandu apoa,	80	4
— apoa Tupinambis,	80	4
— apoa Tupinambis, Marcgravii,	80	4
— -guacu,	63	1
— -guacu Braſilienſibus,	63	1
— -guacu Braſilienſibus Marcgravio,	63	1
Nicticorax Geſneri,	81	45
Night-Raven,	81	45
Numenius,	78	
—	78	1
— albus,	78	10

	G.	V. S.
Numenius Aldrovandi,	78	1
— Americanus fuſcus,	78	6
— Americanus major,	78	8
— Americanus minor,	78	9
— Braſilienſis candidus,	78	10
— Braſilienſis coccineus,	78	12
— Braſilienſis fuſcus,	78	11
— candidus,	78	A. 1
— capite lineis quatuor, &c.	77	2
— caſtaneus,	78	5
— fuſcus,	78	11
— Geſneri,	78	1
— holoſericus,	78	13
— Indicus,	78	12
— Indicus Cluſii,	78	12
— Jonſtoni,	78	1
— Madagaſcarienſis,	78	3
— major,	78	1
— medius,	76	1
— Mexicanus varius,	78	7
— minor,	78	2
— niger,	78	8
— pedibus vireſcentibus, &c.	76	3
— pullus ſubtus albidus,	70	2
— puniceo-viridis,	78	4
— roſtri apice lævi, &c.	77	1
— roſtro arcuato, &c.	78	1
—	78	2
— ruber,	78	12
— ſubaquilus,	78	4
— veterum,	78	1
— viridis,	78	4
— uropygio albo, &c.	76	1
Numenio cognatus,	78	1
Numidian Crane,	80	12
Nycticorax,	81	45
— (Germanis)	81	45
— Ornithologi,	81	45

O.

	G.	S.
Ochs, (Moſs-)	81	24
Ochſe, (Moſs-)	81	24
Ochſz, (Waſſer-)	81	24
Ochra,	74	2
— (Gallinula)	74	2
—	75	1
— Geſneri, Aldrovandi, (Gallinula)	74	2
Ochropus,	75	1
— (Gallinula)	75	1
— magnus,	87	6
— magnus Geſneri,	87	6
— major, (Gallinula)	87	6
— major Geſnero, Aldrovandi, (Gallinula)	87	6
— medius,	75	1
— medius, (Gallinula)	75	1
— medius Geſneri,	75	1
— minor,	73	2
— minor, (Gallinula)	73	2
Odeboer,	80	2
Odenſwala,	80	1
Oedicnemo congener,	66	1
— congener Aldrovandi,	66	1
Oedicnemus,	69	12
— Bellonii,	69	12
οἰδίκνημος,	69	12
Oiſeau appellé Hæmatopus marinus,	68	1
— de Riviere,	78	8
— nommé Crex,	76	2
— pourpré,	87	1
— -Royal,	84	
—	84	1
οἰνὰς,	81	24
— Ariſtotelis,	81	24
Olive,	66	2
Ombrette,	82	
—	82	1

	G.	V. S.
Onk, (Boo-)	81	46
Onocrotalus Americanus, &c.	83	1
—	83 A.	1
Onouré des bois,	81	23
Ortygometra,	74	3
— Aldrovandi,	74	3
— alis fuscis,	74	1
— alia rufo-ferrugineis,	74	3
— Bellonii,	74	1
— Gesneri,	74	3
— melina, &c.	66	2
— subtus albescens, &c.	74	1
— tota rufa, &c.	74	3
Ορτυγομήτρα,	74	3
Ostarde,	66	1
—	69	12
Ostardeau,	69	12
Ostralega,	68	
—	68	1
Ostralegus,	68	1
Ostrich,	62	1
Ostridge,	62	1
Otarde,	66	1
Οτιδα,	66	1
Otis,	66	
—	66	1
— Aldrovandi,	66	1
— Arabica,	66	3
— Aristotelis,	66	1
— auribus erecto-cristatis,	66	3
— capite juguloque lævi,	66	2
— Græcis,	66	1
— jugulo utrinque cristato,	66	1
— minor,	66	2
Οτις,	66	1
Otus plumbeus,	80	12
Outarde,	66	
—	66	1
—	69	12
Outarde d'Arabie,	66	3
— des Indes,	69	13
— (Petite)	66	2
Ouwewaer,	80	2
Ouzel, (Water-)	75	19
Ouzell, (Brook-)	74	1
Ox-eye,	75	10
Oyevaert,	80	2
Οὖραξ,	66	1
Oyster Catcher,	68	1
Ωτιδα,	66	1
Ὠτὸς,	66	1

P.

	G.	S.
PAgo,	69	8
Palamedæa,	86	1
Pale,	79	1
Pallette,	79	1
Paon,	70	1
—	84	1
— -de-mer,	75	18
Paoncello,	70	1
Paonchello,	70	1
Paonzello,	70	1
Papechieu,	70	1
Parcus,	70	1
Pardales de Oviedo,	69	1
Pardali Belloniicongener,	70	3
Pardalis,	69	1
Πάρδαλος,	70	2
Pardalus,	70	2
— Aristotelis,	70	2
— minor,	69	2
— primus,	78	1
— primus Schwenckfeldii,	78	1
— quartus,	69	2
— secundus,	70	2
— tertius,	69	1
— tertius Schwenckfeldii,	69	1
Parra Plinii,	70	1
Partridge-Snipe,	77	4

	G.	S.
Pavo agreſtis Bellonio,	70	1
— agreſtis Geſneri,	70	1
— agreſtis Geſnero,	70	1
— cauda brevi,	84	1
— Chinenſis ſine cauda,	84	1
— ex cinereo fuſcus, &c.	84	1
— marinus,	84	1
— nigricans, brevicaudus, &c.	84	1
— ſine cauda Chinenſis,	84	1
Pavonzino,	70	1
πελαγος,	80	2
πελαργὸς,	80	2
πέλαργος μέλας,	80	1
Pelecan,	79	1
— (American Scarlet)	79	3
Pelecanus,	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Ornithologi,	79	1
Pelekan,	79	1
πελεκὰν,	79	1
πελεκάνος, Ariſt.	79	1
Pélican,	79	1
— Américain,	78	8
Pelican,	79	1
— (Wood)	78	8
Pelicanus,	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Geſneri,	79	1
Pelikan,	79	1
Pella Ariſtoteli,	81	1
Pellicane,	79	1
Pellicano,	79	1
πελλὸς,	81	1
Perdix ruſtica,	77	1
— ruſtica major,	77	1
— ruſtica minor,	77	2
Perdrix-de-mer,	73	
—	73	1
—-de-mer à collier,	73	2
—-de-mer du Sénégal,	73	4
—-de-mer tachetée,	73	3
Perr,	75	10

	G.	V.	S.
Petit Butor,	81		26
—	81		43
—	81		46
— Butor brun,	81		47
— Corlieu,	76		2
—	78		2
— Courly,	78		2
— Courly d'Amérique,	78		9
— Héron,	79		1
— Héron blanc,	81		18
—	81		20
— Pluvier,	69		5
— Pluvier à collier,	69		8
— Pluvier doré,	69		2
— Râle d'eau,	74		2
Petite Alouette-de-mer,	75	A.	10
— Alouette-de-mer de S. Domingue,	75		13
— Beccaſſine,	77		3
— Eſpece de Bécaſſine, (Plus)	77		3
— Foulque d'eau de l'Amérique,	87		9
— Maubéche griſe,	75		17
— Outarde,	66		2
— Poule d'eau,	87		8
— Poule-Sultane,	87		2
Pfiſterlein Leonardi Baltneri,	75		2
Pful-Schnepff,	76		2
Phæopos altera, (Gallinula)	78		2
Phæopus,	78		2
— alter,	78		2
— altera,	78		2
— altera Geſneri,	78		2
— (Gallinula)	78		2
— Gallinula Geſneri,	78		2
Philomachus,	75		18
Pica marina,	68		1
— marina Anglorum,	68		1
— marina Gallorum,	68		1
Pickart,	81		24

	G.	S.
Pie de mer,	68	1
— (Sea-)	68	1
Pigra,	70	1
Pilente,	75	2
Pilwegichen,	75	2
Pilwenckgen,	75	2
Pinirolo,	75	1
— Italis dicta, (Tringa tertia Aldrovandi)	75	1
Piper, (Sand-)	75	2
Pittoor,	81	24
Pittouër,	81	24
Pivier,	69	1
—	78	1
— Montano,	70	2
Piviero,	69	1
Piwip,	70	1
Pizzaccara,	76	1
—	77	1
Pizzardella,	77	2
Plaskonos,	79	1
Platalea,	79	1
— corpore albo,	79	1
— corpore sanguineo,	79	2
—	79	3
Platea,	79	
—	79	1
— Aldrovandi,	79	1
— Americana, &c.	79	2
— Americana phœnicea,	79	3
— Brasilienſis,	79	2
— Brasilienſis, Ajaia dicta Marcgravii,	79	2
— candida,	79	1
— coccinea,	79	3
— incarnata,	79	3
— Mexicana,	79	3
— Mexicana Hernandezii,	79	3
— Mexicana Nierembergii,	79	3
— Plinii,	79	1
— roſea,	79	2
Platea ſanguinea tota,	79	3
— Willughbeii,	79	1
Platelea Ciceronis,	79	1
Plateola,	79	1
Platyrinchos,	79	1
Plover, (Baſtard)	70	1
— (Chattering)	69	9
— (Green)	69	1
— (Grey)	69	1
—	70	2
— (Lap-Wing)	70	1
— (Spotted-)	69	4
— (Stone-)	70	2
—	76	1
—	76	6
— (Whiſtling)	69	1
Pluiero,	76	3
Plus petite eſpece de Bécaſſine,	77	3
Pluvialis,	69	
—	69	1
— altera ſpecies,	69	2
— arenaria noſtra, Raji, (Gavia, quæ)	72	1
— aurea,	69	1
— aurea Freti Hudſonis,	69	4
— aurea minor,	69	2
— Bengalenſis major,	69	13
— cinerea,	70	2
— cinerea flaveſcens,	70	2
— cinerea, Squatarola Venetiis dicta,	70	2
— cinereus, &c.	69	1
— Dominicenſis aurea,	69	3
— Dominicenſis torquata,	69	10
— ex fuſco & albo varia, &c.	69	11
— flaveſcens,	69	1
— flavo-cinerea,	75	6
— flavo-vireſcens,	69	1
— fuſco-cinerea, rarior ſpecies,	75	2

	G.	S.
Pluvialis Jamaicensis torquata,	69	11
— major,	69	12
—	76	3
— major Aldrovandi,	76	3
— major Aldrovando,	76	3
— miniatis cruribus,	69	8
— minor,	69	2
—	69	5
— nigro-flavus,	69	4
— Persica cristata,	69	14
— Senegalensis armata,	69	15
— torquata,	69	7
— torquata minor,	69	8
— totus cinereus,	70	2
— Virginiana torquata,	69	9
— viridis,	69	1
— viridis, &c.	69	11
— viridis Gesneri,	69	1
Pluvier,	69	
—	69	1
—	69	8
— à collier,	69	7
— à collier de la Jamaïque,	69	11
— à collier de S. Domingue,	69	10
— à collier de Virginie,	69	9
— à collier, (Petit)	69	8
— armé du Sénégal,	69	15
— criard,	69	9
de Bengale, (Grand)	69	13
— des Indes à la gorge noire,	69	4
— doré,	69	1
— doré de la Baye de Hudson,	69	4
— doré de S. Domingue,	69	3
— doré, (Petit)	69	2
— (Grand)	69	12
— gris,	70	2
— hupé de Perse,	69	14
— moucheté,	69	4

	G.	V.	S.
Pluvier, (Petit)	69		5
— verd,	69		1
Poche,	79		1
Pol-Schnep,	76		2
Poliopus,	87		8
— Gallinula minor Aldrovandi,	87		8
Polit,	78		1
Polla,	77		1
Polle,	87		5
Pool-Snipe,	75		3
—	75		8
Porc mari,	87		1
Porcellana,	87		8
Porphyrio,	87		
—	87		1
— Amboinensis, (Avis)	78		12
— Americanus, &c.	71		2
— Americanus Hernandezii,	87		1
— Americanus Nierembergii,	87		1
— (Ardea)	78		12
— cæsius, &c.	87		1
— Freti Hudsonis,	87		9
— fuscus,	87		4
— Maderaspatanus,	87		10
— melanocephalos,	87	A.	1
— minor,	87		2
— nævius,	87		8
— nigricans, &c.	75		1
— olivarius, &c.	87		3
—	87		4
— punctulatus,	87		7
— rufescens,	87		5
— rufus,	87		6
— viridis,	87		3
Porphyrion,	87		1
Πορφυρίων,	87		1
Porzana,	74		1
—	74		2
—	87		8
— Italorum,	74		2

	G.	V. S.
Porzana minor,	74	2
Pouacre,	81	31
Poule,	87 A.	1
—-d'eau,	71	2
—-d'eau aux aîles épe-ronnées,	71	5
— d'eau, (Petite)	87	8
—-Sultane,	87	
—	87	1
—-Sultane à tête noi-re,	87 A.	1
—-Sultane brune,	87	4
—-Sultane de la Baye de Hudſon,	87	9
—-Sultane de Madraſt,	87	10
—-Sultane mouchetée,	87	7
—-Sultane, (Petite)	87	2
—-Sultane rouſſâtre,	87	5
—-Sultane rouſſe,	87	6
—-Sultane tachetée,	87	8
—-Sultane verte,	87	3
Pratincola,	73	1
Preneur d'Huitres,	68	1
Pſtros,	62	1
Ptak bitny,	75	18
— deſſczowy,	69	1
— deſſczowy popiela-ty,	70	2
Pugnacem vocant, (Avis quædam, quam in Belgio)	75	18
Pugnax,	75	18
— Aldrovandi, (Avis)	75	18
— (Avis)	75	18
— (Glareola)	75	18
Pulla d'Aigua,	87	4
Pulroſz,	69	1
Pulver,	69	1
Pulvier,	69	1
Purpur-Vogel,	87	1
Puſch-Schneppe,	77	1

Q.

	G.	S.
QUachilto,	87	1
— Hernandezii,	87	1
— Nierembergii,	87	1
Quachilton,	87	1
Quack,	81	45
Quaglie, (Re de)	74	3
Quaiotta, (Ardea)	81	33
Quiratinga,	81	15

R.

	G.	S.
RAb, (Nacht-)	81	45
Rabe, (Nacht-)	81	45
Rail,	74	3
— (Bengall Water)	75	9
—-Hen, (Maderas)	87	10
— (Land)	74	3
— (Water-)	74	1
Râle,	74	
— à collier des Philip-pines,	74	6
— brun des Philippines,	74	7
— d'eau,	74	1
— d'eau de Bengale,	75	9
— d'eau, (Petit)	74	2
— de Genet,	74	3
— de l'Amérique,	74	8
— de Virginie,	74	8
— des Philippines,	74	4
— rayé des Philippines,	74	5
Ralla Anglorum,	74	1
— Anglorum aquatica,	74	1
— Gallorum,	74	1
Ralle,	74	1
Rallus,	74	
— alis griſeis, &c.	74	1
— alis rufo-ferrugineis,	74	3
— aquaticus,	74	1
— aquaticus, &c.	87	1
— aquaticus Aldrovandi,	74	1
— aquaticus Bengalen-ſis,	75	9

	G.	S.
Rallus aquaticus minor,	74	2
— Benghalenſis,	75	9
— Carolinus,	87	9
— corpore vertice oculiſque albis, &c.	75	9
— digitis triuncialibus, &c.	71	5
— Geniſtarum,	74	3
— griſea, &c.	87	9
— Philippenſis,	74	4
— Philippenſis fuſcus,	74	7
— Philippenſis ſtriatus,	74	5
— Philippenſis torquatus,	74	6
— terrenus,	87	5
— terreſtris,	74	3
— terreſtris Americanus,	74	8
— Virginianus,	74	8
Ram, (Nacht-)	81	45
Raphus,	65	
—	65	1
Rarg,	81	1
Raſclet,	87	3
Raſle,	74	1
— de Genet,	74	3
— noir,	74	1
— rouge,	74	3
Raven, (Night-)	81	45
Rayer,	81	1
Re de Quaglie,	74	3
Recentiorum Biſtarda,	66	1
— Tarda,	66	1
Recurviroſtra pectore croceo,	76	5
Red-breaſted Gotwit,	76	5
— Curlew,	78	12
— Legg'd Heron,	81	16
— Legged Crane,	67	1
— Legged Horſeman,	75	4
— Shank,	68	1
—	75	3
— Shank, (White)	75	8
Redshanca Turneri,	75	3
Reeve,	75	18
Regen-Vogel,	78	1
—	78	2
Reger,	81	1
— (Aſchenfarbener)	81	1
— (Blawer)	81	1
— (Bundter)	81	45
— (Rodter)	81	34
— (Sand-)	81	34
— (Schild)	81	45
— (Schwartzer)	81	21
— (Weiſſer)	81	15
Regerlin, (Kobel)	73	1
— (Sand)	73	2
Rei-Dommel,	81	24
Reigel,	81	1
— (Blauwer)	81	1
— (Grauer)	81	1
— (Grauwer)	81	1
— (Groſſer Ror-)	81	28
— (Mos-)	81	24
— (Moſs-)	81	24
— (Moſz-)	81	24
— (Rohr-)	81	24
— (Ros-)	81	24
— (Weiſſer)	81	15
Reiger,	81	1
—	81	15
— (Wyſſer)	81	15
Reigher,	81	1
Reiher,	81	1
Rein-Vogel,	87	7
Rex Coturnicum,	74	3
Rhaad,	66	2
Rhea,	63	
—	63	1
Rhodopos, (Gallinula)	75	1
Rhodopus,	75	1
— (Gallinula)	75	1
— Geſneri, (Gallinula)	75	1
Riegerle,	73	2
Riegerlin,	73	2
Riegher,	81	1

	G.	S.
Riet-Schnepff,	77	1
Rind, (Los-)	81	24
— (Meer-)	81	24
— (Us-)	81	24
Rodter Reger,	81	34
Roer-Drum,	81	24
Rohr-Drummel,	81	24
— Reigel,	81	24
— Trumen,	81	24
Roi de Cailles,	74	3
Ronzeſa,	77	1
Ropezora,	77	1
Ror-Dummel,	81	24
— Reigel, (Groſſer)	81	28
Ros-Dam,	81	24
— Dump,	81	24
— Dumpf,	81	24
— Reigel,	81	24
— trumm,	81	24
Roſtrum Sudis,	75	4
Rot-bein,	75	3
— Feuſſel,	75	3
— Knillis,	73	3
— knuſſell Leonardi Baltneri,	73	3
Roten beinen, (Waſſer-Heunlin mit)	75	3
Rott-bein,	75	3
Roupeau,	81	45
Roy des Cailles,	74	1
—	74	3
Ruff,	75	18
Ruffe,	75	18
Rukicola,	77	1
Ruſſey,	81	24
Ruſticola,	77	1
— Aldrovandi, (Scolopax,)	76	1
— aquatica,	78	6
— maritima minor,	78	6
Ruſticula,	77	1
—	77	2
— aquatica Braſilienſibus,	78	6
Ruſticula major,	77	1
— minor,	77	2
— ſylvatica,	75	14

S.

	G.	S.
SAf-Saf,	66	2
Sagiſer,	78	4
Samethounle,	74	1
Sand-piper,	75	2
— Reger,	81	34
— Regerlin,	73	2
— Vogel,	73	1
Sanderling,	75	17
— d'Arbres,	75	10
— de Cornouaille,	75	17
Saouakou,	83	1
— des bois,	83	2
Scarlet Curlew of Braſil,	78	12
— Pelecan, (American)	79	3
— Spoon-bill, (American)	79	3
— Spoon-bill'd Bird of America,	79	3
Schalach,	81	1
Schalenuna,	81	1
Schild Reger,	81	45
Schmirring,	87	6
— dictum, (Gallinulæ aquaticæ quartum genus)	87	6
Schnep-Hun,	77	1
— (Pol-)	76	2
Schnepf, (Groſſer)	77	1
— (Half-)	77	3
— (Har-)	77	2
Schnepfe, (Berg-)	77	1
— (Heer-)	77	2
— (Holtz-)	77	1
— (Wald-)	77	1
— (Waſſer-)	77	2
Schnepff,	77	1
— (Graſe-)	77	2

	G.	V.	S.
Schnepff, (Graſs-)	77		2
— (Heer-)	77		2
— (Holtz-)	75		14
— -Hun,	77		1
— (Pful-)	76		2
— (Riet-)	77		1
— (Wald-)	75		14
Schnepffe,	77		1
—	77		2
— (Waſſer-)	77		2
Schnepfflin,	77		2
Schnepfle, (Bruch-)	77		2
Schneppe, (Berg-)	77		1
— (Holtz-)	77		1
— (Puſch-)	77		1
— (Wald-)	77		1
Schnercker,	74		3
Schœniclos,	75		10
Schœniclus,	75		10
Schofler,	79		1
Σχοινικλος,	75		10
Schovelard,	79		1
Schoveler,	79		1
Schryck,	74		3
Schrye,	78		1
Schryk,	74		3
Schufler,	79		1
Schwartz Waſſer Heunle,	74		1
Schwartzer Reger,	81		21
— Storch,	80		1
— Storch, (Braun-)	80		1
— Storck,	80		1
Scolopax,	77		
—	77		1
—	77		2
— alba,	77	A.	1
—	78		10
— Aldrovandi,	77		1
— candida,	77	A.	1
— cinerea minor, &c.	77		2
— fuſca,	78		11
— Lapponica,	76		5
— media,	77		2
Scolopax minima,	77		3
— minima, &c.	77		3
— minor,	77		2
— minor aliis,	77		2
— quæ Capella cœleſtis Authorum,	77		2
— roſtro arcuato, &c.	78		1
—	78		2
—	78		10
—	78		11
—	78		12
— roſtro recto, &c.	75		3
—	76		3
—	76		6
— roſtro recto apice tuberculato, &c.	77		2
— roſtro recto flaveſcente, &c.	76		5
— roſtro recto lævi, &c.	76		1
—	77		1
— roſtro recto longo, &c.	76		7
— roſtro ſubrecurvato, &c.	76		5
— rubra,	78		12
— Ruſticola Aldrovandi,	76		1
— ſimpliciter Aldrovandi,	77		1
— ſimpliciter Ariſtotelis,	77		1
— ſubtus fulva, &c.	77		1
Scops,	80		12
Scopus,	82		
—	82		1
Scorzana,	87		8
Scur-Vogel,	80		4
— Vogel, Marcgravii, (Belgis)	80		4
Scythe-bill'd Heron,	78		4
Sea-Dotterel,	72		1
— Dottrel,	72		1
—	72		2

	G.	S.
Sea-Dottrell,	72	1
— Lark,	69	8
— Pie,	68	1
— Swallow,	73	1
Second Crabier,	81	3
See-Amſel,	75	19
— Taube,	69	1
Segonya,	80	2
Serica dicta, (Gallinago)	74	1
— dicta, (Gallinula)	74	1
Σέρτης,	80	6
Sgainolo,	75	1
Sguacco,	81	37
—	81	45
— vocant, (Ardeæ aliud genus, quam)	81	37
— vocant in vallibus dictis Malalbergi, Aldrovandi, (Ardea quam)	81	37
Shank, (Red-)	68	1
—	75	3
— (White Red-)	75	8
Sichler,	78	4
Siewká,	87	7
Siewniczká,	87	7
Sieyka,	87	7
Σκολόπαξ,	77	1
Slangen-Vreeter,	79	1
Slomká,	77	1
Small Bittern,	81	32
—	81	43
— Water-Hen,	87	8
Snaeppa,	75	2
— (Mall-)	77	2
— (Wald-)	77	2
Sneff, (Haer-)	77	2
Sneppe,	77	1
Snipe,	75	10
—	77	2
— (Gid-)	77	3
— (Greateſt)	69	11
— (Half-)	77	3
Snipe, (Jack-)	77	3
— (Leaſt-)	75	10
— (Partridge-)	77	4
— (Pool-)	75	3
—	75	8
Snite,	77	2
Soco,	81	23
— Braſilienſibus,	81	23
— Braſilienſibus Marcgravio,	81	23
Soree,	74	8
Spar,	75	10
Spatula dicta, (Ardea Phœnicea,)	79	3
— dicta, (Ardea roſea,)	79	2
Spatule,	79	
—	79	1
—	79	2
— couleur de roſe,	79	2
— rouge,	79	3
Spinzago,	78	1
Spoon-bill,	79	1
— bill, (American Scarlet)	79	3
— bill'd Bird of America (Scarlet)	79	3
— bill'd Heron, (White and)	79	1
Spotted-Plover,	69	4
— Tringa,	75	20
Spur-Wing'd Gooſe of America,	71	4
Squaiotta,	81	33
— dicta Malalbergi, Aldrovandi, (Ardea vulgò)	81	33
— dicitur Malalbergi, (Ardeæ alia ſpecies, quæ vulgò)	81	33
— Italorum,	81	33
Squatarola,	70	2
— Venetiis dicta, (Pluvialis cinerea)	70	2

	G.	S.
Starda,	66	1
Stare, (Watn-)	75	19
Stein-beyſſer,	75	10
— bicker,	75	10
Steingaellyl,	75	1
Steingallell Leonardi Baltneri,	75	1
Stella,	66	2
— Avis,	66	2
— Avis Aldrovandi,	66	2
— Avis dicta,	66	2
Stint,	75	10
— dicta, (Avis The)	75	10
Stone Curlew,	69	12
— from Hudſon's Bay, (Turn-)	72	1
— Plover,	70	2
—	76	1
—	76	6
— (Turn-)	72	1
—	72	2
Storch,	80	2
— (Braun-Schwartzer)	80	1
— (Schwartzer)	80	1
— (Weiſſer)	80	2
Storck,	80	2
— (Schwartzer)	80	1
Stork,	80	2
— (Black)	80	1
— (White)	80	2
Strand-Looper,	75	10
Strandfkjura,	68	1
Strandpipare,	69	8
Straus,	62	1
—-Vogel,	62	1
Strauſs,	62	1
Στρειφοκάμηλος,	62	1
Στριφοχάμιλος,	62	1
Στρυθοῖοκάμηλος,	62	1
Στρυθοκάμηλος,	62	1
Στρυθος,	62	1
Στρουθιοκάμηλος,	62	1
Στρουθος λίβυκος,	62	1
Στρουθος μεγάλη,	62	1
Struijs, (Vogel)	62	1
Strus,	62	1
Struſs,	62	1
Struthio,	62	
—	62	1
—	63	1
— Africa,	62	1
— Americanus,	63	1
—-Camelus,	62	1
—	63	1
—-Camelus Africanus, pullus,	62	1
—-Camelus Americanus,	63	1
—-Camelus Americanus Marcgravio,	63	1
— cucullatus,	65	1
— digito poſtico rotundato mutilo,	63	1
— ex China, Viſcher,	84	1
— Libycus,	62	1
— nothus,	63	1
— pedibus didactylis,	62	1
— pedibus tetradactylis, &c.	65	1
— pedibus tridactylis, &c.	64	1
— pennis candidiſſimis, &c.	62	1
Strutho-Camelus,	62	1
Strutz,	62	1
Strutza,	62	1
Struzzo,	62	1
Στρυθος,	62	1
Sturnus niger, &c.	75	19
Sturzo,	62	1
Sudis, (Roſtrum)	75	4
Suri,	63	1
Swallow, (Sea-)	73	1
— (Water-)	75	10
Swan of S. Maurice's Iſland, (Monk-)	65	1

	G.	S.
Συρισκὸς,	80	6

T.

	G.	S.
TAil, (Wag-)	70	2
Tamatia,	83	2
— alia,	83	2
— Braſilienſibus dicta,	83	2
— Braſilienſibus dicta Marcgravii,	83	2
— Braſilienſibus Marcgravii,	83	2
Tantalus,	78	8
Ταὼς ἄγριος,	70	1
Tarangolo,	78	2
Taraniolo,	78	2
Tarax Nemeſiani,	66	1
Tarda,	66	1
— Aldrovandi,	66	1
— Arabs,	66	3
— Avis,	66	1
— Avis Aldrovandi,	66	1
— Iſidori,	66	1
— Iſidoro,	66	1
— Mechaenſis Arabica,	66	3
— nana,	66	2
— Pyrenaica, fulva, &c.	66	1
— Recentiorum,	66	1
— (Recentiorum)	66	1
— ſimpliciter,	66	1
Tarlino,	78	1
Taube, (See)	69	1
Taurus Plinii,	81	24
Tcheluk,	77	1
Telamon,	87	1
Terlino,	78	1
Terrabuſa,	81	24
Terrabuſo,	81	24
Tetraon Longolio,	66	1
Tetrax,	66	2
— Bellonii,	66	2
— Bellonii, Aldrovandi,	66	2
— Nemeſiani,	66	1
Τέτριξ,	66	1
Teuffel, (Haus-)	75	18
Tewit,	70	1
Thouyou,	63	
—	63	1
Thouyouyou,	63	1
Tiklin,	74	4
—	74	5
—	74	6
—	74	7
Tinga Braſilienſibus, (Guira-)	81	15
— Braſilienſibus Marcgravii, (Guira-)	81	15
— (Guira-)	81	15
Titulus tepidi temporis Petronio,	80	2
Tlauhquechul,	79	3
— Hernandezii,	79	3
— Nierembergii,	79	3
Tlauquechul,	79	3
Tobactli,	81	11
Tolck,	72	1
Toquïlcoyotl,	80	8
Tordo Gelſemino,	87	8
Torquato,	78	1
Toru de Garriga,	81	28
Totano,	76	2
—	76	3
Totanus,	75	3
—	76	1
—	76	2
— Aldrovandi,	76	1
— alter,	75	4
— Bengalenſis,	75	9
— candidus,	75	8
— cinereus,	75	7
— cinereus, &c.	76	1
— fulvus, &c.	76	5
— Geſneri,	75	3
— nævius,	75	6
— Ornithologi,	76	2
— ruber,	75	4

	G.	S.
Totanus ſtriatus,	75	5
Tourne pierre de la Baye de Hudſon,	72	1
Trana,	80	6
Trapp,	66	1
— (Acker-)	66	1
—-gans,	66	1
—-ganſs,	66	1
Trappa, (Anſer)	66	1
Trappe,	66	1
—(Acker)	66	1
Tree Widdle,	75	10
Triel,	69	12
Tringa,	75	
—	75	1
— Aldrovandi,	75	1
— alia,	75	1
— Auguſti menſis,	70	2
— cinerea, &c.	75	21
— criſtâ dependente, &c.	70	1
— facie papillis granulalis, &c.	75	18
— littorea,	75	7
— luteo cinereoque maculata, &c.	75	4
— maritima,	72	1
— minor,	75	2
— nigra, albo punctata, &c.	75	1
— nigro, albo, ferrugineoque variegata, &c.	72	1
— nigro-fuſca, &c.	70	2
— pedibus rubris,	75	18
— pedibus rubris, &c.	70	1
—	72	1
— prima,	75	1
— pulla, &c.	75	10
— quinta,	75	2
— remigibus fuſcis, &c.	75	7
— roſtri apice punctato, &c.	75	1
Tringa roſtro lævi, &c.	75	1
—	75	2
—	75	7
—	75	21
— roſtro nigro, &c.	70	2
—	75	3
— roſtro pedibuſque rubris, &c.	75	4
— (Spotted)	75	20
— ſubcinerea, &c.	69	11
— tacheté,	75	20
— tertia,	75	1
— tertia Aldrovandi,	75	1
— tertia Aldrovandi, Giaroncello Italis dicta,	75	1
— tertia Aldrovandi, Pinirolo Italis dicta,	75	1
Trochilus Junio,	87	6
— terreſtris,	87	5
Trombone,	81	24
Troſtle, (Waſſer-)	75	19
Truble,	79	1
Trumbotto,	81	24
Trumen, (Rohr-)	81	24
Trumm, (Ros-)	81	24
Τρύγλας,	75	1
Trynga,	75	1
—	75	19
— alia,	75	1
— altera,	75	1
— quarta,	75	10
— ſecunda,	75	1
Tryngas,	75	1
Tullſiſz,	73	2
Turdus aquaticus,	75	19
—	75	20
Turn-Stone,	72	1
—	72	2
— Stone from Hudſon's Bay,	72	1

V.

	G.	S.
VAneau,	70	1
Vanellus,	70	
—	70	1
— Alberto magno,	70	1
— Aldrovandi,	70	1
— Bononienſis major,	70	5
— Dominicenſis armatus,	70	8
— fuſcus,	70	2
— griſeus,	70	2
— Helveticus,	70	4
— Indicus,	69	14
— Ludovicianus armatus,	70	7
— Senegalenſis armatus,	70	6
— torquatus, &c.	70	1
— varius,	70	3
Vanneau,	70	
—	70	1
— armé de la Louiſiane,	70	7
— armé de S. Domingue,	70	8
— armé du Sénégal,	70	6
— de Bologne, (Grand)	70	5
— de Suiſſe,	70	4
— gris,	70	2
— varié,	70	3
Velvet Kunner,	74	1
Vetola,	76	1
Videcocq,	77	1
Videcoq,	77	1
Virgo,	80	12
— Numidica,	80	12
Vivago Bodini,	69	1
Vogel, (Brach-)	69	1
—	73	1
—	78	1
—	78	2
—	87	7
Vogel, (Frembder-)	87	1
— (Froembder)	67	1
— (Geiſz-)	78	1
— (Groſſer Brach-)	69	1
—	70	2
—	78	1
— (Jut-)	78	1
— (Klein Brach-)	87	7
— (Kleiner Brach-)	69	2
— Marcgravii, (Scur-)	80	4
— (Purpur-)	87	1
— (Regen-)	78	1
—	78	2
— (Rein-)	87	7
— (Sand-)	73	1
— (Scur-)	80	4
— (Straus-)	62	1
— Struijs,	62	1
— (Walgh-)	65	1
— (Weltſcher-)	78	4
— (Wetter-)	78	1
— (Wind-)	78	1
Vreeter, (Slangen-)	79	1
Us-rind,	81	24
Wachtel Koenig,	74	3
Wachteln Koenig,	74	3
Wag-Tail,	70	2
Wald-Schnepfe,	77	1
— Schnepff,	75	14
— Schneppe,	77	1
— Snaeppa,	77	2
Walgh-Vogel,	65	1
Wallop,	78	1
Waſſer-Amſel,	75	19
— Heunle, (Groſz)	87	5
— Heunle, (Schwartz)	74	1
— Heunlein,	73	3
— Heunlin,	77	2
— Heunlin, (Bundt)	75	1
— Heunlin mit Roten beinen,	75	3
— Hun,	87	6
— Hunle, (Groſſe)	87	5

	G.	V.	S.
Waſſer-Ochſz,	81		24
— Schnepfe,	77		2
— Schnepffe,	77		2
— Troſtle,	75		19
Water-Crake,	75		19
— Curlew,	78		1
— Hen, (Little American)	87		9
— Hen, (Small)	87		8
— hoen,	71		1
— hun,	71		1
— Ouzel,	75		19
— Rail,	74		1
— Rail, (Bengall)	75		9
— Swallow,	75		10
Watn-Stare,	75		19
Weiſſer Reger,	81		15
— Reigel,	81		15
— Storch,	80		2
Weltſcher-Vogel,	78		4
Wetter-Vogel,	78		1
Whaupe,	78		1
Whimbrel,	78		2
Whimbrell,	78		2
Whiſtling Plover,	69		1
White and Spoon-bill'd Heron,	79		1
— Curlew,	78		10
— Gaulding,	81		15
— Gaulding, (Largeſt)	81		15
— Godwit from Hudſon's-Bay,	76		8
— Heron,	81		15
— Heron, (Great)	81		15
— Heron, (Little)	81		18
— Red-Shank,	75		8
— Stork,	80		2
— Wood-Cock,	77	A.	1
Widdle, (Tree)	75		10
Wimbrel,	78		2
Wind-Vogel,	78		1
Wing, (Lap-)	70		1
— Plover, (Lap-)	70		1
Wipa,	70		1
Wood-Cock,	77		1
— Cock, (White)	77	A.	1
— Pelican,	78		8
Wynkernell,	74		2
Wynkernnell,	74		2
Wyſſer Reiger,	81		15

X.

	G.	S.
XOxouhqui-hoactli,	81	5
X—	81	11
Xoxouqui-hoactli,	81	5
Xoxouquihaactli, (Avis)	81	13
Ξυλόρνις,	77	1

Y:

	G.	S.
YAcacintli,	87	1
Yacatopil,	75	4
Yandou,	63	1
Yarwhelp,	76	6
Yarwip,	76	6
Yohualcuachili,	71	4
Yohualquachili,	71	4

Z.

	G.	S.
ZAkid,	80	2
ZZiege, (Himels)	77	2
— (Himmel-)	70	1
— (Himmels-)	77	2
Zigogna,	80	2
Zoltaczek,	69	8
Zoraw,	80	6
—	81	1
Zweiel,	70	1

AVIS AU RELIEUR.

Les Planches doivent être placées de maniere qu'en s'ouvrant, elles puiſſent ſortir du Livre, & ſe voir à droite dans l'ordre qui ſuit.

Page 16. *Planches* I.
32. . . . . II.
42. . . . . III.
90. . . . . IV, V, VI & VII.
120. . . . . VIII, IX & X.
140. . . . . XI.
176. . . . . XII, XIII, XIV & XV.
260. . . . . XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI & XXII.
292. . . . . XXIII, XXIV & XXV.
310. . . . . XXVI.
350. . . . . XXVII, XXVIII & XXIX.
360. . . . . XXX.
390. . . . . XXXI, XXXII & XXXIII.
502. . . . . XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX & XL.
514. . . . . XLI.
544. . . . . XLII.

ERRATA.

Par-tout où vous trouverez épron *liſez* éperon

Page			
15	*ligne* 32.	ILAND *liſez* ISLAND	
88	36.	primam *lege* nonam	
129	17.	épronnées. *liſez* éperonnées.	
205	22.	pennæ *lege* penna	
243	14.	proche *liſez* proches	
264	17.	abicat *lege* albicat	
273	35.	autérieurs *liſez* antérieurs	
277	29.	entensâ *lege* extensâ	
284	16.	mer *Du ca- liſez* mer. *Du ca-*	
362	31.	SNIDY *liſez* SNIADY	
371	22.	j'ai vue *liſez* j'aie vue	
398	6.	extrema *lege* extremam	
418	2.	*Lézars* liſez. *Lézards*	
465	22.	plume *liſez* plumes	
i	13.	*Ceſuarii* lege *Caſuarii*	
xxxv	9.	Gulguruk, 10 1 *lege* Gulguruk, 70 1	